

Листок-вкладыш – информация для потребителя **МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ, измельченное сырье**

Действующее вещество: Мяты перечной листья

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Мяты перечной листья, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Мяты перечной листья.
3. Прием препарата Мяты перечной листья.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Мяты перечной листья.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Лекарственный препарат Мяты перечной листья содержит действующее вещество мяты перечной листья, относится к противорвотным препаратам.

Показания к применению

Лекарственный препарат Мяты перечной листья применяется у взрослых и детей от 4 до 18 лет:

- для симптоматического лечения функциональных расстройств пищеварительного тракта (тошнота, метеоризм).

Применение по указанным показаниям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ действия препарата

Настой листьев мяты перечной оказывает спазмолитическое и желчегонное действие.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ

Не принимайте препарат Мяты перечной листья:

- если у Вас аллергия на мяты перечной листья или другие компоненты препарата, а также на ментол;
- если у Вас пониженное артериальное давление, наличие камней в желчном пузыре;
- в период беременности, грудного вскармливания;
- в детском возрасте до 4 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Мяты перечной листья проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если у Вас изжога, особенно после приема пищи, прием настоя листьев мяты перечной не рекомендован.

Если у Вас желчекаменная болезнь, другие заболевания печени и желчевыводящих путей, перед приемом лекарственного препарата необходимо обратиться к врачу.

Если во время приема лекарственного препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Дети

Не давайте препарат детям в возрасте до 4 лет вследствие вероятной небезопасности.

Другие препараты и препарат Мяты перечной листья

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не изучалось.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследования по оценке влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

В связи с возможным седативным эффектом во время лечения не рекомендовано управлять автомобилем и работать с механизмами.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

5 г (1,5 столовой ложки) листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

- по 1/3 – 1/2 стакана настоя 3 раза в сутки в теплом виде за 15–20 минут до еды.

Применение у детей

Дети от 4 до 12 лет:

- по 2–3 столовые ложки настоя 3 раза в сутки в теплом виде за 15–20 минут до еды.

Дети от 12 до 18 лет:

- по 1/3 стакана настоя 3 раза в сутки в теплом виде за 15–20 минут до еды.

Препарат не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 4 лет в связи с отсутствием достаточных данных.

Способ применения

Для приема внутрь.

Продолжительность лечения

Продолжительность приема определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного препарата.

Если вы приняли препарата Мяты перечной листья больше, чем следовало

При передозировке возможно развитие бронхоспазма, нарушения дыхания, появление боли в области сердца.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат может вызывать другие, нежели указанные ниже нежелательные реакции.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции;
- изжога;
- желчная колика (у пациентов с желчекаменной болезнью).

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данном листке-вкладыше, следует прекратить прием лекарственного

препарата и обратиться к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а.

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242 00 29; факс: +375 (17) 242 00 29.

Электронная почта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by

<http://www.rceth.by>

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ

Храните в оригинальной упаковке при температуре от 15 °C до 25 °C. Приготовленный настой – в прохладном месте (при температуре от 8 °C до 15 °C) не более 2 суток.

Храните в недоступном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не принимайте препарат по истечении срока годности, указанного на картонной пачке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Мяты перечной листья содержит в качестве действующего вещества мяты перечной листья.

Каждый пакет содержит 50 г мяты перечной листьев.

Вспомогательные вещества: отсутствуют.

Внешний вид препарата Мяты перечной листья и содержимое упаковки

Измельченное сырье.

Кусочки листьев различной формы, проходящие сквозь сито (5600), от светло-зеленого до темно-зеленого, коричневого цвета. Запах сильный, ароматный. Вкус слегка жгучий, холодящий.

В пакеты бумажные или полипропиленовые по 50 г. По одному пакету вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА», 223043, Минская обл., Минский р-н, с/с Папернянский, д. Цнянка, улица Армейская, д. 8, комн. 7



Тел.: (017) 500-33-01, тел./факс: (017) 500-33-46
E-mail: info@belaseptika.by

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте: www.rceth.by.