

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

БОЯРЫШНИК, НАСТОЙКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Боярышника плоды

- Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.
- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Боярышник, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Боярышник.
3. Прием препарата Боярышник.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Боярышник.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ БОЯРЫШНИК, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Боярышник содержит действующее вещество боярышника плоды.

Препарат Боярышник относится к средствам, применяемым при заболеваниях сердца. Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах боярышника, оказывают умеренное кардиотоническое, гипотензивное и седативное действие.

Показания к применению

В комплексной терапии функциональных нарушений сердечной деятельности и функциональных нарушений нервной системы (неврастения).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА БОЯРЫШНИК

Не принимайте препарат Боярышник, если у Вас:

- аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

- детский возраст до 12 лет;
- беременность и период лактации.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Боярышник проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Сообщите лечащему врачу перед началом лечения препаратом Боярышник о следующих нарушениях или заболеваниях:

- заболевания печени;
- эпилепсия;
- алкоголизм;
- черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга.

Сообщите врачу, если во время лечения у Вас сохраняются симптомы или происходит ухудшение состояния.

Лекарственный препарат содержит не менее 65 % этилового спирта (этанола), то есть 410-616 мг на разовую дозу 20-30 капель, что равно 10,4-15,6 мл пива, 4,3-6,5 мл вина на дозу. Вредно для лиц с алкоголизмом.

Дети и подростки

Применение лекарственного препарата у детей до 12 лет противопоказано. Применение лекарственного препарата у детей в возрасте 12-18 лет возможно только по назначению врача и под медицинским наблюдением.

Другие препараты и препарат Боярышник

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат содержит этиловый спирт (этанол). Необходимо избегать совместного приема с препаратами, вызывающими дисульфирамоподобную реакцию при совместном приеме с алкоголем (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия):

- дисульфирам (препарат для лечения алкоголизма);
- антибиотики (цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол);
- препараты, снижающие уровень сахара в крови (хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид);
- противогрибковые препараты (гризофульвин, кетоконазол);
- противомикробные препараты, производные нитро-5-имида (метронидазол, орнидазол, тинидазол);
- прокарбазин (противоопухолевый препарат).

Необходимо также избегать совместного приема с лекарственными препаратами, угнетающими функции центральной нервной системы.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных препаратов, содержащих этиловый спирт.

При совместном назначении с сердечными гликозидами происходит усиление кардиотонического действия.

Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования комплексов.

Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмическими средствами III класса, а также с цизапридом.

Взаимодействие с пищей и напитками

В период лечения следует избегать употребления алкоголя и алкогольсодержащих напитков.

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Противопоказано применение лекарственного препарата в период беременности и лактации.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Лекарственный препарат содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо отказаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА БОЯРЫШНИК

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

1 мл лекарственного препарата содержит около 25 капель.

Рекомендуемая доза

Рекомендуемая доза для взрослых: 20-30 капель настойки, разведенных в 1/4 стакана воды, 3 раза в день.

Во время приема препарата Боярышник пациентам с нарушениями функций почек и/или печени, а так же пожилым пациентам следует соблюдать осторожность.

Применение у детей и подростков

Прием препарата Боярышник противопоказан детям до 12 лет. Прием препарата у детей в возрасте 12-18 лет возможен только по назначению врача и под медицинским наблюдением.

Рекомендуемая доза для детей старше 12 лет: 3 раза в день по 10-15 капель настойки, разведенных в 1/4 стакана воды.

Путь и (или) способ введения

Препарат следует принимать внутрь до еды.

Продолжительность лечения

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного препарата и достигнутого эффекта.

Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этилового спирта (этанола). Продолжительность приема у детей должна быть минимальной. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств.

Если Вы приняли препарата Боярышник больше, чем следовало



Если Вы приняли больше назначенной дозы препарата Боярышник, возможно снижение артериального давления, головокружение, сонливость, брадикардия. Следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Если Вы забыли принять препарат Боярышник

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Примите следующую дозу лекарственного препарата в обычное время.

Если Вы прекратите прием препарата Боярышник

Обратитесь за консультацией к лечащему врачу, если Вы хотите прекратить прием препарата Боярышник раньше, чем рекомендовано.

Если у Вас есть любые дополнительные вопросы по применению, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме препарата возможно развитие следующих нежелательных реакций:

- аллергические реакции (крапивница, зуд);
- головокружение, трепетание, сонливость;
- брадикардия (при длительном применении);
- снижение артериального давления (при применении в больших дозах).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 17 242-00-29

Факс: +375 17 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА БОЯРЫШНИК

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

При хранении допускается выпадение осадка.

Беречь от огня.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Срок годности – 2 года.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Действующее вещество: боярышника плоды – 5 г;

вспомогательное вещество – этиловый спирт (этанол) 70 % – до 50 мл настойки.

Лекарственный препарат является спиртовым извлечением из боярышника плодов 1:10.

Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

1 мл лекарственного препарата содержит около 25 капель.

По 50 мл во флаконы из стекломассы с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

СОАО «Ферейн»

220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 52А

тел./факс: +375 17 394-92-18

e-mail: office@ferane.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Данный листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Евразийского экономического союза: <http://www.eaeunion.org/>.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте Евразийского экономического союза: <http://www.eaeunion.org/>.