

**Листок-вкладыш – информация для пациента**

Глицерин, 1,24 г, суппозитории ректальные
Глицерин, 2,11 г, суппозитории ректальные
Действующее вещество: глицерол (глицерин)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Глицерин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Глицерин.
3. Применение препарата Глицерин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Глицерин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Глицерин, и для чего его применяют

Глицерин содержит действующее вещество глицерол и применяется как слабительное средство.

Показания к применению

Препарат Глицерин показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 2 до 18 лет:

- для симптоматического лечения запоров различной этиологии (когда использование пероральных препаратов невозможно),
- для профилактики запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации.

Способ действия препарата Глицерин

При применении в виде ректальных суппозиториев смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке. Оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника, инициирует процесс дефекации, облегчает прохождение и выведение каловых масс.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Глицерин**Противопоказания****Не применяйте препарат Глицерин:**

- если у Вас аллергия на глицерол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша),
- при синдроме раздраженного кишечника,
- при кишечной непроходимости,
- при аппендиците,

• при кровотечениях,

- при диарее,
- при геморрое в стадии обострения,
- при трещинах заднего прохода,
- при воспалительных заболеваниях и опухолях прямой кишки,
- при боли в животе неясного происхождения,
- при геморрагическом ректоколите,
- у детей в возрасте до 2 лет,
- при беременности (I триместр).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Глицерин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При почечной недостаточности препарат следует применять с осторожностью.

Систематическое применение не рекомендуется. Прекращайте лечение после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Не применяйте препарат более 7 дней.

Не смазывайте суппозитории минеральными жидкими или твердыми маслами.

Перед и после применения суппозитория тщательно вымойте руки.

Дети

Не применяйте препарат у детей в возрасте до 2 лет.

Другие препараты и препарат Глицерин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Суппозитории с глицерином могут ослабить действие лекарственных средств, которые применяются ректально.

При необходимости использования других ректальных препаратов следует соблюдать интервал между их применением не менее 1 часа.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Следует избегать применения препарата в I триместре беременности. Во время беременности применение препарата возможно только в том случае, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Лактация

Возможно применение препарата в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

3. Применение препарата Глицерин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

По 1 суппозиторию, содержащему 2,11 г глицерола, 1 раз в сутки. При необходимости дозу повышают до 2 суппозитория в сутки.

Применение у детей и подростков

Дети с 2 до 12 лет: по 1 суппозиторию, содержащему 1,24 г глицерола, 1 раз в сутки.

Дети старше 12 лет: по 1 суппозиторию, содержащему 2,11 г глицерола, 1 раз в сутки. При необходимости дозу повышают до 2 суппозитория в сутки.

Путь и способ введения

Ректально. Препарат вводят в прямую кишку и оставляют там не менее 5 минут. Обычно дефекация происходит через 5-10 минут после введения препарата. Остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

Продолжительность терапии

Длительность курса лечения препаратом не более 7 дней.

Если Вы применили препарата Глицерин больше, чем следовало

Симптомом передозировки является частый жидкий стул. В случае передозировки следует отменить препарат.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата возможны следующие нежелательные реакции (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции;
- местные реакции (зуд, жжение в области ануса);
- ослабление физиологического процесса дефекации (при длительном применении).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

e-mail: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>

Республика Армения

«Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна» АОЗТ

0051, Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Телефон: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

e-mail: vigilance@pharm.am

Сайт: <http://pharm.am/>

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон/факс: +375 (17) 242-00-29

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
010000, г. Астана, район Байконур, ул. А. Иманова, 13
Телефон: +7 (7172) 235 135
e-mail: farm@dari.kz
Сайт: <https://www.ndda.kz/>

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25
Телефон: 0800 800 26 26
e-mail: dlomt@pharm.kg
Сайт: <http://www.pharm.kg/>

5. Хранение препарата Глицерин

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и контурной ячейковой упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Глицерин содержит

Действующим веществом является глицерол (глицерин).

Глицерин, 1,24 г, суппозитории ректальные

Каждый суппозиторий содержит 1,24 г глицерола (глицерина).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: макрогол 400, стеариновая кислота 95, натрия карбонат декагидрат.

Глицерин, 2,11 г, суппозитории ректальные

Каждый суппозиторий содержит 2,11 г глицерола (глицерина).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: макрогол 400, стеариновая кислота 95, натрия карбонат декагидрат.

Внешний вид препарата Глицерин и содержимое упаковки

Суппозитории ректальные.

Суппозитории торпедообразной формы, прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневатым оттенком цвета, с мажущейся поверхностью, гигроскопичны. Допускается наличие воронкообразного углубления с незначительным количеством пузырьков воздуха.

По 5 суппозиторияев в контурную ячейковую упаковку из двухслойной пленки алюминий-полиэтилен. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачку из картона.



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ⁴⁷
от 11.10.2023 № 20143
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Держатель регистрационного удостоверения

АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7
Тел.: (831) 278-80-88
E-mail: med@nizhpharm.ru

Производитель

Выпускающий контроль качества

АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7, к. 1

Все претензии потребителей следует направлять представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

Российская Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь

АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7
Тел.: (831) 278-80-88
E-mail: med@nizhpharm.ru

Республика Казахстан

ТОО «STADA Kazakhstan», Республика Казахстан
050044, г. Алматы, ул. Нурлана Каппарова, д. 408
тел.: (727) 2222-100
e-mail: almaty@stada.kz

Кыргызская Республика

ОсОО «Штада Кыргызстан», Кыргызская Республика
720005, г. Бишкек, ул. Игембердиева 1а, БЦ "Аврора", офис 604

Листок-вкладыш пересмотрен

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза:
<https://ees.eaeunion.org/>