

Листок-вкладыш – информация для пациента
ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, 5 мг, таблетки
ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, 10 мг, таблетки
ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, 20 мг, таблетки
Действующее вещество: лизиноприл

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед приемом препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ.
3. Прием препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, и для чего его принимают

Лекарственный препарат ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ содержит в качестве действующего вещества лизиноприл (в виде лизиноприла дигидрата). Лизиноприл относится к группе препаратов, известных как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые применяются для снижения артериального давления и лечения других сердечно-сосудистых заболеваний.

Действие препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ связано с расширением кровеносных сосудов, что приводит к снижению повышенного артериального давления. Препарат также позволяет сердцу с меньшим усилием доставлять кровь во все части тела.

Показания к применению

Лизиноприл применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения следующих заболеваний:

- Артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с другими гипотензивными препаратами).
- Хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии для лечения пациентов, принимающих сердечные гликозиды и/или диуретики).
- Раннее лечение острого инфаркта миокарда (у пациентов со стабильными показателями гемодинамики в первые 24 часа для профилактики дисфункции левого желудочка и сердечной недостаточности).
- Диабетическая нефропатия (специфическое поражение почек при сахарном диабете) - для снижения альбуминурии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа с нормальным артериальным давлением, и пациентов с сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертензией.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ

Противопоказания

Не принимайте ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, если:

- у Вас аллергия на лизиноприл, а также на любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- у Вас когда-либо была аллергическая реакция на другой препарат из группы ингибиторов АПФ (например, эналаприл, каптоприл). Аллергическая реакция могла сопровождаться отеком кистей, стоп, лодыжек, лица, губ, языка или горла, затруднением глотания или дыхания (симптомы ангионевротического отека или отека Квинке);
- в случае развития у одного из Ваших родственников тяжелой аллергической реакции (отек Квинке) к ингибиторам АПФ или в случае развития у Вас тяжелой аллергической реакции (отек Квинке) по неизвестной причине;
- Вы беременны или кормите грудью;
- у Вас сахарный диабет и/или нарушение функции почек, и Вы принимаете препараты для снижения артериального давления, содержащие алискирен;
- у Вас заболевание почек, связанное с сахарным диабетом, и Вы уже принимаете препараты из группы антагонистов рецепторов ангиотензина II;
- Вы принимали или принимаете препараты, содержащие сакубитрил для лечения сердечной недостаточности (одновременный прием с этим препаратом увеличивает риск развития ангионевротического отека).

Не принимайте препарат ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам. Если Вы не уверены, то проконсультируйтесь со своим лечащим врачом до приема препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом в следующих случаях, если:

- Вы почувствовали головокружение, слабость, головную боль – признаки снижения артериального давления (артериальная гипотензия). Такое состояние может чаще возникать, если:
 - У Вас имеются другие заболевания сердца;
 - У Вас заболевания сосудов головного мозга;
 - Вы принимаете мочегонные препараты (диуретики);
 - У Вас в недавнем времени наблюдались диарея, рвота или обезвоживание;
 - Вы придерживаетесь диеты с ограничением поваренной соли.

Если Вы ощущаете признаки артериальной гипотензии, постарайтесь лечь на спину, слегка приподняв ноги.

Также сообщите врачу, если:

- у Вас сужение (стеноз) аорты (артерии, отходящей от сердца) или сужение сердечных клапанов (митрального клапана, через которое кровь поступает из левого предсердия в левый желудочек);
- у Вас имеется увеличение толщины сердечной мышцы (гипертрофическая кардиомиопатия);

- у Вас заболевание почек или почечных артерий, так как Вам могут потребоваться дополнительные анализы для оценки функции почек при подборе необходимой Вам дозы препарата и дальнейшего лечения;
- у Вас имеется нарушение функции печени;
- у Вас имеется системное заболевание соединительной ткани (например, системная красная волчанка, склеродермия);
- Вы получаете лечение иммунодепрессантами (препаратами, подавляющими иммунитет), аллопуринолом (препарат для лечения подагры), прокаинамидом (препарат для лечения нарушений сердечного ритма), так как совместный прием с лизиноприлом может повышать риск развития тяжелых инфекций. Врач может назначить Вам регулярный контроль анализов крови. Сообщите врачу о любых признаках инфекции;
- Вы принимаете препараты для лечения высокого артериального давления из группы блокаторов рецепторов ангиотензина II (также известные как сартаны, например, валсартан, телмисартан, ирберсартан и другие) или препараты, содержащие алискирен;
- у Вас наблюдается упорный сухой кашель на фоне приема препарата. Такого рода кашель может возникнуть на фоне приема и других препаратов группы ингибиторов АПФ;
- Вам предстоит проведение операции (включая стоматологические операции), так как возможно выраженное снижение артериального давления (артериальная гипотензия) при введении определенных местных или общих анестетиков на фоне применения препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ;
- у Вас повышен уровень калия в крови (гиперкалиемия) или Вы принимаете препараты, которые могут повысить уровень калия в крови;
- у Вас сахарный диабет;
- Ваш возраст старше 65 лет;
- Вам была выполнена пересадка (трансплантация) почки;
- у Вас наблюдается значительное повышение уровня гормона альдостерона в крови (первичный гиперальдостеронизм).

Ваш лечащий врач может регулярно проверять у Вас артериальное давление, функцию почек, содержание электролитов в крови (например, калия).

Аллергия, ангионевротический отек

При приеме ингибиторов АПФ, в том числе лизиноприла, может наблюдаться тяжелая аллергическая реакция с отеком лица, губ, языка или горла, затруднением глотания или дыхания (ангионевротический отек или отек Квинке), которая может возникнуть в любом периоде лечения. **В таких случаях прекратите прием препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью** (см. также раздел «Возможные нежелательные реакции»).

В редких случаях на фоне лечения ингибиторами АПФ может развиваться аллергическая реакция, сопровождающаяся болями в животе, тошнотой и рвотой (ангионевротический отек кишечника). Для уточнения диагноза Ваш врач может назначить Вам дополнительные обследования органов брюшной полости.

Риск развития ангионевротического отека повышается, если:

- ранее у Вас или Ваших родственников возникало подобное состояние (см. раздел «Не принимайте ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, если»);
- Вы принадлежите к негроидной расе. Вы можете быть подвержены более высокому риску развития ангионевротического отека, а также этот препарат может быть менее эффективен для Вас в снижении артериального давления по сравнению с пациентами другой расовой принадлежности;
- Вы принимаете следующие препараты (см. также раздел «Другие препараты и препарат ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ»):

- сиролимус, эверолимус, темсиролимус и другие препараты, относящиеся к ингибиторам mTOR (применяются для предотвращения отторжения пересаженных органов и при онкологических заболеваниях);
- сакубитрил/валсартан (применяется при лечении хронической сердечной недостаточности);
- ситаглиптин, саксаглиптин, вилдаглиптин, линаглиптин и другие препараты, относящиеся к глиптинам (применяются для лечения сахарного диабета);
- эстрамустин (применяется для лечения онкологических заболеваний);
- рацекадотрил (применяется для лечения диареи);
- тканевые активаторы плазминогена (применяются для растворения тромбов);
- препараты лития (применяются для лечения депрессии и других психических расстройств различного происхождения).

Тяжелые аллергические реакции также наблюдались у пациентов, получающих ингибиторы АПФ, которым проводили процедуру под названием «ЛПНП-аферез» с использованием декстран сульфата (лечение с целью снижения очень высокого уровня холестерина в крови), у пациентов, находящихся на гемодиализе, а также у пациентов, которые проходили десенсибилизирующее лечение (для снижения выраженности проявлений аллергии, например, при укусах ос и пчел).

Обязательно сообщите врачу, если Вам предстоит подобные процедуры, так как в подобных случаях лечение ингибиторами АПФ понадобится временно прекратить.

Другие препараты и препарат ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Лизиноприл может влиять на действие некоторых других лекарственных препаратов, и другие препараты могут влиять на действие препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ.

Сообщите своему лечащему врачу, если Вы принимаете какие-либо из нижеперечисленных препаратов:

- блокаторы рецепторов ангиотензина II, алискирен (см. также разделы «Особые указания и меры предосторожности» и «Не принимайте ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, если»), диуретики, препараты из группы бета-блокаторов, блокаторы «медленных» кальциевых каналов, сосудорасширяющие препараты (вазодилататоры) и другие препараты для лечения повышенного артериального давления;
- калийсберегающие диуретики (спиронолактон, амилорид, триамтерен, эплеренон), котримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол, применяется для лечения бактериальных инфекций), циклоспорин, такролимус (иммунодепрессанты, применяемые для профилактики отторжения пересаженного органа или аутоиммунных нарушений), гепарин (применяется для профилактики образования тромбов), пищевые добавки, содержащие калий (в том числе заменители соли) и другие препараты, которые могут увеличить содержание калия в крови;
- калийнесберегающие диуретики (при одновременном применении лизиноприла с калийнесберегающими диуретиками, гипокалиемия, вызванная их применением, может быть уменьшена);
- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП);
- аспирин (ацетилсалициловая кислота), если Вы принимаете более 3 грамм в сутки;
- инсулин или препараты для лечения сахарного диабета, принимаемые внутрь, так как может потребоваться контроль содержания глюкозы в крови;
- трициклические антидепрессанты, нейролептики, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, препараты лития, препараты для общей анестезии, наркотические

препараты, барбитураты и другие препараты для лечения депрессии или психических нарушений;

- эпинефрин, изопротеренол, добутамин, допамин (симпатомиметики);
- баклофен (применяется для расслабления скелетной мускулатуры);
- этанол (усиливает гипотензивное действие препарата);
- гормональные препараты, содержащие эстрогены (могут ослабить гипотензивный эффект лечения за счет задержки жидкости в организме);
- аллопуринол;
- прокаинамид;
- препараты для подавления иммунного ответа (цитостатики, иммунодепрессанты, глюкокортикоиды);
- препараты золота (натрия ауротиомалат внутривенно);
- антацидные препараты (для лечения изжоги) и колестирамин (для лечения повышенного холестерина), так как они могут снизить всасывание лизиноприла из желудочно-кишечного тракта.

Одновременное применение следующих препаратов с препаратом ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ может увеличить риск развития ангионевротического отека (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»):

- сиролимус, эверолимус, темсиролимус;
- ситаглиптин, саксаглиптин, вилдаглиптин, линаглиптин;
- эстрамустин;
- рацекадотрил;
- сакубитрил;
- тканевой активатор плазминогена.

Прием препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ с пищей, напитками и алкоголем

Не употребляйте алкоголь во время приема препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ. Алкоголь может усилить гипотензивное действие препарата.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не принимайте препарат ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, если Вы беременны.

Обязательно сообщите Вашему лечащему врачу, что Вы беременны или считаете, что можете быть беременны. Ваш врач вероятнее всего порекомендует Вам прекратить прием препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ до наступления беременности или сразу же, как только Вы узнали о беременности, и порекомендует Вам принимать другой препарат вместо него. Это связано с тем, что прием препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ может нанести серьезный вред здоровью ребенка.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, если Вы кормите ребенка грудью или планируете начать грудное вскармливание. Отсутствуют данные о проникновении препарата в грудное молоко.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Для приема внутрь.

Принимайте препарат ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ 1 раз в сутки утром, предпочтительно в одно и то же время, независимо от приема пищи.

Риска нанесена исключительно для облегчения разламывания таблетки при возникновении затруднений при ее проглатывании целиком (для таблеток ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, 20 мг).

Продолжительность лечения

Принимайте препарат столько времени, сколько рекомендует Ваш лечащий врач.

Лечение препаратом длительное.

Если Вы приняли препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ больше, чем следовало, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не забудьте взять с собой упаковку данного препарата или этот листок-вкладыш.

В случае передозировки у Вас могут возникнуть головокружение, потеря сознания (как следствие пониженного артериального давления). Если это случилось, примите горизонтальное положение и приподнимите ноги, это может облегчить Ваше состояние. Также у Вас могут возникнуть такие симптомы передозировки ингибиторами АПФ, как циркуляторный шок (коллапс из-за очень низкого артериального давления), нарушения водно-электролитного баланса (изменение содержания солей в организме), почечная недостаточность (нарушение функции почек), учащенное дыхание, ощущение учащенного или замедленного сердцебиения, сухость во рту, чувство беспокойства, кашель, повышенная раздражительность, сонливость, запор и задержка мочеиспускания.

Если Вы забыли принять препарат ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ

Если Вы забыли принять препарат, примите его как можно скорее. Однако, если подошло время следующего приема, забытую дозу следует пропустить.

Не принимайте двойную дозу препарата для восполнения пропущенной.

Если Вы прекратили принимать препарат ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ

Во избежание ухудшения Вашего состояния не прекращайте прием препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ самостоятельно, не проконсультировавшись с лечащим врачом.

Не следует резко прерывать лечение лизиноприлом или менять рекомендованную дозу без предварительной консультации с врачом, так как это может привести к ухудшению Вашего состояния.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ и немедленно обратитесь к врачу или в ближайшее отделение больницы, если у Вас возникнут какие-либо из следующих симптомов:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- тяжелые аллергические реакции, симптомы которых могут включать внезапное появление отека лица, губ, языка или горла, затруднения глотания, сильного или

внезапного отека рук, ног и лодыжек, затрудненного дыхания, сильного кожного зуда с образованием волдырей (ангионевротический отек).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- внезапное падение артериального давления, учащенный и слабый пульс, обморочное состояние, кожная сыпь, зуд, затрудненное дыхание или хрипы (анафилактические и анафилактоидные реакции);
- тяжелые кожные реакции, включающие кожную сыпь, часто начинающуюся с появления красных зудящих участков на лице, руках или ногах (мультиформная эритема), или интенсивные кожные высыпания, крапивницу, покраснение кожи на всей поверхности тела, сильный зуд, возникновение пузырей, шелушение и отек кожи, воспаление слизистых оболочек (Синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз).

Возможно развитие тяжелых нежелательных реакций. Немедленно сообщите врачу, если заметите следующие симптомы:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- сильное головокружение или потеря сознания, вызванные резким снижением артериального давления.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- внезапная слабость или потеря чувствительности лица, конечностей, особенно с одной стороны тела, внезапная спутанность сознания, сильная или продолжительная головная боль (острое нарушение мозгового кровообращения вследствие выраженного снижения артериального давления);
- боль, дискомфорт, давление, тяжесть, чувство сжатия или распираания в груди или за грудиной, холодный пот, тревога или одышка (сердечный приступ вследствие выраженного снижения артериального давления);
- уменьшение количества выделяемой мочи, появление отеков рук, ног (признаки острой почечной недостаточности).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- воспаление поджелудочной железы (панкреатит), признаками которого могут быть боли в животе, тошнота, рвота, нарушение пищеварения, общая болезненность или напряжение мышц живота;
- пожелтение кожных покровов и белков глаз (желтуха), потемнение мочи, которые могут быть симптомами нарушения функции печени, гепатита, печеночной недостаточности.

Другие нежелательные реакции

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;
- головокружение;
- кашель;
- диарея;
- рвота;
- нарушение функции почек.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- перепады настроения;
- нарушения сна;
- галлюцинации;
- чувство вращения предметов (вертиго);
- спонтанно возникающие ощущения жжения, покалывания (парестезия);
- изменения вкуса (дисгевзия);

- ощущение сердцебиения, учащенное сердцебиение (тахикардия);
- боль, онемение, похолодание и посинение в пальцах рук или ног (синдром Рейно),
- заложенность носа или насморк (ринит);
- тошнота, нарушение пищеварения, боль в животе;
- кожная сыпь;
- кожный зуд;
- импотенция (эректильная дисфункция);
- повышенная утомляемость, упадок сил (астения);
- изменения в анализах крови, включая повышение уровня калия, уровня «печеночных» ферментов, концентрации креатинина и мочевины.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (может проявляться такими симптомами, как головная боль, тошнота, рвота, потемнение мочи, нарушения сна, мышечная слабость или спазмы, судороги);
- спутанность сознания;
- нарушение обоняния;
- слабость;
- мышечные судороги;
- сонливость;
- замедление сердцебиения;
- боль в груди;
- ухудшение симптомов сердечной недостаточности;
- сухость во рту;
- псориаз (кожное заболевание);
- кожная сыпь;
- алопеция (выпадение волос);
- гинекомастия (увеличение молочных желез);
- изменения результатов анализа крови (повышение уровня билирубина, СОЭ, снижение концентрации натрия, гемоглобина, гематокрита, положительные результаты теста на антинуклеарные антитела).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- изменения результатов анализа крови, включая снижение количества эритроцитов (анемия), значительное снижение общего количества лейкоцитов или определенных типов лейкоцитов (лейкопения, нейтропения), снижение количества тромбоцитов, увеличение числа эозинофилов;
- увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия);
- аутоиммунные нарушения (заболевания, связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека);
- снижение концентрации глюкозы в крови;
- подавленное настроение;
- потеря сознания;
- ощущение боли и тяжести в области лица (синусит);
- чувство сжатия в груди, свистящее дыхание, связанное с бронхоспазмом;
- одышка;
- аллергическое воспаление легких (аллергический альвеолит, эозинофильная пневмония), может проявляться такими признаками, как нарушение дыхания, кашель, повышение температуры тела, ночная потливость;
- снижение аппетита или полная потеря аппетита (анорексия);

- воспаление кишечника, связанное с реакцией гиперчувствительности (интестинальный ангионевротический отек);
- повышенная потливость (гипергидроз);
- воспаление кровеносных сосудов (васкулит);
- покраснение или воспаление кожи из-за воздействия света (реакции фотосенсибилизации);
- появление пузырьков на коже;
- симптомы псевдолимфомы кожи, которые могут включать лихорадку, боль в мышцах и суставах, изменение показателей крови, воспаление кровеносных сосудов, кожная сыпь, повышенная чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей или другие кожные проявления;
- изменения количества выделяемой мочи (олигурия), отсутствие поступления мочи в мочевого пузырь (анурия).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- боль в суставах (артралгия);
- мышечная боль (миалгия).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
109012, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1.
Тел.: +7 800 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

Республика Беларусь

220037, Минск, Товарищеский пер., 2а
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Телефон: +375 (17) 242-00-29
Факс: +375 (17) 242-00-29
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Сайт: <https://www.rceth.by>

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана, район Байконур, ул. А.Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)
Электронная почта: farm@dari.kz
Сайт: <http://www.ndda.kz>

5. Хранение препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на контурной ячейковой упаковке и картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ содержит

Действующим веществом является: лизиноприл.

ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, 5 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 5 мг лизиноприла (в виде лизиноприла дигидрата).

Прочими (вспомогательными) веществами являются: маннитол, крахмал кукурузный, тальк, магния стеарат, кальция гидрофосфат дигидрат.

ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, 10 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 10 мг лизиноприла (в виде лизиноприла дигидрата).

Прочими (вспомогательными) веществами являются: маннитол, крахмал кукурузный, тальк, магния стеарат, кальция гидрофосфат дигидрат.

ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, 20 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 20 мг лизиноприла (в виде лизиноприла дигидрата).

Прочими (вспомогательными) веществами являются: маннитол, крахмал кукурузный, тальк, магния стеарат, кальция гидрофосфат дигидрат.

Внешний вид препарата ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ и содержимое упаковки

Таблетки.

ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, 5 мг, таблетки

Круглые таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской.

ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, 10 мг, таблетки

Круглые таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской.

ЛИЗИНОПРИЛ-ЛФ, 20 мг, таблетки

Круглые таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской.

Линия разлома (риска) на таблетках дозировкой 20 мг предназначена исключительно для упрощения разделения таблетки и ее проглатывания, а не разделения на равные дозы.

По 10, 15 или 20 таблеток дозировкой 5 мг, по 10 или 15 таблеток дозировкой 10 мг, по 10 таблеток дозировкой 20 мг в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По три или шесть контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток (дозировкой 5 мг и 10 мг), по две, три или шесть контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток (дозировкой 20 мг) вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

По две или четыре контурные ячейковые упаковки по 15 таблеток (дозировкой 5 мг), по одной, две или четыре контурные ячейковые упаковки по 15 таблеток (дозировкой 10 мг) вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

По одной или две контурные ячейковые упаковки по 20 таблеток (дозировкой 5 мг) вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь.
СООО «Лекфарм».
223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2А, к. 301.
Телефон: (01774)-53801.
Электронная почта: office@lekpharm.by.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Автономная некоммерческая организация «Национальный научный центр Фармаконадзора»
143026, г. Москва, Большой бульвар, д. 42, строение 1.
Телефон: 8 800 777-86-04 (круглосуточно).
Электронная почта: adversereaction@drugsafety.ru.

Республика Беларусь

СООО «Лекфарм»
Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2А, к. 301.
Телефон: (01774)-53801.
Электронная почта: office@lekpharm.by, sideeff@lekpharm.by.

Республика Казахстан

Представительство СООО «Лекфарм» в Республике Казахстан
050000, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 7.
БЦ «Нұрлы Тау», корпус 4а, офис 55.
Телефон: 8(727)-3110454, телефон 24/7: +77013285139.
Факс: 8(727)-3110455.
Электронная почта: baikenova@lekpharm.by.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза:
<http://www.eaeunion.org/>.