

**Инструкция по медицинскому применению  
ФУРАЦИЛИН ФЛ,  
таблетки для приготовления раствора  
для местного применения 20 мг**

**Действующее вещество: НИТРОФУРАЛ**

**ПЕРЕД ПРИЕМОМ ДАННОГО ПРЕПАРАТА ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ ЛИСТОК. ПОСКОЛЬКУ В НЕМ СОДЕРЖАТЬСЯ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС СВЕДЕНИЯ**

- Сохраните этот листок. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Этот препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим. Он может навредить этим людям, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в данном листке.

**СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО ЛИСТКА**

1. Что из себя представляет ФУРАЦИЛИН ФЛ, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом ФУРАЦИЛИН ФЛ
3. Применение ФУРАЦИЛИН ФЛ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение ФУРАЦИЛИН ФЛ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФУРАЦИЛИН ФЛ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Каждая таблетка ФУРАЦИЛИН ФЛ содержит действующее вещество нитрофурал.

Нитрофурал – синтетическое противомикробное средство для лечения бактериальных инфекций.

**ФУРАЦИЛИН ФЛ применяют**

- Наружно для лечения гнойных ран, пролежней, ожогов II-III степени, мелких повреждений кожи (в т.ч. ссадин, порезов, царапин, трещин).
- Местно для лечения острого тонзиллита, стоматита, гингивита.

**2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ФУРАЦИЛИН ФЛ**

**Не принимайте ФУРАЦИЛИН ФЛ если у Вас:**

- Повышенная чувствительность к нитрофуралу, производным нитрофурана или любому другому компоненту этого лекарства (см. раздел 6 «Содержимое упаковки и прочие сведения»)
- аллергические повреждения кожи
- сильно снижена функция почек

Если что-то из перечисленного касается Вас, сообщите об этом лечащему врачу или работнику аптеки.

**Меры предосторожности при приеме ФУРАЦИЛИН ФЛ:**

Только для наружного и местного применения!

В связи с отсутствием достаточных данных о безопасном применении препарата не рекомендуется применения у детей и подростков до 18 лет.

При применении лекарственного препарата возможно развитие повышенной чувствительности.

Чтобы избежать этого рекомендуется использовать препарат не более 5 дней.

В случаях применения препарата при тяжелых ожогах на больших **поверхностях** на фоне нарушения функции почек возможно прогрессирование почечной **недостаточности**.

Рекомендуется тщательное наблюдение за функцией почек при применении лекарственного препарата на больших поверхностях кожи, в частности при тяжелых ожогах. Использование нитрофурана может привести к чрезмерному росту грибков или бактерий, не чувствительных к лекарственному препарату, которые могут привести к развитию вторичной инфекции.

Если при применении лекарственного препарата симптомы заболевания сохраняются или состояние ухудшается, необходимо отменить применения лекарственного препарата и обратиться к врачу.

ЛП-№011332-РГ-ВУ

**УТВЕРЖДЕНО**

Министерство здравоохранения

Республики Беларусь

ПРИКАЗ № 04/08/2025/18-004

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001

#### **ФУРАЦИЛИН ФЛ несовместим с:**

- Эpineфрином (адреналин), тетракаином, прокайном (новокаин), резорцином (резорцин) и другими восстановителями, так как разлагается с образованием окрашенных в розовый или бурый цвет продуктов.
- Перманганатом калия, перекисью водорода и другими окислителями вследствие окисления лекарственного препарата.

#### **Беременность и кормление грудью**

При назначении беременным женщинам, женщинам в период грудного вскармливания рекомендуется учитывать возможное соотношение риска и пользы от применения данного лекарственного препарата.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с потенциально опасными механизмами не наблюдалось.

### **3. ПРИМЕНЕНИЕ ФУРАЦИЛИН ФЛ**

Всегда принимайте данный препарат точно так назначил лечащий врач. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если Вы не уверены.

#### **Как принимать ФУРАЦИЛИН ФЛ**

ФУРАЦИЛИН ФЛ применяется наружно и местно, в виде водного 0,02 % раствора. Для приготовления водного раствора 1 таблетку растворить в 100 мл воды (для быстрого растворения использовать горячую или кипящую воду). После этого раствор охладить до комнатной температуры.

При гнойных ранах, пролежнях, ожогах II-III степени, мелких повреждениях кожи рану орошают водным раствором ФУРАЦИЛИН ФЛ и накладывают влажные повязки.

При остром тонзиллите, стоматите, гингивите – полоскание рта и горла 100 мл 0,02 % раствора ФУРАЦИЛИН ФЛ (растворив 1 таблетку в 100 мл воды) 2-3 раза в день.

Продолжительность курса лечения по показаниям зависит от характера течения заболевания, локализации патологического процесса.

### **4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. При приеме препарата могут возникнуть следующие побочные эффекты:

аллергических реакций, включающие гиперемию, зуд, дерматиты, ангионевротический отек.

При появлении указанных либо других побочных реакций, неуказанный в инструкции, необходимо прекратить применения препарата и обратиться к врачу.

#### **Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в инструкции по применению препарата. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях через национальную систему сообщения о

нежелательных реакциях и неэффективности лекарственных препаратов (УП на экспертизу и испытаний в здравоохранении», <https://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

ЛП-№011332-РГ-ВУ  
УП УТВЕРЖДЕННО  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ПРИКАЗОМ от 04.08.2025 № 884  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001

## 5. ХРАНЕНИЕ ФУРАЦИЛИН ФЛ

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Срок годности: 2 года. Не применяйте данный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните в защищённом от света и влаги месте, при температуре не выше 25 °C.

Готовый раствор можно хранить в течение 14 дней в хорошо закупоренных банках из темного стекла, в прохладном (8-15°C) и защищенном от света месте.

## 6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

**ФУРАЦИЛИН ФЛ** содержит. Действующим веществом является нитрофурал. Каждая таблетка содержит 20 миллиграмм нитрофураля.

Вспомогательными веществами являются: натрия хлорид.

**Внешний вид таблеток ФУРАЦИЛИН ФЛ и содержимое упаковки**

**Форма выпуска и описание.** Таблетки для приготовления раствора для местного применения. Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета с неравномерной окраской поверхности, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской на одной стороне. Риска не предназначена для разделения таблетки.

**Упаковка.** По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из фольги алюминиевой и пленки поливинилхлоридной. По 30 таблеток в банках полимерных с крышкой натягиваемой с контролем первого вскрытия, уплотнительное средство – вата медицинская.

Одну, две или три контурные ячейковые упаковки или одну банку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают во вторичную упаковку (пачку) из картона коробочного.

**Условия отпуска из аптек:** Без рецепта.

**Производитель:**

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Фармлэнд» (СП ООО «Фармлэнд»), Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, к. 3, тел/факс (+375 17) 373-31-90.