

Листок-вкладыш – информация для пациента

Магнекор, 500 мг, таблетки

Магния оротат дигидрат

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Магнекор, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Магнекор.
3. Прием препарата Магнекор.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Магнекор.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Магнекор, и для чего его применяют

Препарат Магнекор содержит магний (в виде магния оротата дигидрата) и относится к минеральным добавкам (препаратам магния).

Препарат Магнекор применяется для лечения доказанного дефицита магния и симптомов, связанных с ним.

Сочетание следующих симптомов может свидетельствовать о дефиците магния:

- нервозность, раздражительность, слабая тревога, преходящая усталость, небольшие нарушения сна;
- признаки тревоги, такие как желудочно-кишечные спазмы или учащенное сердцебиение (при здоровом сердце);
- мышечные судороги, ощущение покалывания.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Магнекор

Не принимайте препарат Магнекор в следующих случаях:

- если у вас аллергия на магния оротат дигидрат или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у вас тяжелое нарушение функции почек;
- если у вас нарушения проводимости сердца (атриовентрикулярная блокада);
- если у вас миастения гравис (заболевание, которое приводит к развитию слабости мышц).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Магнекор проконсультируйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Дети

Препарат Магнекор не предназначен для применения у детей младше 18 лет.

Другие препараты и препарат Магнекор

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Магнекор не следует принимать одновременно с тетрациклинами (антибиотики), препаратами железа и натрия фторидом, так как может возникнуть взаимное нарушение их всасывания.

Между приемом внутрь указанных препаратов и препарата Магнекор необходимо соблюдать интервал не менее 2-3 часа.

Препарат Магнекор с пищей, напитками и алкоголем

Алкоголь способствует выведению магния и препятствует его всасыванию в организме, поэтому следует избегать его приема при лечении препаратом Магнекор.

Беременность, грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Эпидемиологическими исследованиями неблагоприятного влияния дополнительного приема магния на течение беременности и здоровье плода/новорожденного не установлено.

При наличии показаний препарат Магнекор можно принимать во время беременности и в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Особые меры предосторожности не требуются.

Препарат Магнекор содержит лактозу и натрий

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом препарата Магнекор.

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в максимальной суточной дозе (6 таблеток), то есть, по сути, не содержит натрия.

3. Прием препарата Магнекор

Всегда принимайте лекарственный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

По 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 7 дней для восполнения запасов магния (что эквивалентно 196,8 мг или 8,1 ммоль или 16,2 мЭкв магния).

Затем рекомендуется принимать по 2–3 таблетки в сутки (98,4 мг или 4,05 ммоль или 8,1 мЭкв магния).

Способ применения

Препарат Магнекор принимают внутрь, запивая небольшим количеством жидкости.

Риска предназначена лишь для разламывания с целью облегчения проглатывания, а не для деления на равные дозы.

Продолжительность приема

Продолжительность приема не ограничена.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если вам кажется, что действие препарата Магнекор слишком сильное или слишком слабое.

Если вы приняли препарата Магнекор больше, чем следовало

Прием высоких доз препарата обычно не приводит к передозировке. В случае появления симптомов передозировки следует обратиться к врачу. Симптомы передозировки обычно возникают у пациентов с тяжелыми заболеваниями почек.

Если вы забыли принять препарат Магнекор

Не принимайте двойную дозу для восполнения пропущенной. Примите дозу препарата Магнекор в обычное время и старайтесь не забывать о регулярном приеме препарата в будущем.

Если вы прекратили прием препарата Магнекор

Для успешного лечения препарат Магнекор следует принимать длительно. Если вы хотите прервать лечение или закончить его досрочно, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

При наличии дополнительных вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможно возникновение следующих нежелательных реакций.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- прием высоких доз препарата Магнекор может вызвать неустойчивый стул или диарею, которые обычно проходят самостоятельно при уменьшении суточной дозы.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: г. Минск, Товарищеский пер., 2а, 220037, Республика Беларусь

Тел: +375 (17) 242 00 29

5. Хранение препарата Магнекор

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 25°C.

Срок годности — 2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Магнекор содержит

Действующим веществом является магния оротат дигидрат.

1 таблетка содержит 500 мг магния оротата дигидрата (что соответствует 32,8 мг или 1,35 ммоль или 2,7 мЭкв магния).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются лактоза моногидрат, повидон К-30, кукурузный крахмал, тальк, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая.

Внешний вид препарата Магнекор и содержимое его упаковки

Таблетки.

Таблетки белого или почти белого цвета, овальной формы, закругленные на концах, с риской на одной стороне. Допускается наличие мраморности.

Риска предназначена лишь для разламывания с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из фольги алюминиевой и пленки поливинилхлоридной.

Три либо шесть контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона коробочного.

Порядок отпуска

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

Республика Беларусь, 222603, Минская область, Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, ком. 3

Адрес электронной почты: mail@pharmland.by

Производитель

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

Республика Беларусь, 222603, Минская область, Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124; ул. Ленинская, 124/1

Адрес электронной почты: mail@pharmland.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения и производителю.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации:

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте www.rceth.by.