

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)  
лекарственного средства  
**РОМАШКИ ЦВЕТКИ**  
(*MATRICARIAE FLORES*)

**Торговое название.** Ромашки цветки.

**Международное непатентованное название (МНН).** Отсутствует.

**Форма выпуска.** Цельное сырье.

**Описание.** Цельные или частично осыпавшиеся цветочные корзинки полушаровидной или конической формы, без цветоносов или с их остатками не длиннее 3 см. Цвет язычковых цветков белый, трубчатых – желтый, обертки – желтовато-зеленый. Запах сильный, ароматный.

Ромашки цветки содержат эфирное масло, флавоноиды, кумарины, органические кислоты, полисахариды, горечи и другие биологически активные вещества.

**Состав.** Ромашки цветки, 50 г.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта.

**Фармакологические свойства.** Средство растительного происхождения. По результатам экспериментальных исследований препараты ромашки оказывают противовоспалительное, антисептическое, спазмолитическое действие, способствуют заживлению ран.

**Показания к применению.** *Внутрь:* в составе комплексной терапии для симптоматического лечения функциональных нарушений пищеварения (метеоризм, легкие болевые ощущения спастического характера).

*Местно:* для полосканий в комплексной терапии нетяжелых воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

*Наружно:* в составе комплексной терапии для симптоматического лечения воспалительных заболеваний кожи и воспалительных процессов в аногенитальной области после консультации врача.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** 5 г (2 столовые ложки) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды

комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают (водяной бане) 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

*Внутрь* взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1/2-1 стакану 2-3 раза в день.

*Местно и наружно* взрослым и детям старше 12 лет применять для полосканий (по 1/2-1 стакану 3-5 раза в день), орошений, примочек.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Побочное действие.** Возможны реакции гиперчувствительности, включая тяжелые аллергические реакции после нанесения препаратов цветков ромашки на слизистые оболочки (нарушение дыхания, ангионевротический отек, сосудистый коллапс, анафилактический шок). Частота не известна.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Гиперчувствительность к ромашке, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема.

**Передозировка.** Информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Меры предосторожности.** Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

**Применение у детей.** Применение у детей до 12 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

**Применение во время беременности и кормления грудью.** Безопасность применения во время беременности и кормления грудью не доказана. Применение во время беременности и лактации не рекомендовано.

В случае наружного применения необходимо удалить лекарственное средство с молочной железы женщины, кормящей грудью, перед кормлением, чтобы предотвратить сенсибилизацию ребенка.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Исследования не проводились.

Получены сообщения о возможном взаимодействии препаратов цветков ромашки при приеме более двух месяцев в высоких дозах с лекарственными средствами, метаболизм которых происходит с участием ферментов системы CYP450 (циклюспорин у пациентов после пересадки почки).

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой.** Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C.

Приготовленный настой – в прохладном месте (при температуре от 8 °C до 15 °C) не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек.** Без рецепта.

**Срок годности.** 2 года.

*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!*

**Упаковка.** В пакеты бумажные или полипропиленовые по 50 г. По одному пакету вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

**Производитель.** ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, 223043, Минская область, Минский район, Папернянский с/с, д. Цнянка, ул. Армейская, д. 8, ком. 7. Тел. (017) 500 33 01, тел./факс (017) 500 33 46.

