

Листок-вкладыш – информация для потребителя
ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД,
крем для наружного применения 50 мг/г
Действующее вещество: декспантенол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 1 неделю, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД
3. Применение препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД
и для чего его применяют**

Препарат ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД, крем для наружного применения, содержит действующее вещество декспантенол. Декспантенол быстро проникает в клетки и превращается в пантотеновую кислоту, которая играет важную роль в клеточном обмене веществ и необходима для формирования и регенерации кожи и слизистых оболочек.

ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД применяется для:

- лечения сухой и раздраженной неповрежденной кожи: гиперемия, легкие ожоги (солнечные и бытовые), обработки шероховатых участков кожи (например, на кистях рук, локтях, коленях и т.п.).
- профилактической обработки сухой, покрасневшей кожи.
- ускорения заживления и эпителизации кожи при микроповреждениях (трещины, царапины), при кожных раздражениях в результате радио-, фототерапии или УФ-излучения.
- обработки кожи после применения кортикостероидов.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД**

Не применяйте ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД, если:

- у вас аллергия на декспантенол или на любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

В случае проявления аллергической реакции необходимо прекратить применение препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД.

Следует избегать попадания крема в глаза.

Другие препараты и препарат ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД

Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны.

Беременность и кормление грудью

ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.


Вождение автотранспорта и управление механизмами

Влияние на способность управления автотранспортом или работу с другими механизмами не выявлено.

Важная информация о некоторых вспомогательных веществах

Пантенол-Белмед содержит ланолин, стеариловый и цетиловый спирты, которые могут вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Пантенол-Белмед содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи.



3. Применение препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Для наружного применения у взрослых и детей.

Наносить крем тонким слоем несколько раз в день на пораженные участки кожи.

Длительность лечения зависит от характера и течения заболевания.

Если вы считаете, что действие лекарственного препарата слишком слабое или слишком сильное, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом.

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы по применению ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата возможно развитие аллергических реакций, в том числе кожных – контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема (покраснение), экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи, пузырьковая сыпь.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», www.rceth.by).

Кроме того, информацию о выявленных нежелательных реакциях вы можете предоставить в адрес держателя регистрационного удостоверения – РУП «Белмедпрепараты»:

- по телефонам +375-44-781-06-00 либо +375-17-222-78-38;

- посредством электронной почты pharmacovigilance@belmedpreparaty.com.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Срок годности–2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1 г крема содержит *действующее вещество*: декспантенол (D-пантенол) – 50 мг.

Вспомогательные вещества: Изопропилмиристат, цетиловый спирт, стеариловый спирт, пропиленгликоль, ланолин, калия цетил фосфат (Amphisol K), DL-пантолактон, феноксиэтанол, вода очищенная.

Внешний вид препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД и содержимое упаковки

ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД, крем для наружного применения 50 мг/г – однородный крем белого или белого с желтоватым оттенком цвета со слабым специфическим запахом.

По 30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: