

**Листок-вкладыш – информация для пациента**  
**ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ, 60 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**  
**ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ, 90 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**  
**ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ, 120 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**  
**Действующее вещество: эторикоксиб**

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре.
- Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ
3. Применение препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что из себя представляет препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ, и для чего его применяют**

Лекарственный препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ содержит в качестве действующего вещества эторикоксиб. Эторикоксиб относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), селективных ингибиторов циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2).

Препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ обладает противовоспалительным и болеутоляющим действием.

Препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ показан взрослым и подросткам в возрасте 16 лет и старше для:

- уменьшения боли и воспаления в суставах и мышцах при остеоартрите, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите и подагрическом артрите;
- краткосрочного лечения умеренной боли после стоматологических операций.

**Что такое остеоартрит?**

Остеоартрит – это заболевание, которое развивается в результате постепенного разрушения хряща. Это приводит к развитию отека, воспаления, боли, скованности и инвалидности.

### **Что такое ревматоидный артрит?**

Ревматоидный артрит – хроническое воспалительное заболевание суставов, которое вызывает боль, скованность, отек и постепенную потерю подвижности суставов.

### **Что такое анкилозирующий спондилит?**

Анкилозирующий спондилит – воспалительное заболевание позвоночника и крупных суставов.

### **Что такое подагрический артрит?**

Подагрический артрит – это заболевание, при котором возникают внезапные повторяющиеся приступы очень болезненного воспаления и покраснения суставов. Подагрический артрит характеризуется отложением в тканях и суставах солей мочевой кислоты (уратов), вызванным нарушением обмена веществ.

**Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.**

## **2. О чем следует знать перед применением препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ**

### **Не принимайте ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ, если:**

- у Вас аллергия на эторикоксив или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у Вас активная язва или желудочно-кишечное кровотечение;
- у Вас в прошлом возникали аллергические реакции (бронхоспазм, насморк, отек лица и/или языка, сыпь, зуд) после применения ацетилсалациловой кислоты или нестероидных противовоспалительных препаратов, включая ингибиторы ЦОГ-2;
- у Вас тяжелые заболевания печени;
- у Вас тяжелые заболевания почек;
- у Вас воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона);
- у Вас застойная сердечная недостаточность (NYHA II—IV);
- у Вас артериальная гипертензия, при которой показатели артериального давления постоянно выше 140/90 мм рт. ст. и не контролируются в достаточной мере;
- у Вас установленная ишемическая болезнь сердца, заболевания периферических артерий и/или сердечно-сосудистое заболевание;
- Вы беременны и/или кормите грудью;
- Вы младше 16 лет.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ проконсультируйтесь с лечащим врачом, или работником аптеки, или медицинской сестрой.

### **Прежде чем принимать препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, если:**

- у Вас желудочное кровотечение, или язвенная болезнь желудка в анамнезе, или Вы принимаете другие нестероидные противовоспалительные препараты;
- у Вас сердечная недостаточность или любое другое заболевание сердца в анамнезе;
- у Вас повышенное артериальное давление в анамнезе. У некоторых людей эторикоксив, особенно в высоких дозах, может повышать артериальное давление, поэтому Ваш лечащий врач будет периодически контролировать артериальное давление;
- у Вас заболевание почек в анамнезе;
- у Вас обезвоживание, например, из-за продолжительного приступа рвоты или диареи;

- у Вас отечность из-за задержки жидкости в организме;
- у Вас заболевание печени в анамнезе;
- у Вас инфекция. Эторикоксиб может маскировать повышение температуры тела, которое является симптомом инфекционного заболевания;
- у Вас диабет, высокий уровень холестерина или Вы курите. Эти факторы могут повышать риск развития заболеваний сердца;
- Вы женщина, которая планирует беременность;
- Вам больше 65 лет (необходим соответствующий контроль со стороны лечащего врача).

Если во время лечения у Вас наблюдается ухудшение одного из состояний, указанных выше, следует предпринять соответствующие меры и рассмотреть вопрос о прекращении применения эторикоксиба.

При применении эторикоксиба у пациентов пожилого возраста и у пациентов с нарушением функции почек, печени или сердца необходимо соответствующее медицинское наблюдение.

#### **Дети и подростки**

Препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ применяется у подростков старше 16 лет.

Безопасность и эффективность препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ у детей и подростков младше 16 лет не установлены.

#### **Другие препараты и препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ**

Сообщите врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Особые меры предосторожности необходимы при совместном применении препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ со следующими препаратами:

- препараты, препятствующие свертыванию крови (perorальные антикоагулянты, например, варфарин);
- диуретики (мочегонные препараты);
- препараты, снижающие артериальное давление (ингибиторы АПФ (например, эналаприл, рамиприл) и антагонисты ангиотензина II (например, валсартан, лозартан));
- ацетилсалициловая кислота и другие нестероидные противовоспалительные препараты (эторикоксиб можно применять одновременно с ацетилсалициловой кислотой в низких дозах, предназначенных для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний; но одновременное применение эторикоксиба с ацетилсалициловой кислотой в дозах, превышающих рекомендованные для профилактики сердечно-сосудистых осложнений, а также с другими нестероидными противовоспалительными препаратами не рекомендуется);
- циклоспорин и тациримус (препараты, применяемые для лечения заболеваний иммунной системы и при трансплантации органов);
- препараты лития (применяемые для лечения некоторых типов депрессии);
- метотрексат (препарат, подавляющий иммунную систему, часто применяется при ревматоидном артрите);
- пероральные контрацептивы (противозачаточные препараты) (совместное применение с эторикоксибом может увеличить риск развития нежелательных реакций);
- заместительная гормональная терапия (совместное применение с эторикоксибом может увеличить риск развития нежелательных реакций);
- дигоксин (препарат для лечения сердечной недостаточности и некоторых нарушений сердечного ритма; совместное применение с эторикоксибом может увеличить риск развития нежелательных реакций);

- сальбутамол в форме таблеток или раствора для приема внутрь (препарат для лечения астмы);
- миноксидил (препарат для лечения высокого артериального давления);
- рифампицин (антибактериальный препарат, применяемый для лечения туберкулеза).

### **ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ с пищей, напитками и алкоголем**

Начало эффекта препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ наступает быстрее, если препарат принимать перед приемом пищи.

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения данного препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Беременность**

Применение препарата в период беременности противопоказано.

Препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ не следует принимать во время беременности. В случае наступления беременности следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с лечащим врачом. Если Вы не уверены или Вам требуется дополнительная информация, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

#### **Грудное вскармливание**

Неизвестно, выделяется ли эторикоксиб с грудным молоком. Если Вы кормите грудью или планируете грудное вскармливание, проконсультируйтесь с врачом перед приемом препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ. Не рекомендуется кормить грудью, если Вы принимаете препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ.

#### **Фертильность**

Препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ не рекомендуется применять женщинам, планирующим беременность.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Сообщалось о головокружении и сонливости у некоторых пациентов, принимавших эторикоксиб.

Если Вы испытываете головокружение или сонливость, не следует управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### **3. Применение препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Это поможет Вам получить лучшие результаты лечения и снизить риск развития нежелательных реакций.

#### **Рекомендуемая доза**

Ваш лечащий врач подберет необходимую для Вас дозу препарата.

Препарат следует применять в минимальной эффективной дозе минимально возможным коротким курсом из-за риска осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы (риск развития инфарктов и инсультов).

#### **Остеоартрит**

Рекомендуемая доза составляет 30 мг 1 раз в сутки, при необходимости дозу можно увеличить до максимальной 60 мг 1 раз в сутки\*.

\*следует учитывать, что препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ не выпускается в дозировке 30 мг; при необходимости применения эторикоксиба в данной дозировке следует применять другие препараты, обеспечивающие требуемую разовую дозу.

### **Ревматоидный артрит**

Рекомендуемая доза составляет 60 мг 1 раз в сутки, при необходимости дозу можно увеличить до максимальной 90 мг 1 раз в сутки.

### **Анкилозирующий спондилит**

Рекомендуемая доза составляет 60 мг 1 раз в сутки, при необходимости дозу можно увеличить до максимальной 90 мг 1 раз в сутки.

### **Острая боль**

Эторикоксиб следует применять только в период острой боли.

#### **– Острая боль при подагрическом артите**

Рекомендуемая в островом периоде доза составляет 120 мг 1 раз в сутки. Продолжительность применения препарата в дозе 120 мг составляет не более 8 дней.

#### **– Острая боль после стоматологической операции**

Рекомендуемая доза составляет 90 мг 1 раз в сутки. Продолжительность применения препарата в дозе 90 мг составляет не более 3 дней.

### **Особые группы пациентов**

#### **Пациенты пожилого возраста**

Коррекция дозы у пациентов пожилого возраста не требуется. Как и при применении других препаратов, следует соблюдать осторожность у пациентов пожилого возраста.

#### **Пациенты с печеночной недостаточностью**

У пациентов с нарушениями функции печени легкой степени тяжести не следует превышать дозу 60 мг 1 раз в сутки.

У пациентов с нарушениями функции печени умеренной степени тяжести не следует превышать дозу 30 мг 1 раз в сутки.

Прием препарата противопоказан у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени.

#### **Пациенты с почечной недостаточностью**

Коррекция дозы у пациентов с нарушениями функции почек легкой и умеренной степени тяжести не требуется.

Прием препарата противопоказан у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек.

#### **Дети и подростки**

Препарат ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ применяется у подростков старше 16 лет.

Безопасность и эффективность препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ у детей и подростков младше 16 лет не установлены.

### **Способ применения**

Для приема внутрь.

Препарат можно принимать независимо от приема пищи.

Начало эффекта препарата наступает быстрее, если препарат принимать перед приемом пищи.

### **Если Вы приняли препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ больше, чем следовало**

Если Вы приняли таблетку больше, чем следовало, то немедленно обратитесь к врачу или в ближайшее медицинское учреждение. Не забудьте взять с собой упаковку данного препарата или этот листок-вкладыш.

При передозировке препарата могут возникать нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, почек.

## Если Вы забыли принять ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ

Важно применять препарат регулярно, строго в соответствии с рекомендациями Вашего лечащего врача.

Если Вы пропустили прием дозы, следует продолжить прием препарата по обычной схеме на следующий день. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

**При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре.**

### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Следует немедленно прекратить прием препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ и обратиться за медицинской помощью в случае появления любых из следующих симптомов:**

- появление или усиление одышки, боли в груди или отека лодыжек;
- пожелтение кожи и глаз (желтуха);
- сильная или постоянная боль в животе или покернение стула;
- аллергическая реакция, которая может включать такие проблемы с кожей, как язвы или волдыри, или отек лица, губ, языка или горла, что может вызвать затруднение дыхания.

**Очень часто (могут возникать у более чем у 1 человека из 10):**

- боль в животе.

**Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):**

- альвеолярный остеит (осложнение после удаления зуба);
- отеки или задержка жидкости;
- головокружение;
- головная боль;
- пальпитация (нерегулярное сердцебиение, ощущаемое как усиленное сердцебиение, пропущенные или дополнительные удары сердца);
- аритмия (нарушение сердечного ритма);
- артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление);
- бронхоспазм;
- запор;
- метеоризм (вздутие живота);
- гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка);
- изжога или гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод);
- диарея;
- диспепсия (расстройство пищеварения) или дискомфорт в области живота;
- тошнота;
- рвота;
- эзофагит (воспаление пищевода);
- язвы слизистой оболочки полости рта;
- повышение уровня АСТ, повышение уровня АЛТ (повышение уровня печеночных ферментов);
- экхимоз (кровоизлияние в кожу или слизистые оболочки);
- астения (повышенная утомляемость) или слабость;
- гриппоподобный синдром.

**Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):**

- гастроэнтерит (воспаление желудочно-кишечного тракта);
- инфекции верхних дыхательных путей;
- инфекции мочевыводящего тракта;
- анемия (снижение уровня эритроцитов и/или гемоглобина в крови, в основном в результате желудочно-кишечного кровотечения);
- лейкопения (снижение уровня лейкоцитов в крови);
- тромбоцитопения (снижение уровня тромбоцитов в крови);
- реакции гиперчувствительности (аллергические реакции);
- снижение или усиление аппетита;
- увеличение массы тела;
- тревожность;
- депрессия;
- ухудшение умственной деятельности;
- галлюцинации;
- дисгевзия (нарушение вкуса);
- бессонница;
- парестезия или гипестезия (нарушения чувствительности);
- сонливость;
- нечеткость зрения;
- конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза);
- звон в ушах;
- вертиго (головокружение);
- фибрилляция предсердий (нерегулярные и нередко частые сокращения сердца);
- тахикардия (учащенное сердцебиение);
- застойная сердечная недостаточность;
- неспецифические изменения на ЭКГ;
- стенокардия (приступ давящей боли в области сердца);
- инфаркт миокарда;
- приливы (ощущение жара);
- инсульт, ишемические нарушения мозгового кровообращения;
- гипертонический криз (резкое повышение артериального давления);
- васкулит (воспаление кровеносных сосудов);
- кашель;
- диспноэ (одышка);
- носовое кровотечение;
- вздутие живота;
- изменение перистальтики кишечника (изменение частоты и характера стула);
- сухость слизистой оболочки полости рта;
- гастродуodenальные язвы (язвы желудка или двенадцатиперстной кишки);
- пептические язвы (язвы желудка), включая желудочно-кишечные перфорации и кровотечения;
- синдром раздраженного кишечника;
- панкреатит (воспаление поджелудочной железы);
- отек лица;
- зуд;
- сыпь;
- эритема (покраснение кожи);

- крапивница (красные волдыри, сопровождающиеся зудом);
- спазмы или судороги мышц;
- скелетно-мышечная боль или скованность;
- протеинурия (белок в моче);
- повышение уровня креатинина в сыворотке крови;
- почечная недостаточность/нарушение функции почек;
- боль в грудной клетке;
- повышение уровня азота мочевины крови;
- повышение уровня креатинфосфокиназы;
- гиперкалиемия (повышение уровня калия в крови);
- повышение уровня мочевой кислоты.

**Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):**

- ангионевротический отек (быстро развивающийся отек лица, губ, языка и горла, который может приводить к затруднению дыхания);
- анафилактические и анафилактоидные реакции, включая шок (быстро развивающиеся, опасные для жизни аллергические реакции, требующие немедленной медицинской помощи);
- спутанность сознания;
- беспокойство;
- гепатит (воспаление печени);
- печеночная недостаточность (нарушение функции печени);
- желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);
- синдром Стивенса-Джонсона (характеризуется повышением температуры, красными пятнами на коже, болью в суставах и/или воспалением глаз);
- токсический эпидермальный некролиз (внезапная тяжелая реакция гиперчувствительности с повышением температуры, образованием пузырей, плоской красной сыпи или шелушением кожи);
- фиксированная лекарственная эритема (сыпь, характеризующаяся повторными высыпаниями на одних и тех же участках кожи после приема каких-либо лекарственных препаратов);
- снижение уровня натрия в крови.

**Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):**

- внутричерепное кровоизлияние;
- тромбоз глубоких вен (образование сгустков крови в венах ноги, что может вызвать боль, отек и/или покраснение);
- легочная эмболия (закупорка кровеносных сосудов легких сгустком крови, при которой может возникать внезапная одышка или острая боль при дыхании).

**Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить  
безопасности препарата.

**Республика Беларусь**

220037, Минск, Товарищеский пер., 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by)

Сайт: <https://www.rceth.by>

**5. Хранение препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от остатков препарата, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

**6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

**ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ, 60 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:

**действующее вещество:** эторикоксиб – 60 мг;

**вспомогательные вещества:** кальция гидрофосфат дигидрат, кроскармеллоза натрия, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая;

**состав пленочной оболочки зеленой:** (ГПМЦ 2910/Гипромеллоза, гидроксипропилцеллюлоза, тальк, титана диоксид Е 171, краситель Голубой №2/ Индигокармин алюминиевый лак 3% – 5% Е 132, хинолиновый желтый алюминиевый лак 18% - 24% Е 104).

**ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ, 90 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:

**действующее вещество:** эторикоксиб – 90 мг;

**вспомогательные вещества:** кальция гидрофосфат дигидрат, кроскармеллоза натрия, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая;

**состав пленочной оболочки зеленой:** (ГПМЦ 2910/Гипромеллоза, гидроксипропилцеллюлоза, тальк, титана диоксид Е 171, краситель Голубой №2/ Индигокармин алюминиевый лак 3% – 5% Е 132, хинолиновый желтый алюминиевый лак 18% - 24% Е 104).

**ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ, 120 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:

**действующее вещество:** эторикоксиб – 120 мг;

**вспомогательные вещества:** кальция гидрофосфат дигидрат, кроскармеллоза натрия, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая;

**состав пленочной оболочки зеленой:** (ГПМЦ 2910/Гипромеллоза, гидроксипропилцеллюлоза, тальк, титана диоксид Е 171, краситель Голубой №2/ Индигокармин алюминиевый лак 3% – 5% Е 132, хинолиновый желтый алюминиевый лак 18% - 24% Е 104).

**Внешний вид препарата ЭТОРИКОКСИБ-ЛФ и содержимое упаковки**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки двояковыпуклой круглой формы, покрытые пленочной оболочкой светло-зеленого цвета.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По одной или три контурных ячейковых упаковки по 10 таблеток вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

**Условия отпуска:** по рецепту врача.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

СООО «Лекфарм», Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2А, к. 301.

Тел./факс: (01774)-53801.

Электронная почта: office@lekpharm.by.

**За любой информацией о лекарственном препарате, а также в случаях появления претензий, возникновения нежелательных реакций следует обращаться в отдел фармаконадзора и медицинской поддержки держателя регистрационного удостоверения:**

**Республика Беларусь**

СООО «Лекфарм», Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2А, к. 301.

Тел./факс: (01774)-53801.

Электронная почта: office@lekpharm.by, sideeff@lekpharm.by.

**Листок-вкладыш пересмотрен:**

**Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертизы и испытаний в здравоохранении»: [www.rceth.by](http://www.rceth.by).