

Листок-вкладыш – информация для потребителя
Календулы настойка, настойка для наружного применения,
Действующее вещество: календулы лекарственной цветки

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения:

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 5 дней, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Календулы настойка, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Календулы настойка.
3. Применение препарата Календулы настойка.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Календулы настойка.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ КАЛЕНДУЛЫ
НАСТОЙКА, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Биологически активные вещества, содержащиеся в цветках календулы (ноготков) (тритерпеновые сапонины, флавоноиды, эфирное масло, сесквитерпены, тритерпены, полисахариды), оказывают местное противовоспалительное, антисептическое и заживляющее действие.

Лекарственный препарат Календулы настойка применяется:

- для полосканий в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит) и глотки (тонзиллит);
- для симптоматического лечения легких воспалительных процессов кожи и небольших поверхностных ран.

Применение по указанным показаниям основывается только на опыте продолжительного применения.

Если через 5 дней улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА

Противопоказания

Не применяйте препарат Календулы настойка:

- если у Вас аллергия на цветки календулы, а также на растения семейства астровых (сложноцветных), такие как ромашка, арника, амброзия, пижма, астра, полынь, хризантема или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вашему ребенку не исполнилось 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи);
- если Вашему ребенку не исполнилось 12 лет для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки);
- если Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Календулы настойка проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если в течение 5–7 дней непрерывного применения лекарственного препарата Календулы настойка состояние не улучшается или симптомы сохраняются – обратитесь к врачу.

В случае ухудшения состояния или появления признаков инфицирования раны – обратитесь к врачу.

Лекарственный препарат содержит этиловый спирт.

Дети и подростки

Препарат не рекомендуется к применению у детей до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи) и детей до 12 лет для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки) вследствие вероятной небезопасности.

Другие препараты и препарат Календулы настойка.

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами не установлены.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Не применяйте лекарственный препарат в период беременности и грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Лекарственный препарат содержит этиловый спирт!

При случайном приеме внутрь лекарственный препарат влияет на способность управлять автотранспортом и другими механизмами.

Следует соблюдать осторожность во время местного применения лекарственного препарата.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Для приготовления раствора 1 чайную ложку календулы настойки разводят в стакане теплой кипяченой воды. Приготовленный раствор применяют для полоскания полости рта и глотки и для наружного применения (повязки, аппликации).

Применение у детей

Режим дозирования у детей соответствует режиму дозирования у взрослых.

Препарат не рекомендуется к применению у детей до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи) и детей до 12 лет для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки) в связи с отсутствием достаточных данных.

Способ применения

Для наружного применения.

При полоскании полости горла не следует глотать приготовленный раствор.

Способ применения при заболеваниях кожи зависит от характера поражения и определяется врачом.

Продолжительность терапии

Длительность курса лечения определяется индивидуально с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного препарата и достигнутого эффекта.

Не рекомендуется назначать длительное применение настойки из-за содержания этанола.

Если вы применили препарата Календулы настойка больше, чем следовало

При избыточном применении препарата Календулы настойка возможно усиление нежелательных реакций, указанных в разделе 4 листка-вкладыша.

При появлении нежелательных реакций необходимо прекратить применение лекарственного препарата и обратиться к врачу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат может вызывать другие, нежели указанные ниже нежелательные реакции.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данном листке-вкладыше, следует прекратить применение лекарственного препарата и обратиться к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а.

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242 00 29; факс: +375 (17) 242 00 29.

Электронная почта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by

<http://www.rceth.by>

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте. Беречь от огня.

Срок годности – 3 года.

Не принимайте препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Календулы настойка содержит в качестве действующего вещества цветки календулы лекарственной.

1 мл препарата содержит 1 мл календулы лекарственной цветков (*Calendulae officinalis flores*) настойки (эквивалентно 100 мг календулы цветков (ноготков цветки): спиртовое извлечение из календулы цветков 1:10).

Вспомогательным веществом является этанол (спирт этиловый) 70 % (об/об).

Внешний вид препарата Календулы настойка и содержимое упаковки
Прозрачная жидкость от желтовато-коричневого до желтовато-бурого цвета со специфическим запахом. В процессе хранения возможно выпадение осадка. По 50 мл в бутылки / флаконы полимерные с полиэтиленовой пробкой-капельницей и навинчиваемой пластмассовой / полимерной крышкой в упаковке № 1 с листком-вкладышем.

Условия отпуска:

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА», 223043, Минская обл., Минский р-н, с/с Папернянский, д. Цнянка, улица Армейская, д. 8, ком. 7

Тел.: (017) 500-33-01, тел./факс: (017) 500-33-46

E-mail: info@belaseptika.by

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте: www.rceth.by.