



1.3. Общая характеристика лекарственного препарата, инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш), маркировка

1.3.1. Проекты общей характеристики лекарственного препарата, инструкции по медицинскому применению (листка-вкладыша), составленные в соответствии с требованиями актов органов Евразийского экономического союза на русском языке

1.3.1.2. Проект инструкции по медицинскому применению (листка-вкладыша), составленный в соответствии с требованиями актов органов Евразийского экономического союза на русском языке

**Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата –
информация для потребителя
БОРНАЯ КИСЛОТА,
порошок для приготовления раствора для наружного применения**

Перед применением препарата полностью прочитайте инструкцию по медицинскому применению, поскольку в ней содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните инструкцию по медицинскому применению. Возможно, Вам потребуется прочитать ее еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 инструкции по медицинскому применению.

Содержание инструкции по медицинскому применению

1. Что собой представляет препарат БОРНАЯ КИСЛОТА, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата БОРНАЯ КИСЛОТА
3. Применение препарата БОРНАЯ КИСЛОТА
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата БОРНАЯ КИСЛОТА
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат БОРНАЯ КИСЛОТА,
и для чего его применяют**

Препарат БОРНАЯ КИСЛОТА обладает антисептической и фунгистатической активностью и применяется при дерматите, пиодермии, мокнущей экземе, опрелостях.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата БОРНАЯ КИСЛОТА**

Не применяйте препарат БОРНАЯ КИСЛОТА, если:

- у Вас повышенная чувствительность к борной кислоте;
- у Вас нарушение функции почек;
- Вы беременны или кормите грудью;
- препарат противопоказан детям до 18 лет.

Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из вышеперечисленного, сообщите об этом лечащему врачу перед применением препарата.

Особые указания и меры предосторожности

Водный раствор готовят из порошка непосредственно перед применением. Не наносите раствор борной кислоты на обширные поверхности тела, а также не используйте для промывания полостей и при острых воспалительных заболеваниях участков кожи, покрытых волосами. Недопустимо попадание лекарственного средства в глаза.

Не наносите раствор на поврежденную поверхность кожи. Избегайте вдыхания частиц порошка при приготовлении раствора во избежание ингаляционной токсичности. Для предотвращения вдыхания частиц порошка рекомендуется использовать респиратор.

Вскрытый пакет рекомендуется полностью использовать для приготовления раствора. Открытый, но не использованный до конца пакет с порошком храните тщательно закрытым в недоступном для детей месте.

Другие препараты и БОРНАЯ КИСЛОТА

При наружном применении случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами не описаны.

Дети и подростки

Применение противопоказано.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Применение препарата во время беременности и кормления грудью противопоказано.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Не влияет на способность к управлению автотранспортом и работе с потенциально опасными механизмами.

3. Применение препарата БОРНАЯ КИСЛОТА

Наружно. Пораженные участки кожи обрабатывают с помощью салфетки, предварительно смоченной в 3 % водном растворе лекарственного средства, 2-3 раза в сутки. На ограниченные мокнущие участки раствор лекарственного средства применяется в виде примочек в течение 1-2 часов.

Длительность курса лечения – не более 3-5 дней.

Приготовление раствора препарата. Содержимое пакета массой 2 г растворить в 65-70 мл горячей кипяченой воды, раствор остудить до комнатной температуры и использовать для примочек. Для приготовления раствора из пакета массой 10 г и 20 г отмерить половину чайной ложки порошка (что соответствует примерно 2,5 г) и растворить в 80-85 мл горячей кипяченой воды, раствор остудить до комнатной температуры и использовать для примочек.

Водный раствор готовят из порошка непосредственно перед применением. Открытый, но не использованный до конца пакет с порошком следует хранить тщательно закрытым.

Применение у детей и подростков противопоказано.

Если Вы случайно приняли внутрь или вдохнули препарат БОРНАЯ КИСЛОТА

Острая передозировка может сопровождаться рвотой, сине-зелеными рвотными массами, диареей, падением артериального давления, ярко-красной кожной сыпью. Другие симптомы могут включать судороги, лихорадку, отслаивание эпителия, задержку мочеиспускания, мышечные подергивания, кому.

При длительном применении лекарственного средства на больших по площади участках кожи могут возникать симптомы хронической интоксикации: отек тканей, истощение, воспаление слизистой оболочки полости рта, экзема (воспаление поверхностных слоев кожи), нарушение менструального цикла, анемия, патологическое выпадение волос.

При появлении данных симптомов немедленно прекратите применение лекарственного средства и обратитесь к врачу!

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, БОРНАЯ КИСЛОТА может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможно раздражение чувствительной кожи, аллергические реакции.

Возможно (особенно при передозировке, длительном применении, нарушении функции

почек) развитие острых и хронических реакций – тошноты, рвоты, головной боли, спутанности сознания, судорог, диареи, кожной сыпи, отслаивания эпителия, задержки мочеиспускания, в редких случаях – шоковые состояния.

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данной инструкции по медицинскому применению.

Сообщение о нежелательных реакциях

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата БОРНАЯ КИСЛОТА

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Не применяйте препарат, если Вы заметили, что пакет, в котором находится порошок, поврежден.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав на один пакет: борная кислота – 2 г, 10 г или 20 г.

Внешний вид препарата БОРНАЯ КИСЛОТА

БОРНАЯ КИСЛОТА, порошок для приготовления раствора для наружного применения, представляет собой белый или почти белый кристаллический порошок, бесцветные блестящие жирные на ощупь пластинки либо белые или почти белые кристаллы.

Упаковка

По 2 г, 10 г или 20 г в пакетах из бумаги ламинированной, или материала упаковочного, или ленты упаковочной, вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Инструкция по медицинскому применению пересмотрена: