

**Листок-вкладыш - информация для пациента
Нозакар Инфант, 0,1 мг/мл, капли назальные**

Действующее вещество: оксиметазолина гидрохлорид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Нозакар Инфант, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Нозакар Инфант.
3. Применение препарата Нозакар Инфант.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Нозакар Инфант.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Нозакар Инфант и для чего его применяют

Препарат Нозакар Инфант содержит действующее вещество оксиметазолина гидрохлорид и относится к препаратам, уменьшающим отек слизистой носа и восстанавливающим свободное носовое дыхание (деконгестанты).

Показания к применению

Препарат Нозакар Инфант применяется у детей в возрасте до 1 года для:

- устранения затруднения носового дыхания при остром рините, аллергическом или вазомоторном рините;
- восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух носа, а также евстахиите, среднем отите;
- для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.

Препарат Нозакар Инфант обладает сосудосуживающим действием, уменьшает отек слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание. Также Нозакар Инфант способствует открытию и расширению придаточных пазух носа и евстахиевой трубы. В результате улучшается отток секрета и предупреждается осаждение бактерий на слизистой оболочке. Устранение отека слизистой способствует восстановлению аэрации придаточных пазух носа

и полости внутреннего уха, что предотвращает развитие бактериальных осложнений (гайморита, синусита, среднего отита).

Если улучшение не наступило или Ваш ребенок чувствуете ухудшение через 7 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Нозакар Инфант

Противопоказания

Не применяйте препарат Нозакар Инфант, если у Вашего ребенка:

- аллергия на действующие вещества или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- атрофический ринит;
- закрытоугольная глаукома;
- состояние после трансфеноидальной гипофизэктомии или других хирургических процедур, которые могли привести к повреждению твердой мозговой оболочки.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Нозакар Инфант проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Посоветуйтесь с вашим лечащим врачом, если у Вашего ребенка:

- повышенное внутриглазное давление (закрытоугольная глаукома);
- тяжелая форма сердечно-сосудистого заболевания (например, ишемическая болезнь сердца) или артериальная гипертензия;
- феохромоцитома;
- нарушение обмена веществ (например, гипертиреоз, сахарный диабет);
- порфирия;
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Не допускайте попадания лекарственного препарата в глаза.

Не применяйте препарат в дозах, превышающих рекомендуемые.

Длительное применение и передозировка лекарственного препарата могут привести к ослаблению его эффекта. Злоупотребление этим лекарственным препаратом может вызвать обратный эффект в виде отека слизистой и заложенности носа либо атрофию слизистой оболочки.

Дети и подростки

У новорожденных и детей младшего возраста следует применять с осторожностью, поскольку известно о серьезных нежелательных реакциях (особенно апноэ) при использовании терапевтических доз в этой возрастной группе. Следует избегать превышения дозы.

Другие препараты и препарат Нозакар Инфант

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Ваш ребенок принимает, недавно принимал или может начать принимать какие-либо другие препараты

Посоветуйтесь с лечащим врачом, если Ваш ребенок принимает:

- ингибиторы МАО: не следует использовать Нозакар Инфант на протяжении 14 дней после прекращения приема ингибиторов МАО;
- трициклические антидепрессанты: при совместном применении существует риск повышения артериального давления;

- препараты для снижения артериального давления (гипотензивные препараты). совместное применение может привести к снижению эффективности антигипертензивной терапии и к повышению артериального давления.

Исследования по взаимодействию оксиметазолина и других лекарственных препаратов проводились только на взрослых.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Безопасность препарата у беременных женщин и в период лактации не установлена, поэтому если Вы беременны или кормите грудью, препарат можно применять только по рекомендации врача.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При применении в рекомендуемых дозах Нозакар Инфант не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Нозакар Инфант содержит бензалкония хлорид

Бензалкония хлорид при нанесении на кожу и слизистые может вызывать раздражение и местные кожные реакции.

Данный лекарственный препарат содержит 0,1 мг бензалкония хлорида в каждом миллилитре, что эквивалентно 0,1 мг/мл.

3. Применение препарата Нозакар Инфант

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение у детей

Рекомендуемая доза

До 1 года: детям в возрасте до 4-х недель назначается по 1 капле Нозакар Инфант в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки. С 5-й недели жизни и до 1 года - по 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.

Путь и способ введения

Применяют местно, интраназально.

Перед применением лекарственного средства и через 5 минут после его применения необходимо очистить носовые ходы. Открыть флакон, набрать в пипетку необходимое количество раствора. Отклонить головку ребенка назад, кончик пипетки ввести аккуратно в один носовой ход, закапать одну каплю, аккуратно наклонить голову из стороны в сторону несколько раз. Затем повторить процедуру для второго носового хода. После использования очистить кончик пипетки салфеткой, закрыть флакон.

Эффективна также и следующая процедура: в зависимости от возраста 1-2 капли раствора наносят на вату и протирают носовые ходы.

Флакон должен использоваться только одним лицом из-за риска передачи инфекции.

Продолжительность терапии

Курс лечения - не более 7 дней.

Если Вы применили препарата Нозакар Инфант больше, чем следовало

Эффективность сосудосуживающих препаратов может снижаться (тахифилаксия) при длительном применении или передозировке. Это может привести к использованию более высоких доз, более частому и постоянному использованию препарата. При длительном применении или появлении признаков передозировки применение препарата следует немедленно прекратить.

Симптомами передозировки являются: беспокойство, возбуждение, галлюцинации, судороги, либо угнетение функций центральной нервной системы, понижение температуры тела, вялость, сонливость, возможно развитие комы, сужение или расширение зрачков, лихорадка, потливость, бледность, цианоз (синюшная окраска кожи и/или слизистых оболочек), ощущение сердцебиения, брадикардия (уменьшение частоты сердечных сокращений), аритмия (нарушение частоты, ритмичности и последовательности сокращений сердца), остановка сердца, повышение артериального давления, снижение артериального давления, тошнота, рвота, угнетение дыхания и остановка дыхания (апноэ).

У детей передозировка может быть причиной развития таких симптомов со стороны центральной нервной системы, как судороги, кома, замедление сердечного ритма (брадикардия), остановка дыхания (апноэ), а также повышение артериального давления с последующим возможным снижением артериального давления.

При случайном приеме внутрь проводят промывание желудка и назначают активированный уголь или сульфат натрия.

Если Вы или Ваш ребенок применили слишком много препарата, немедленно обратитесь к врачу или в отделение экстренной помощи ближайшей больницы. По возможности, возьмите с собой флакон, упаковку и/или листок-вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы применили.

Если Вы забыли применить препарат Нозакар Инфант

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Нозакар Инфант может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Самыми серьезными нежелательными реакциями являются реакции гиперчувствительности в виде затруднения дыхания, отека на губах, веках, щеках (ангионевротический отек), судороги, остановка дыхания (апноэ) у маленьких детей и новорожденных.

Если у вас появились указанные симптомы, немедленно прекратите применение препарата и сразу обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Частыми (не более чем у 1 человека из 10) нежелательными реакциями являются: ощущение жжения, сухость слизистой носа, чихание.

Нечастыми (не более чем у 1 человека из 100) нежелательными реакциями являются: сыпь, зуд, носовые кровотечения, после окончания действия - усиление отека слизистой носа.

Редкими (не более чем у 1 человека из 1000) нежелательными реакциями являются: ускоренное сердцебиение, повышение давления (гипертензия).

Очень редкими (не более чем у 1 человека из 10 000) нежелательными реакциями являются: сонливость, седация, головная боль, аритмия, усталость, возбуждение, бессонница, галлюцинации (преимущественно у детей).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения невозможно определить): снижение эффективности (тахифилаксия) при длительном применении или передозировке.

Продолжительное применение и передозировка могут привести к появлению медикаментозного ринита. Длительное применение может привести к развитию атрофического ринита.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220045, Минск, Товарищеский переулок, 2а

Телефон: +375 (17) 231-85-14

Факс: +375 (17) 252-53-58

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rceth@rceth.by, rcpl@rceth.by

<http://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Нозакар Инфант

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

После вскрытия флакона препарат годен в течение 3 месяцев.

Храните препарат при температуре ниже 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Нозакар Инфант содержит

Действующим веществом являются оксиметазолин, 1 мл раствора содержит 0,1 мг оксиметазолина гидрохлорида.

Вспомогательными веществами являются: вода очищенная, глицерин, натрия цитрат, лимонная кислота моногидрат, бензалкония хлорид.

Препарат Нозакар Инфант содержит бензалкония хлорид (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Нозакар Инфант и содержимое упаковки

Прозрачный, бесцветный раствор без запаха объемом 10 мл во флаконе для капель из коричневого стекла, снабженном крышкой-пипеткой. По 1 флакону в одной картонной пачке вместе с листком-вкладышем.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

ООО «Ламира-Фармакар»

222215, Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг. Слобода, комната 55.

Тел/факс: + 375 (17) 555-52-76

E-mail: info@lphc.by

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь

ООО «Ламира-Фармакар».

222215, Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг. Слобода, комната 55.

Тел/факс: + 375 (17) 555-52-76

E-mail: info@lphc.by

Листок-вкладыш пересмотрен

29.05.2025

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.