


Листок-вкладыш – информация для пациента  
Мирросепт, 0,1 мг/мл, раствор для наружного и местного применения  
мирамистин



**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.**

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если через 3 дней после начала применения препарата состояние не улучшается или ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

### СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Мирросепт, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Мирросепт.
3. Применение препарата Мирросепт.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Мирросепт.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

#### 1. Что из себя представляет препарат Мирросепт, и для чего его применяют


Лекарственный препарат Мирросепт содержит действующее вещество мирамистин.

Мирамистин – антисептическое средство, которое вызывает гибель бактерий, грибов и вирусов, способных вызывать инфекции у человека, а также предотвращает инфицирование ран и ожогов, ускоряет заживление.

Мирросепт применяют у взрослых и детей:

- в *оториноларингологии* (заболевания уха, горла и носа): для комплексного лечения острого и хронического наружного отита, гайморита, тонзиллита, фарингита, ларингита;
- в *стоматологии* (заболевания зубов, десен и ротовой полости в целом): для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта (стоматиты, гингивиты, пародонтиты), гигиенической обработки съемных протезов;
- в *хирургии, травматологии*: для профилактики нагноений и лечения гнойных ран, лечения гнойно-воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата;
- в *акушерстве, гинекологии*: для профилактики и лечения нагноений послеродовых травм, ран промежности и влагалища, послеродовых инфекций, воспалительных заболеваний (*вульвовагинита*);
- в *комбустиологии* (ожоговые поражения): для лечения поверхностных и глубоких ожогов II и IIIА степени, подготовки ожоговых ран к дерматопластике (пластическим операциям, например пересадке кожи);
- в *дерматологии* (бактериальные и грибковые кожные инфекции): для лечения и профилактики пиодермий и дерматомикозов, микозов стоп, кандидозов кожи и слизистых оболочек;
- в *венерологии*: для индивидуальной профилактики заболеваний, передающихся половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомоноз, генитальный герпес, генитальный кандидоз);

- в *урологии* (заболевания мочеполовой системы): для комплексного лечения острых и хронических уретритов и уретропростатитов, возбудители которых неизвестны (хламидиоз, трихомоноз, гонорея) или неизвестны.



## 2. О чем следует знать перед применением препарата Мирросепт

### Не применяйте препарат Мирросепт в следующих случаях:

- если у вас аллергия на мирамистин или любой из компонентов препарата, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша;
- для орошения горла и миндалин у детей в возрасте до 3 лет ввиду риска реактивного ларингоспазма (сужение гортани, которое может вызывать затруднение дыхания).

Если что-то из перечисленного касается вас, сообщите об этом лечащему врачу или работнику аптеки.

### Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Мирросепт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не допускайте попадания препарата в глаза.

Использование одного флакона препарата более чем одним лицом может привести к распространению инфекции.

### Другие препараты и препарат Мирросепт

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

При одновременном применении препарата Мирросепт с антибактериальными и противогрибковыми препаратами отмечено усиление активности последних.

### Беременность, грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

### Беременность

Влияния на беременность не ожидается, поскольку при местном и наружном применении препарат Мирросепт оказывает незначительное системное действие.

Допускается применение препарата Мирросепт во время беременности, исходя из клинической необходимости.

### Кормление грудью

При местном и наружном применении препарат Мирросепт оказывает незначительное системное действие, поэтому влияния на ребенка, находящегося на грудном вскармливании, не ожидается.

Допускается применение препарата Мирросепт у женщин, кормящих грудью.

### Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

## 3. Применение препарата Мирросепт

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### Способ применения

Препарат готов к применению.

Препарат применяют в виде орошений, полосканий и аппликаций.

## Указания по использованию упаковки с вагинальным аппликатором:

- 1) снять колпачок с флакона;
- 2) извлечь прилагаемый вагинальный аппликатор из защитной упаковки;
- 3) навинтить вагинальный аппликатор на флакон, не снимая насадку урологическую.



## **Режим дозирования**

### *Оториноларингология*

- При тонзиллитах, фарингитах, ларингитах орошают воспаленный участок препаратом с помощью насадки-распылителя (3-4-кратное нажатие) и/или полощут горло (10-15 мл на 1 полоскание) 3-4 раза в сутки.
- При остром и хроническом наружном отите: в наружный слуховой проход закапывают до 5 капель препарата 4 раза в сутки или аккуратно вводят марлевую турунду, смоченную препаратом, 4 раза в сутки. Продолжительность лечения – 10 дней.
- При гайморитах: во время пункции верхнечелюстная пазуха промывается достаточным количеством препарата.

### *Стоматология*

- При стоматитах, гингивитах, пародонтитах рекомендуется полоскание ротовой полости 10-15 мл препарата 3-4 раза в сутки. В случае невозможности полоскания допускается местное применение марлевых или ватных тампонов, смоченных раствором препарата.

### *Хирургия, травматология, комбустиология*

- С целью лечения и профилактики вторичного инфицирования ран:
  - поверхность раны орошают препаратом;
  - марлевые тампоны, смоченные препаратом, фиксируют на поверхности раны;
  - в случае необходимости возможно тампонирование раны и/или свищевых ходов во время выполнения хирургических манипуляций;
  - возможно проведение активного промывания ран и/или полостей. Суточный расход препарата – до 1 л.

### *Акушерство, гинекология*

- Профилактика и лечение нагноений послеродовых травм, ран промежности и влагалища, послеродовых инфекций: препарат применяется в виде влагалищных орошений до родов (5-7 дней), в родах (после каждого влагалищного исследования).
- В послеродовом периоде препарат вводят с помощью тампонов, смоченных 50 мл препарата, на 2 часа ежедневно в течение 5 дней.
- При родоразрешении женщин путем кесарева сечения непосредственно перед операцией обрабатывают влагалище, во время операции – полость матки и разрез на ней, а в послеоперационном периоде вводят тампоны, смоченные препаратом Мирросепт, на 2 часа ежедневно в течение 7 дней.
- Лечение воспалительных заболеваний проводят курсом в течение 2 недель путем внутривлагалищного введения тампонов с препаратом Мирросепт, а также методом лекарственного электрофореза.
- Комплексное лечение воспалительных заболеваний в гинекологии (вульвовагинит): в виде влагалищных орошений или введения тампона, смоченного препаратом Мирросепт, на 2 часа ежедневно в течение 7-14 дней (продолжительность лечения и кратность введения определяются по назначению врача). Для удобства влагалищного орошения рекомендуется использование гинекологической насадки. Содержимое флакона с помощью гинекологической насадки ввести во влагалище и произвести орошение.

### *Дерматология*

- Лечение и профилактика пиодермий и дерматомикозов, кандидозов кожи и слизистых оболочек, микозов стоп: препарат наносят на пораженный участок кожи путем протирания стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными препаратом. Препарат применяется 3 раза в сутки на пораженных участках кожи.

## Венерология

- Профилактика заболеваний, передающихся половым путем: эффективно в течение 2 часов после полового акта:
- содержимое флакона с помощью урологического аппликатора ввести в мочеиспускательный канал на 2-3 минуты:  
мужчины: 2-3 мл препарата,  
женщины: 1-2 мл препарата ввести в мочеиспускательный канал и 5-10 мл – во влагалище (для удобства рекомендуется использование гинекологической насадки);
- обработать кожу внутренних поверхностей бедер, лобка, половых органов;
- после процедуры рекомендуется не мочиться в течение 2 часов.

## Урология

- В комплексном лечении уретритов и уретропростатитов проводят впрыскивание в мочеиспускательный канал 2-3 мл препарата 1-2 раза в сутки, курс – 10 дней.

## Применение у детей и подростков

### Оториноларингология

- При гайморитах, остром и хроническом наружном отите режим дозирования для детей в возрасте от 0 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.
- Тонзиллиты, фарингиты, ларингиты:
  - дети в возрасте 3-6 лет: орошают воспаленный участок препаратом с помощью насадки-распылителя (1-кратное нажатие) и/или полощут горло (3-5 мл на 1 полоскание) 3-4 раза в сутки;
  - дети в возрасте 7-14 лет: орошают воспаленный участок препаратом с помощью насадки-распылителя (2-кратное нажатие) и/или полощут горло (5-7 мл на 1 полоскание) 3-4 раза в сутки;
  - Режим дозирования у детей в возрасте от 14 до 18 лет не отличается от режима дозирования у взрослых.

Длительность терапии составляет 4-10 дней в зависимости от сроков наступления ремиссии (улучшения).

### Стоматология, хирургия, травматология, комбустиология, дерматология

- Режим дозирования у детей в возрасте от 0 до 18 лет не отличается от режима дозирования у взрослых.

### Акушерство, гинекология, урология

- Способ применения, продолжительность лечения и кратность введения определяет лечащий врач.

### **Если вы применили препарата Мирросепт больше, чем следовало**

Случаев передозировки препарата при местном применении не зарегистрировано. Если вы применили препарата Мирросепт больше, чем следовало, обратитесь к врачу.

### **Если вы забыли применить препарат Мирросепт**

Если вы забыли применить препарат Мирросепт, примените его сразу же, как только вспомните об этом.


При наличии других вопросов по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

## **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Мирросепт может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Ниже перечислены наиболее серьезные нежелательные реакции, которые вы можете наблюдать у себя

Прекратите применение препарата Мирросепт и немедленно обратитесь к врачу, если у вас



возникнут какие-либо из следующих серьезных нежелательных реакций.

**Очень редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- аллергические реакции (могут проявляться затрудненным дыханием или глотанием, отеком лица, губ, языка или горла).



Другие нежелательные реакции, наблюдаемые во время лечения препаратами, содержащими мирамистин

**Очень редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- легкое жжение, которое проходит самостоятельно через 15-20 секунд и не требует прекращения применения препарата.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29.

## 5. Хранение препарата Мирросепт

Храните при температуре не выше 25°C.

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не применяйте препарат, если его упаковка повреждена или имеет признаки вскрытия.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию или с бытовым мусором. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**Препарат Мирросепт содержит**

*Действующим веществом* является мирамистин.

В 1 мл препарата содержится 0,10 мг мирамистина.

*Прочим ингредиентом* (вспомогательным веществом) является: вода для инъекций.

**Внешний вид препарата Мирросепт и содержимое его упаковки**

Форма выпуска и описание:

Бесцветный прозрачный раствор, пенящийся при встряхивании.

Упаковка:

По 30 мл в пластиковые флаконы из полиэтилена высокого давления со спрейером с насадкой в упаковке № 1. По 100 мл во флаконы полимерные, укупоренные полимерными распылительной насадкой или винтовым колпачком, в упаковке № 1, по 100 мл во флаконы из полиэтилена высокого давления, укупоренные полимерным резьбовым колпачком, в упаковке № 1 или по 100 мл во флаконы-капельницы из полипропилена с навинчиваемой крышкой и насадкой капельницей из полиэтилена высокого давления в комплекте с вагинальным аппликатором в упаковке № 1. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещен в пачку из картона.

**Условия отпуска из аптек:** без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения**

Республика Беларусь

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

222603, Минская область, р-н Несвижский, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, ком. 3  
Адрес эл. почты: mail@pharmland.by



### **Производитель**

Республика Беларусь

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью  
«ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

222603, Минская область, Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124

Адрес эл. почты: mail@pharmland.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен:

### Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by).