

Л И С Т О К – В К Л А Д Ы Ш
по медицинскому применению лекарственного средства

Календулы настойка
для наружного применения

Название лекарственного средства Календулы настойка.

Название лекарственной формы Настойка для наружного применения.

Общая характеристика Прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета со специфическим запахом, горьковатого вкуса. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

Состав лекарственного средства

Спиртовое извлечение из ноготков цветков 1:10.

Содержит не менее 65 % этанола.

Фармакотерапевтическая группа Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Фармакологические свойства

Биологически активные вещества, содержащиеся в цветках ноготков (тритерпеновые сапонины, флавоноиды, эфирные масла, полисахариды), оказывают местное антисептическое, противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Показания к применению

Лекарственное средство используют для полосканий в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит) и горла (тонзиллит), симптоматического лечения легких воспалительных процессов кожи и небольших поверхностных ран.

Способ применения и дозировка

Наружно и для полоскания горла разводят 1 чайную ложку (60-80 капель) в стакане воды.

Полученный раствор применяют для полоскания полости рта и горла.

Способ применения лекарственного средства при заболеваниях кожи зависит от характера поражения и определяется врачом.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта. Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола.

Побочное действие

Возможно: аллергические реакции на компоненты лекарственного средства.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как арника, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема.

Возраст до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи). Возраст до 12 лет для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и горла).

Период беременности и кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не установлено.

Передозировка

Возможно усиление побочных явлений.

Лечение: отмена лекарственного средства, при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Меры предосторожности

Если при использовании лекарственного средства симптомы не проходят через 1 неделю, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение у детей.

Не применяется у детей до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи), у детей до 12 лет для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и горла).

В случае появления признаков инфицирования раны, необходимо обратиться к врачу.

Применение при беременности и лактации.

В связи с отсутствием достаточных клинических данных, не рекомендуется использовать во время беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! При случайном приеме внутрь лекарственное средство влияет на способность управлять автотранспортом и другими механизмами. Следует соблюдать осторожность во время местного применения лекарственного средства.

Условия и срок хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Беречь от огня.

Срок годности – 4 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

30 мл, 50 мл во флаконах в упаковке № 1.

Производитель

СОАО «Ферейн»,

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 52А,

тел./факс: + 375 17 394-92-18

e-mail: office@ferane.by