

**Листок-вкладыш
лекарственного средства**

ТОНОКСОЛ
капли ушные



- *Перед использованием лекарственного средства Тоноксол вы должны проконсультироваться с врачом.*
- *Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.*
- *Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции (листочке-вкладыше).*
- *Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*
- *Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения.*
- *Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.*

Торговое название

Тоноксол

Международное непатентованное название (МНН)

Нет.

Общая характеристика

Прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость с характерным запахом этанола.

Состав

1,0 г содержит:

Активное вещество: лидокаина гидрохлорида моногидрат – 10,0 мг, феназон – 40,0 мг.

Вспомогательные вещества: натрия тиосульфат, этиловый спирт 96 %, глицерин, вода очищенная.

Форма выпуска

Капли ушные.

Фармакотерапевтическая группа и код АТХ

Прочие средства, применяемые в отологии. Анальгетики и анестетики в комбинации.

Код АТХ: S02DA30.

Показания к применению

Местное симптоматическое лечение болезненных состояний среднего уха при условии сохранения целостности барабанной перепонки:

- острый средний отит с застойными явлениями;
- средний отит, как осложнение после гриппа;
- баротравматический средний отит.

Если Вам требуется дополнительная информация о Вашем состоянии, обратитесь за советом к своему врачу.

Способ применения и дозы

Применение данного лекарственного средства возможно только после консультации с врачом!

Не прекращайте прием Тоноксол без предварительной консультации с лечащим врачом!

Если у Вас возникли сомнения или вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу.

Применяется местно.

Рекомендуемая доза составляет по 4 капли 2-3 раза в день, закапывается в наружный слуховой проход уха при легком нажатии на флакон.

Во избежание неприятного контакта холодного раствора с ухом перед использованием рекомендуется разогреть флакон в руке.

Как использовать флакон с пипеткой:

- открутите крышку флакона,
- привинтите пипетку к флакону,
- снимите крышку с пипетки,
- переверните флакон и аккуратно нажмите на пипетку, чтобы получить каплю,
- нажмите еще раз, пока не получите 4 капли,
- положите крышку на пипетку после использования.

Нежелательные реакции

При появлении побочных эффектов сообщите об этом лечащему врачу. Это касается всех возможных побочных эффектов, в том числе не описанных в данном листке-вкладыше.

Могут возникнуть местные реакции в виде аллергических реакций, раздражения или гиперемии уха.

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного средства с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения польза/риск лекарственного средства. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям на лекарственные средства (в Республике Беларусь: УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь, <https://www.rceth.by>). Также рекомендуется сообщать о неэффективности лекарственного средства.

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным веществам или к любому из вспомогательных веществ препарата перечисленных в разделе «Состав».

Перфорация барабанной перепонки инфекционной или травматической этиологии.

Передозировка

Случаев передозировки не зарегистрировано.

Меры предосторожности

Следует убедиться в целостности барабанной перепонки перед введением продукта. В случае применения при перфорированной барабанной перепонке препарат может вступить в контакт со структурами среднего уха и привести к возникновению осложнений.

Препарат содержит активный компонент, способный дать положительную реакцию при допинг-контроле.

Продолжительность применения препарата Тоноксол не более 10 дней, после чего врачу следует пересмотреть назначенное лечение.

Что нужно знать перед использованием препарата Тоноксол?

В качестве меры предосторожности перед назначением препарата Тоноксол врач должен проверить целостность барабанной перепонки.

Применение у детей

Исследования эффективности и безопасности применения препарата Тоноксол в детской практике не проводились.

Беременность и лактация

Если Вы беременны или кормите грудью, если Вы предполагаете, что беременны или не исключаете у себя вероятности наступления беременности, сообщите об этом своему лечащему врачу.

Ограничения применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют при условии неповрежденной барабанной перепонки.

Влияние на способность управлять механическими средствами передвижения и обслуживать механические устройства, находящиеся в движении

Отсутствует.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Если в настоящее время или в недавнем прошлом Вы принимали другие лекарственные средства, сообщите об этом врачу.

В настоящее время информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует.

Условия и срок хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года.

Срок годности после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

По рецепту врача.

Упаковка

По 16 г во флаконе из янтарного стекла закрученном пластмассовым колпачком белого цвета с ребристой поверхностью.

По 1 флакону и отдельно вложенному в блистер ПВХ/бумага пластмассовому белому колпачку с пипеткой из термопластичного эластомера с пластмассовым белым наконечником, вместе с листком-вкладышем в картонную коробку.

Информация о производителе

ЗАО «ИНТЕГРАФАРМ»

223045, Минская область, Минский р-н, Юзуфовский с/с, 8-5, р-н а/г Юзуфово.

тел. +375 17 504 22 60

e-mail: office@integrafarm.by