

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)  
по медицинскому применению лекарственного средства  
**БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА**  
**(TINCTURA CRATAEGI)**

*Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства.*

*Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его еще раз.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

**Торговое название.** Боярышника настойка.

**Международное непатентованное название (МНН).** Crataegus glycosides.

**Описание.** Прозрачная жидкость от желтого цвета с оранжевым оттенком до красного цвета с коричневым оттенком. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

**Состав.** Спиртовое извлечение из плодов боярышника (1:10). Содержит не менее 65,0 % этанола.

**Форма выпуска.** Настойка.

**Фармакотерапевтическая группа и код АТС.** С01ЕВ04. Прочие средства, применяемые при заболеваниях сердца.

**Фармакологические свойства.**

Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах боярышника, оказывают умеренное кардиотоническое, гипотензивное и седативное действие.

**Показания к применению.**

В комплексной терапии функциональных нарушений сердечной деятельности и функциональных нарушений нервной системы (неврастения).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

### **Способ применения и дозы.**

Принимают внутрь до еды. Взрослым рекомендуется капель настойки, разведенных в 1/4 стакана воды, 3 раза в день. Детям старше 12 лет 3 раза в день по 10-15 капель настойки, разведенных в 1/4 стакана воды, 3 раза в день.

Длительность курса лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этилового спирта. Продолжительность приема у детей должна быть минимальной. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств.

*Применение у пациентов с нарушением функции печени и/или почек:* назначать с осторожностью.

*Применение у пациентов пожилого возраста:* назначать с осторожностью.

### **Побочное действие.**

Возможны аллергические реакции, брадикардия, сонливость, снижение артериального давления, головокружение, тремор.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе, не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Противопоказания.**

Гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

*С осторожностью:* заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога, детский возраст старше 12 лет.

### **Передозировка.**

*Симптомы:* снижение артериального давления, головокружение, сонливость, брадикардия. В случае передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка. Лечение симптоматическое.

### **Меры предосторожности.**

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача для точной диагностики заболевания. Во время приема лекарственного средства необходим контроль артериального давления и электрокардиограммы.

Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, развиваются отеки нижних конечностей, необходимо обратиться к врачу.

Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности.

Данный лекарственный препарат содержит не менее 65 об. % этанола, то есть 421 – 631 мг на разовую дозу (20-30 капель), что равно 11 – 16 мл пива, 4 – 7 мл вина на дозу. Вреден для лиц с алкоголизмом.

#### **Применение во время беременности и лактации.**

Применение во время беременности и лактации противопоказано.

#### **Применение у детей.**

Применение лекарственного средства у детей до 12 лет противопоказано. Применение лекарственного средства у детей в возрасте 12-18 лет возможно только по назначению врача и под медицинским наблюдением.

#### **Влияние на способность управлять автотранспортом и работу с движущимися механизмами.**

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо отказаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

При совместном назначении с сердечными гликозидами происходит усиление кардиотонического, с  $\beta$ -адреноблокаторами – гипотензивного действия.

Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмическими средствами III класса, а также с цизапридом. Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования комплексов.

Необходимо избегать применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

– лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризеофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин.

– лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

#### **Условия хранения.**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.



**Беречь от огня.**

В процессе хранения возможно выпадение осадка.

**Срок годности.**

2 года. Не использовать по истечении срока годности!

**Условия отпуска.**

Без рецепта.

**Упаковка.** По 50 мл в бутылки / флаконы полимерные с полиэтиленовой пробкой-капельницей и навинчиваемой пластмассовой/ полимерной крышкой в упаковке № 1 с листком-вкладышем.

**Изготовитель.** ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, 223043, Минская обл., Минский р-н, д. Цянка, ул. Армейская, 8, комн. 7.

Тел. (017) 500 33 11, тел./факс (017) 500 33 46.