

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)  
**по медицинскому применению**  
**лекарственного средства**  
**ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА**

*Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата.*

*Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его еще раз.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

**Торговое название.** Эхинацеи настойка.

**Международное непатентованное название (МНН).** Отсутствует.

**Форма выпуска.** Настойка.

**Состав.** Спиртовое извлечение из травы эхинацеи пурпурной – 1:5. Содержит не менее 36,0 % этанола.

**Описание.** Прозрачная жидкость от зеленовато-желтого до желтовато-бурого цвета со слабым специфическим запахом и горьковатым вкусом. Во время хранения препарата возможно появление осадка.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие иммуностимуляторы.

**Фармакологические свойства.** Эхинацея пурпурная стимулирует неспецифическую иммунную систему.

**Показания к применению.** *Внутрь:* кратковременная профилактика и лечение в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

*Наружно:* применяется для лечения небольших поверхностных раневых повреждений.

**Способ применения и дозировка.** *Внутрь.* Разовая доза для взрослых 20 капель настойки, разведенных в ¼ стакана воды, 3 раза в день. Детям старше 12 лет столько капель на прием, сколько лет ребенку, разведенных в ¼ стакана воды, 3 раза в день.

Для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний лекарственное средство не следует использовать более 10 дней. При лечении острых респираторных заболеваний прием лекарственного средства следует начинать при первых признаках заболевания.

*Наружно.* При лечении раневых повреждений применяют наружно в виде

примочек и компрессов. 20-60 капель настойки разводят в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида, смачивают этим раствором марлю и накладывают ее на рану. Повязку меняют дважды в сутки. Продолжительность применения не должна превышать 7 дней.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого лечебного эффекта.

Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола. Продолжительность приема у детей должна быть минимальной. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств.

Перед применением лекарственного средства флакон необходимо взбалтывать.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим растениям семейства астровых (сложноцветных). Прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания, в т. ч. туберкулез, саркоидоз, коллагенозы, рассеянный склероз, ВИЧ-инфекция или СПИД, распространенный атеросклероз, злокачественные заболевания, патология системы лейкоцитов (гемобластозы, агранулоцитоз и др.), состояние иммунодефицита или иммуносупрессии, прием иммунодепрессантов (циклоспорина, метотрексата и др.), склонность к аллергическим реакциям.

Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям до 12 лет.

**С осторожностью.** Детский возраст старше 12 лет, заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога.

**Побочное действие.** У пациентов с повышенной чувствительностью могут развиваться аллергические реакции (сыпь, крапивница, экзема, контактный дерматит, отек Квинке, синдром Стивенса-Джонсона, приступ бронхоспазма, анафилактический шок).

Эхинацея может вызвать развитие аллергических реакций у пациентов с атопией. Были сообщения о связи приема эхинацеи с развитием аутоиммунных заболеваний (рассеянный энцефалит, узловая эритема, тромбоцитопения иммунного характера, синдром Эванса, синдром Шегрена с дисфункцией почечных канальцев).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка.** *Симптомы.* Тошнота, рвота, повышенная возбудимость, нарушение сна.

*Лечение.* В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка. Симптоматическая терапия.

**Меры предосторожности.** При лечении острых респираторных заболеваний

прием препарата следует начинать при первых признаках заболевания. Пациентам с атопией в связи с риском развития анафилактических реакций перед приемом лекарственного средства необходимо проконсультироваться с врачом. Продолжительность приема лекарственного средства не должна превышать 8 недель.

Если во время приема лекарственного средства происходит ухудшение состояния или поднимается температура, необходимо обратиться к врачу.

В случае появления признаков инфекции при лечении раневых повреждений необходимо обратиться к врачу.

Лекарственное средство содержит не менее 36,0 % этанола, то есть около 444 мг на разовую дозу (20 капель).

**Применение при беременности и лактации.** В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Настойку не следует наносить на молочную железу женщин, кормящих грудью.

**Применение у детей.** В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применять у детей до 12 лет не рекомендуется.

**Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.** Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем (дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид, гризеофульвин, производные нитро-5-имидазола (метронидазол, орнидазол, тинидазол), кетоконазол, прокарбазин).

- лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

Возможно уменьшение эффективности при одновременном применении эхинацеи и иммунодепрессивных средств. Перед совместным приемом с другими лекарственными средствами необходимо проконсультироваться с врачом.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня.

**Условия отпуска из аптек.** Отпускают без рецепта врача.

**Срок годности.** 3 года.

*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.*



**Упаковка.** По 50 мл в бутылки / флаконы полимерные с полиэтиленовой пробкой  
капельницей и навинчиваемой пластмассовой/ полимерной крышкой в упаковке №  
1 с листком-вкладышем;

**Производитель.** ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, 223043, Минская обл.,  
Минский р-н, д.Цнянка, ул. Армейская, 8, комн. 7.

Тел. (017) 500 33 11, тел./факс (017) 500 33 46.