

**Листок-вкладыш – информация для потребителя**  
**МИНОКСИФОР, 50 мг/мл, раствор для наружного применения**  
**Действующее вещество: Миноксидил**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 2 месяца вам следует обратиться к врачу.


**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Миноксифор и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Миноксифор.
3. Применение препарата Миноксифор.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Миноксифор.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Миноксифор и для чего его применяют**

Миноксифор представляет собой 50 мг/мл раствор миноксидила для наружного применения. Миноксифор — это лекарство, используемое для лечения распространенного наследственного выпадения волос у мужчин в возрасте 18-65 лет, предотвращает дальнейшее выпадение волос и способствует их повторному росту. Он содержит миноксидил, который, как считается, действует, способствуя притоку крови к волосяным фолликулам на коже головы.

- Лекарство предназначено только для применения у мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.
- Лекарственный препарат лучше всего подходит для мужчин с выпадением или истончением волос на верхней части головы.
- Молодой возраст, потеря волос в течение короткого периода времени или небольшая область облысения могут позволить получить наилучшие результаты лечения.
- Прогнозируемая польза от применения Миноксифор будет скорее всего незначительной, если вы лысеете уже много лет или у вас большая область выпадения волос. Наследственное выпадение волос можно распознать по перечисленным ниже признакам:
- Определенный характер выпадения волос (см. диаграммы).
- Выпадение начинается постепенно и прогрессирует.
- Известно о семейной истории выпадения волос.
- Имеются другие диагностированные проблемы с вашим выпадением волос.



## 2. О чем следует знать перед применением препарата Миноксифор

Не применяйте препарат Миноксифор:

- Если вы женщина;
  - Если вам меньше 18 лет или больше 65 лет;
  - Если у вас когда-либо была нежелательная реакция на миноксидил, этанол или пропиленгликоль;
  - Если вы не уверены, является ли ваше выпадение волос наследственным;
  - Если у вас выпадение волос, вызванное медикаментозным лечением;
  - Если у вас полное облысение или полная потеря всех волос на теле;
  - Если причина вашего выпадения волос неизвестна или оно произошло внезапно и неожиданно;
  - Если у вас высокое кровяное давление, даже если оно не лечится;
  - Если у вас есть какие-либо заболевания, которые влияют на кожу головы, включая солнечные ожоги и псориаз;
  - Если у вас бритая кожа головы;
  - Если вы используете кремы, мази или лосьоны, предназначенные для лечения заболеваний кожи головы, например:
    - Дитранол – используется для лечения псориаза;
    - Третиноин – используется для лечения акне или других кожных заболеваний;
    - Кортикостероиды – разновидность противовоспалительных средств;
    - Вазелин - распространенный ингредиент воска или геля для волос.
  - Если у вас есть какая-либо повязка или повязка на голове.
  - Если вы не знаете, что ваша кожа головы нормальная и здоровая.
- Если какой-либо из этих пунктов применим к вам сейчас или в прошлом, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, прежде чем использовать Миноксифор.

### *Особые указания и меры предосторожности*

Перед применением препарата Миноксидил проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

- Если вы вообще не уверены, является ли ваша кожа головы нормальной и здоровой.
- Если вы страдаете заболеваниями сердца, в том числе нарушениями сердечного ритма или частоты сердечных сокращений, стенокардией или болями в груди и / или нарушениями кровообращения.
- Если вы не уверены в лекарстве, которое принимаете или используете, покажите флакон или упаковку своему фармацевту. Если какой-либо из этих пунктов применим сейчас или в прошлом, поговорите с врачом или фармацевтом.
- Если миноксидил попадает в кровоток, это может вызвать некоторые побочные эффекты, связанные с низким кровяным давлением, такое как боль в груди, учащенное сердцебиение, слабость, головокружение, отек рук и ног, постоянное покраснение или раздражение кожи головы. Если вы испытываете какой-либо из этих побочных эффектов, прекратите прием лекарства и сообщите об этом своему врачу. Когда Миноксифор

используется в соответствии с рекомендациями, крайне маловероятно, что эти эффекты возникнут. Однако существует вероятность того, что препарат может попасть в кровоток, если он используется чрезмерно или если есть такие заболевания кожи головы, как псориаз. Поэтому очень важно, чтобы вы использовали свое лекарство в соответствии с рекомендациями и очень тщательно следовали инструкциям (см. раздел 3).

- Не наносите препарат на другие участки тела, кроме кожи головы. Превышение рекомендуемой дозы не приведет к более быстрому повторному росту ваших волос, и у вас повышается вероятность получения побочных эффектов.
- Случайное проглатывание может вызвать серьезные побочные эффекты со стороны сердца. Поэтому этот продукт следует хранить в недоступном для детей месте.

#### *Дети и подростки*

Применение Миноксифора не рекомендуется у детей и подростков до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения препарата у таких пациентов не изучалась.

#### *Другие препараты и препарат Миноксифор*

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимали/применяете, недавно принимали/применяли или планируете принимать/применять какие-либо другие препараты.

При применении некоторых сосудорасширяющих лекарств от кровяного давления, например гидразалин, существует потенциальный риск того, что миноксидил, активный ингредиент препарата Миноксифор, может взаимодействовать с этими лекарствами и усиливать их действие.

#### *Беременность, кормление грудью и фертильность*

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### *Управление транспортными средствами и работа с механизмами*

Препарат Миноксифор содержит миноксидил, который может вызвать головокружение или низкое кровяное давление. Если вы испытываете эти симптомы, не садитесь за руль и не управляйте механизмами.

### **Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ**

Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

Препарат содержит этанол (спирт), который может вызвать жжение и раздражение при попадании в глаза.

При случайном попадании в глаза, рот или на порез, поврежденную кожу хорошо промойте область большим количеством прохладной водопроводной воды.

### **3. Применение препарата Миноксифор**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Миноксифор предназначен только для наружного применения на кожу головы.

- Избегайте вдыхания спрея во время применения.
- Не наносите препарат на другие участки тела кроме кожи головы.
- Тщательно мойте руки до и после нанесения раствора и промойте другие участки, которые соприкасались с раствором.
- Перед нанесением раствора убедитесь, что ваши волосы и кожа головы полностью сухие.

#### *Рекомендуемая доза*

Препарат применяется для мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

- На полностью сухую кожу головы и волосы наносите дозу по 1 мл на всю пораженную область два раза в день, для достижения 1 дозы выполняется 10 нажатий на распыляющую насадку.

- После нанесения раствор следует легкими массирующими движениями втереть в кожу головы.

Рекомендуется 12 часовой перерыв между использованием.

- Не наносите более 2 мл в день.
- Не используйте чаще двух раз в день.
- Препарат противопоказан для женщин.

#### *Продолжение лечения*

- Возможно, вам придется использовать это лекарство два раза в день в течение по крайней мере 2 месяцев, прежде чем вы увидите рост новых волос, это связано с тем, что рост волос - медленный процесс.

- Рост волос вначале может быть пушковым, со временем должны появиться нормальные волосы.

- Как только волосы начнут отрастать заново, вам необходимо продолжать использовать это лекарство два раза в день, чтобы рост продолжался. В клинических испытаниях 3 из каждых 5 мужчин сообщили о появлении волос. Повторный рост наблюдался после 48 недель непрерывного использования продукта.

- Когда вы прекратите прием лекарства, отросшие волосы могут исчезнуть через 3-4 месяца, и процесс выпадения волос продолжится.

- Если у вас нет улучшения в росте волос после одного года использования, вам следует прекратить лечение.

- Если в какой-либо момент во время лечения вы испытываете беспокойство, вам следует проконсультироваться со своим врачом или фармацевтом.

#### *Передозировка*

Немедленно обратитесь к врачу, если кто-либо, включая ребенка, применил слишком много препарата. Возьмите лекарственный препарат с собой.

#### *Если вы забыли применить препарат Миноксифор*

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

#### *Если вы случайно проглотите раствор*

Если кто-либо, включая ребенка, проглотит раствор, немедленно доставьте его в больницу (захватите флакон с препаратом с собой, так как врач может уточнить сколько препарата принято).

## **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Миноксифор может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Если вы испытываете что-либо из перечисленного, прекратите прием лекарства и немедленно обратитесь за медицинской помощью:

- Боль в груди;
- Отек лица, губ, рта, языка или горла, который может вызвать затруднение глотания или дыхания.

Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, прекратите прием лекарства и обратитесь к своему врачу:

- Аллергические реакции, включая отек лица, покраснение кожи или зуд, а также стеснение в горле;
- Низкое кровяное давление;
- Учащенное сердцебиение или повышенное осознание сердцебиения;
- Слабость или головокружение;

- Опухшие руки или ноги, одышка;
- Внезапное необъяснимое увеличение веса;
- Стойкое местное покраснение или сыпь.

Другие эффекты, которые могут возникнуть, включают:

Очень распространено (может поражать более 1 из 10 человек)

- Головная боль.

Распространено (может поражать до 1 из 10 человек)

- Зуд или дерматит

Сообщалось о нежелательных волосах, не относящихся к коже головы (включая рост волос на лице у женщин). Всегда тщательно мойте руки после нанесения, и, если вы случайно нанесете раствор на другие части тела, кроме кожи головы, тщательно промойте большим количеством воды.

Редко (может поражать до 1 из 100 человек)

- Тошнота.

Очень редко (может поражать до 1 из 1000 человек)

- Может произойти изменение текстуры волос. Если это произойдет, вам следует прекратить использование Миноксифора.

Частота не известна:

- Подавленное настроение;

- Раздражение глаз;

- Рвота.

- Сообщалось о раздражении кожи головы, таком как местное покраснение, сухость, шелушение кожи. Это может быть связано с содержанием в продукте пропиленгликоля. Обычно это лишь временный эффект, но если он стойкий, вам следует прекратить использование препарата.

- Угревая сыпь, зудящая сыпь, образование пузырей, кровотечение или изъязвление.

- Временное выпадение волос может произойти в течение первых 2-6 недель использования. Вероятно, это происходит в результате изменений в цикле роста, и должно прекратиться в течение пары недель. В случае дальнейшего продолжения выпадения волос прекратите использование Миноксифора и обратитесь к своему врачу.

- При изменении цвета волос вам следует прекратить использование Миноксифора.

#### *Сообщение о нежелательных реакциях*

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

## **5. Хранение препарата Миноксифор**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 30 месяцев.

Не использовать после истечения срока годности.

### *Меры предосторожности*

Легковоспламеняющаяся жидкость: хранить вдали от источников тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей.

Держите флакон плотно закрытым.

Хранить в хорошо проветриваемом месте.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

1 мл раствора содержит 50,0 мг Миноксидила.



Вспомогательные вещества: этиловый спирт 96 %, пропиленгликоль, вода очищенная.  
*Внешний вид препарата Миноксифор и содержимое упаковки*  
Бесцветный или слегка окрашенный с желтоватым оттенком прозрачный раствор с запахом спирта.  
По 60 мл во флаконах полимерных, укупоренных насадками распыляющими. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной пачке.

**Условия отпуска:** без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель:**

ООО «Фортива Мед»

223012, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, г.п. Мачулищи, ул. Аэродромная, д. 4-2, каб.21.

Телефон + 375 17 504 62 87, факс +375 17 301 91 45

**Листок-вкладыш пересмотрен:**

**Листок-вкладыш – информация для потребителя**  
**МИНОКСИФОР, 20 мг/мл, раствор для наружного применения**  
**Действующее вещество: Миноксидил**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 2 месяца вам следует обратиться к врачу.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Миноксифор и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Миноксифор.
3. Применение препарата Миноксифор.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Миноксифор.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Миноксифор и для чего его применяют**

Миноксифор используется для лечения распространенного наследственного выпадения волос у женщин в возрасте 18-65 лет, предотвращает дальнейшее выпадение волос и способствует их повторному росту. Он содержит миноксидил, который, как считается, действует, способствуя притоку крови к волосяным фолликулам на коже головы.

- Миноксифор лучше всего подходит женщинам с общим истончением волос на коже головы.
- Молодой возраст или потеря волос в течение короткого периода времени, скорее всего позволят получить наилучшие результаты.
- Вы вряд ли получите пользу от Миноксифор, если вы лысеете в течение многих лет или у вас большая область выпадения волос.

Наследственное выпадение волос можно распознать из-за: характера выпадения волос (см. диаграммы). Это заболевание начинается постепенно и прогрессирует. Заболевание можно прогнозировать, если у вас есть семейная история выпадения волос. Имеются другие диагностированные проблемы с вашим выпадением волос.



## 2. О чем следует знать перед применением препарата **Миноксифор**

Не применяйте препарат Миноксифор:

- Если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- Если вы беременны или кормите грудью;
- Если вам меньше 18 лет или больше 65 лет;
- Если вы не уверены, является ли ваше выпадение волос наследственным;
- Если у вас выпадение волос, вызванное медикаментозным лечением;
- Если у вас полное облысение или полная потеря всех волос на теле;
- Если причина вашего выпадения волос неизвестна, вызвана родами или является внезапной и неожиданной;
- Если у вас высокое кровяное давление, даже если оно не лечится;
- Если у вас есть какие-либо заболевания, которые влияют на кожу головы, включая солнечные ожоги и псориаз;
- Если у вас бритая кожа головы;
- Если вы используете кремы, мази или лосьоны, предназначенные для лечения заболеваний кожи головы, например:
  - Дитранол – назначают для лечения псориаза.
  - Третиноин – назначают для лечения акне или других кожных заболеваний.
  - Кортикостероиды – тип противовоспалительных средств
  - Вазелин – распространенный ингредиент воска или геля для волос.
- Если у вас есть какая-либо повязка или повязка на голове.
- Если вы не знаете, что ваша кожа головы нормальная и здоровая.

Если какой-либо из этих пунктов относится к вам сейчас или в прошлом, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием Миноксифор.

Обратитесь к своему врачу или фармацевту, если вы не уверены, является ли ваша кожа нормальной.

### *Особые указания и меры предосторожности*

Перед применением препарата Миноксидил проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

- Если вы вообще не уверены, является ли ваша кожа головы нормальной и здоровой.
- Если вы страдаете заболеваниями сердца, в том числе нарушениями сердечного ритма или частоты сердечных сокращений, стенокардией или болями в груди и / или нарушениями кровообращения.
- Если вы принимаете или используете какие-либо другие лекарства, включая:
  - некоторые лекарства от артериального давления, называемые "сосудорасширяющими средствами", например гидралазин. Существует потенциальный риск того, что миноксидил, активный ингредиент Миноксифор может взаимодействовать с этими лекарственными средствами и усиливать их действие.

Если вы не уверены в лекарстве, которое принимаете или используете, покажите флакон или упаковку своему фармацевту. Если какой-либо из этих пунктов применим сейчас или в прошлом, поговорите с врачом или фармацевтом.

- Если миноксидил попадает в кровоток, это может вызвать некоторые побочные эффекты, связанные с низким кровяным давлением, такое как боль в груди, учащенное сердцебиение, слабость, головокружение, отек рук и ног, постоянное покраснение или раздражение кожи головы. Если вы испытываете какой-либо из этих побочных эффектов, прекратите прием лекарства и сообщите об этом своему врачу. Когда Миноксифор используется в соответствии с рекомендациями, крайне маловероятно, что эти эффекты возникнут. Однако существует вероятность того, что препарат может попасть в кровоток, если он используется чрезмерно или если есть такие заболевания кожи головы, как псориаз.

Поэтому очень важно, чтобы вы использовали свое лекарство в соответствии с рекомендациями и очень тщательно следовали инструкциям. См. раздел 5.

- Не наносите препарат на другие участки тела, кроме кожи головы. Превышение рекомендуемой дозы не приведет к более быстрому повторному росту ваших волос, и у вас повышается вероятность получения побочных эффектов.
- Случайное проглатывание может вызвать серьезные побочные эффекты со стороны сердца. Поэтому этот продукт следует хранить в недоступном для детей месте.

#### *Дети и подростки*

Применение Миноксифора не рекомендуется у детей и подростков до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения препарата у таких пациентов не изучалась.

#### *Другие препараты и препарат Миноксифор*

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимали/применяете, недавно принимали/применяли или планируете принимать/применять какие-либо другие препараты.

При применении некоторых сосудорасширяющих лекарств от кровяного давления, например гидразалин, существует потенциальный риск того, что миноксидил, активный ингредиент препарата Миноксифор, может взаимодействовать с этими лекарствами и усиливать их действие.

#### *Беременность, кормление грудью и фертильность*

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### *Управление транспортными средствами и работа с механизмами*

Препарат Миноксифор содержит миноксифор, который может вызвать головокружение или низкое кровяное давление. Если вы испытываете эти симптомы, не садитесь за руль и не управляйте механизмами.

### **Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ**

Лекарство содержит 104,0 мг пропиленгликоля в каждом 1 мл и может вызвать раздражение кожи.

Лекарство содержит 571,0 мг алкоголя что может вызвать жжение на поврежденной коже.

### **3. Применение препарата Миноксифор**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

- Миноксифор предназначен только для местного и наружного применения. Его следует наносить только непосредственно на кожу головы.
- Избегайте вдыхания спрея во время нанесения на кожу головы.
- Не наносите на другие участки тела, кроме кожи головы.
- Тщательно мойте руки до и после нанесения раствора и промойте другие участки, которые соприкасались с раствором.
- Перед нанесением раствора убедитесь, что ваши волосы и кожа головы полностью сухие.

После применения возможна слабость, головокружение, отек рук и ног, постоянное покраснение или раздражение кожи головы. Если вы испытываете какой-либо из этих побочных эффектов, прекратите прием лекарства и сообщите об этом своему врачу. Когда Миноксифор используется в соответствии с рекомендациями, крайне маловероятно, что эти эффекты возникнут. Однако существует вероятность того, что препарат может попасть в кровоток, если он используется чрезмерно или если есть заболевание кожи головы, такое как псориаз.

- При случайном попадании препарата на участки тела, отличные от кожи головы, тщательно смойте большим количеством воды.

*Рекомендуемая доза*

Рекомендуемая доза в 1 мл достигается путем 10 нажатий на распыляющую насадку. Препарат наносится на лысый участок кожи и распределяется пальцами равномерно по всей области облысения. Применение следующей дозы препарата рекомендуется через 12 часов.

Может потребоваться применение этого лекарства по крайней мере в течение 4 месяцев до того, как вы увидите рост новых волос, это связано с тем, что рост волос – медленный процесс.

Продолжайте использовать Миноксифор два раза в день, чтобы рост продолжался. В клинических испытаниях 3 из каждых 5 женщин сообщили о возобновлении роста волос после 8 месяцев постоянного использования этого продукта.

*Передозировка*

Если вы применили препарата Миноксифор больше, чем следовало немедленно обратитесь к врачу. Возьмите препарат с собой.

*Если вы забыли применить препарат Миноксифор*

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

*Если вы случайно проглотите раствор*

Если кто-либо, включая ребенка, проглотит раствор, немедленно доставьте его в больницу (захватите флакон с препаратом с собой, так как врач может захотеть иметь представление о том сколько препарата принято).

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Миноксифор может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Если вы испытываете что-либо из перечисленного, прекратите прием лекарства и немедленно обратитесь за медицинской помощью:

- Боль в груди;
- Отек лица, губ, рта, языка или горла, который может вызвать затруднение глотания или дыхания;
- Аллергические реакции, включая отек лица, покраснение кожи или зуд, а также стеснение в горле;
- Низкое кровяное давление;
- Учащенное сердцебиение или повышенное осознание сердцебиения (учащенное сердцебиение);
- Слабость или головокружение;
- Опухшие руки или ноги, одышка;
- Внезапное необъяснимое увеличение веса;
- Стойкое местное покраснение или сыпь.

Другие эффекты, которые могут возникнуть, включают:

Очень распространено (может поражать более 1 из 10 человек).

- Головная боль.

Распространено (может поражать до 1 из 10 человек).

- Зуд или дерматит.

Сообщалось о нежелательных волосах, не относящихся к коже головы (включая рост волос на лице у женщин). Всегда тщательно мойте руки после нанесения, и, если вы случайно нанесете раствор на другие части тела, кроме кожи головы, тщательно промойте большим количеством воды.

Редко (может поражать до 1 из 100 человек).

- Тошнота.

Редко (может поражать до 1 из 1000 человек).

- Может произойти изменение текстуры волос. Если это произойдет, вам следует прекратить использование Миноксифора.

Частота возникновения не известна:

- Подавленное настроение.
- Раздражение глаз.
- Рвота.
- Сообщалось о раздражении кожи головы, таком как местное покраснение, сухость, шелушение кожи. Это может быть связано с содержанием в продукте пропиленгликоля. При появлении сыпи, зудящей сыпи, волдырей, кровотечения необходимо прекратить использование этого продукта.
- Временное выпадение волос может произойти в течение первых 2-6 недель использования. Вероятно, это происходит в результате изменений в цикле роста, и он должен прекратиться в течение пары недель. В случае дальнейшего продолжения выпадения волос прекратите использование продукта и обратитесь к своему врачу.
- При изменении цвета волос вам следует прекратить использование Миноксифора.

*Сообщение о нежелательных реакциях*

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

## 5. Хранение препарата Миноксифор

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 30 месяцев.

Не использовать после истечения срока годности.

*Меры предосторожности*

Легковоспламеняющаяся жидкость: хранить вдали от источников тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей.

Держите контейнер плотно закрытым.

Хранить в хорошо проветриваемом месте.

## 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1 мл раствора содержит 20,0 мг Миноксидила;

Вспомогательные вещества: этиловый спирт 96 %, пропиленгликоль, вода очищенная.

*Внешний вид препарата Миноксифор и содержимое упаковки*

Бесцветный или слегка окрашенный с желтоватым оттенком прозрачный раствор с запахом спирта.

По 60 мл во флаконах полимерных, укупоренных насадками распыляющими. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной пачке.

**Условия отпуска:** без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель:**

ООО «Фортива Мед»

223012, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, г.п. Мачулищи, ул. Аэродромная, д. 4-2, каб.21.

Телефон + 375 17 504 62 87, факс +375 17 301 91 45

**Листок-вкладыш пересмотрен:**