

**Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата –
информация для потребителя
БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД**

Перед применением препарата полностью прочитайте инструкцию по медицинскому применению, поскольку в ней содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните инструкцию по медицинскому применению. Возможно, Вам потребуется прочитать ее еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 инструкции по медицинскому применению.

Содержание инструкции по медицинскому применению

1. Что собой представляет препарат БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД
3. Применение препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД,
и для чего его применяют**

БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД является средством растительного происхождения. Умеренно увеличивает силу сердечных сокращений, умеренно понижает артериальное давление, оказывает умеренное седативное действие. Применяется в комплексной терапии функциональных нарушений сердечной деятельности и функциональных нарушений нервной системы (неврастения).

**2. О чем следует знать перед применением
препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД**

Не принимайте препарат БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД, если:

- у Вас повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата (см. Раздел 6);
- Вы беременны или кормите грудью;
- препарат противопоказан детям до 12 лет.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, сообщите лечащему врачу перед началом приема препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД.

Особые указания и меры предосторожности

Перед началом приема препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Сообщите лечащему врачу, если:

- у Вас заболевание печени, алкогольная зависимость;
- у Вас эпилепсия;

- у Вас черепно-мозговая травма или другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога.

Всегда сообщайте врачу, если Вы уже принимаете препараты боярышника.

Во время лечения необходимо следить за артериальным давлением и результатами электрокардиограммы.

Обратитесь к врачу, если во время лечения:

- симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния;
- развиваются отеки нижних конечностей;
- появились боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или развилась дыхательная недостаточность (например, одышка).

Препарат БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД содержит этиловый спирт!

Лекарственный препарат содержит не менее 65,0 % (об/об) этанола, то есть от 513 мг до 770 мг на одну дозу (20-30 капель), что примерно соответствует от 13 мл до 19,5 мл пива или от 5,4 мл до 8,1 мл вина на дозу.

Меры предосторожности при приеме препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД

Дети и подростки

Противопоказано применение у детей младше 12 лет. Следует соблюдать осторожность при применении у детей старше 12 лет.

Другие препараты и препарат БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без назначения врача.

Существует риск того, что БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД при совместном применении может взаимодействовать с некоторыми другими препаратами.

Увеличивает силу сокращения миокарда при применении с:

- сердечными гликозидами (лекарственные препараты, используемые для лечения сердечной недостаточности).

Усиливает снижение артериального давления при применении с:

- бета-адреноблокаторами (используются для снижения артериального давления).

Не рекомендуется одновременное применение с солями алкалоидов (например, атропин, скополамин, кокаин, кофеин, хинидин, резерпин), антиаритмиками III класса (применяются при различных нарушениях сердечного ритма), а также с цизапридом (применяется при различных нарушениях моторики желудочно-кишечного тракта).

Препарат содержит этиловый спирт. Необходимо избегать совместного приема с препаратами, вызывающими дисульфирамоподобную реакцию при приеме с алкоголем (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвоту, тахикардию):

- дисульфирам (применяется при лечении алкоголизма),

- антибиотики (цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол),

- препараты, снижающие уровень сахара в крови (хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид),

- противогрибковые препараты (гризеофульвин, кетоконазол),

- противомикробные препараты (производные нитро-5-имидазола: метронидазол, орнидазол, тинидазол),

- прокарбазин (противоопухольный препарат),

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных препаратов, содержащих этиловый спирт.

Прием препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД с пищей, напитками и алкоголем

Препарат необходимо принимать за 30 минут до еды.

В период лечения следует избегать употребления алкоголя и алкогольсодержащих напитков.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Противопоказано применение препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД во время

беременности и в период грудного вскармливания. Если необходим прием препарата, кормление грудью следует приостановить.

Если Вы беременны, думаете, что можете быть беременны, или планируете иметь ребенка, проконсультируйтесь с Вашим врачом, прежде чем принимать данный препарат.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат содержит этиловый спирт! В период лечения откажитесь от управления транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

1 мл настойки содержит 20 капель.

Режим дозирования устанавливается индивидуально в зависимости от состояния и возраста пациента. Взрослым рекомендуется принимать по 20-30 капель настойки, разведенных в ¼ стакана воды, 3 раза в день.

Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени из-за содержания этилового спирта. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих препаратов.

Использование у детей и подростков

БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД применяется у детей старше 12 лет по 10-15 капель настойки, разведенных в ¼ стакана воды, 3 раза в день. Продолжительность приема у детей должна быть минимальной.

Если приняли препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД больше, чем следовало

Если Вы приняли больше назначенной дозы препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД, возможно появление сонливости, снижение артериального давления, развитие брадикардии (снижение частоты сердечных сокращений). Следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу.

Если Вы забыли принять препарат БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД

Если Вы забыли принять препарат в назначенное время, примите как можно быстрее.

Однако если наступило время следующего приема, не увеличивайте дозу препарата и примите его как обычно.

Не используйте двойную дозу препарата (две дозы в одно и то же время), если Вы пропустили прием!

Если Вы прекратите прием препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД

Если Вы хотите прекратить прием препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД раньше, чем рекомендовано, обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

Если у Вас есть любые дополнительные вопросы об использовании данного лекарственного препарата, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно сообщите лечащему врачу, если Вы испытываете любой из перечисленных симптомов после применения этого препарата, так как симптомы могут ухудшаться.

При приеме препарата возможно развитие следующих нежелательных реакций:

- Аллергические реакции.
- При длительном применении – брадикардия (снижение частоты сердечных сокращений), при применении в больших дозах – снижение артериального давления.
- Головокружение, тремор (неконтролируемая дрожь в различных частях тела), сонливость.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данной инструкции по медицинскому применению. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД

Хранить препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить препарат в недоступном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

В процессе хранения возможно выпадение осадка.

Беречь от огня.

Не выбрасывать препарат в канализацию. Уточнить у работника аптеки, как избавиться от остатков препарата, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав на один флакон: извлечение из боярышника листьев 1 : 5 (экстрагент - спирт этиловый 70 % (об/об)). Содержание этанола - не менее 65,0 % (об/об).

Внешний вид препарата БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД и содержимое упаковки

БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД, настойка, представляет собой прозрачную жидкость от красновато-коричневого до зеленовато-бурого цвета. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

По 30 мл или 50 мл во флаконах из стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона или флаконы с этикеткой многостраничной помещают в ящик из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Инструкция по медицинскому применению пересмотрена: