

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

(информация для потребителей)

по медицинскому применению лекарственного средства

Мукалтин-Ферейн**Название лекарственного средства.** Мукалтин-Ферейн.**Форма выпуска.** Таблетки.**Общая характеристика.** Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, от светло-серого до коричневатого-серого цвета с более темными и более светлыми вкраплениями, со слабым характерным запахом. Риски не предназначена для деления таблетки на равные дозы и не несет на себе функциональной нагрузки.**Состав на одну таблетку:***действующее вещество:* мукалтин (Алтея лекарственного травы экстракт сухой с содержанием суммы восстанавливающих моносахаридов не менее 8,0 % и полисахаридного комплекса не менее 50,0 %; DER: (8-12):1, экстрагент – вода) – 50 мг;*вспомогательные вещества:* натрия гидрокарбонат – 87 мг, винная кислота – 160 мг, кальция стеарат – 3 мг.**Фармакотерапевтическая группа.** Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.**Фармакологические свойства**

Мукалтин-Ферейн представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного. Лекарственное средство обладает обволакивающими и отхаркивающими свойствами.

Лекарственное средство снимает местное раздражение, незначительно угнетает мукоцилиарную активность, стимулирует фагоцитоз и оказывает противовоспалительное и антикомплементарное, иммуностимулирующее и гипогликемическое действие. Доказана эффективность при использовании для полоскания при воспалении слизистой оболочки рта и глотки.

Показания к применению

В комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (глотки, гортани), сопровождающихся сухим, раздражающим кашлем.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский возраст до 12 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин, и другими противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности

Целесообразно принимать разовые дозы лекарственного средства каждые 4 часа. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Данное лекарственное средство содержит 23,82 мг (1,04 ммоль) натрия на 50 мг (1 таблетку), что эквивалентно 1,19 % от рекомендуемой ВОЗ максимальной суточной дозы 2 г натрия для взрослого человека.

Одновременный прием препарата с другими лекарственными средствами может замедлить их абсорбцию. В качестве меры предосторожности препарат не следует применять от 1/2 до 1 часа до или после приема других лекарственных средств.

Отсутствует информация о влиянии препарата на результаты лабораторных анализов; в отношении канцерогенеза, мутагенеза, неблагоприятного воздействия на фертильность; в отношении тератогенных и нетератогенных эффектов в ходе беременности; последствий для кормящих матерей и применения у детей. В связи с этим препарат не следует принимать во время беременности и лактации или давать детям без врачебного контроля.

Дети. Лекарственное средство не следует применять у детей до 12 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводились.

Способ применения и дозировка

Взрослым, включая пациентов пожилого возраста, и детям от 12 лет вводить 1-2 таблетки 2-3 раза в день перед едой (за 30-60 минут). Курс лечения составляет в среднем 7-14 дней. Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана теплой воды.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

В случае пропуска очередного приема препарата не удваивать дозу. Далее принимать препарат по рекомендуемой схеме.

Если симптомы сохраняются более 2 недель во время использования лекарственного средства, следует проконсультироваться с врачом.

Передозировка

При длительном применении или превышении указанных доз могут возникнуть тошнота и рвота.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Побочное действие

Подобно всем лекарственным препаратам Мукалтин-Ферейн может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Редко – могут возникать менее чем у 1 человека из 1 000: диспепсия.

Частота неизвестна – исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно: аллергические реакции (крапивница, зуд).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Условия хранения и срок годности

В защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку, по 2 или 3 упаковки с листком-вкладышем в пачку из картона.

Информация о производителе

Произведено и расфасовано:

ЗАО «ВИФИТЕХ», Российская Федерация,

тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90

Упаковано:

СОО «Ферейн», Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52А,

тел./факс: (017) 394-92-18, тел.: (017) 367-37-87, 352-36-36, e-mail: office@ferane.by

