

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**

(информация для потребителей)

по медицинскому применению лекарственного средства

Хлорофиллипт-Ферейн**Название лекарственного средства.** Хлорофиллипт-Ферейн.**Форма выпуска.** Раствор масляный.**Общая характеристика.** Прозрачная темно-зеленая маслянистая жидкость.**Состав на флакон:***действующее вещество:* хлорофиллипта экстракт густой (эвкалипта листьев экстракт (DER: 10-14:1), экстрагент – 95 % этиловый спирт) с антибактериальной активностью в концентрации 12,5 мкг в 1 мл среды – 0,4 г;*вспомогательное вещество:* подсолнечное масло.**Код АТХ:** D08A X.**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие антисептические и дезинфицирующие средства.**Фармакологические свойства*****Фармакодинамика***Хлорофиллипт является смесью хлорофиллов из листьев эвкалипта прутовидного (*Eucalyptus viminalis* Labill). Препарат обладает антибактериальной активностью по отношению к стафилококкам, оказывает противовоспалительное действие.***Фармакокинетика***

Не изучалась.

Показания к применению

Применяется в комплексной терапии небольших поверхностных ран. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозировка

Перед применением препарат необходимо взболтать.

Препарат наносят на поврежденные участки кожи с помощью тампона. Частота аппликаций и длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Применение у лиц с нарушенной функцией почек и печени. Коррекция дозы не требуется.

Применение в гериатрической практике. Коррекция дозы не требуется.

Не использовать по истечении срока годности!

Побочное действие

Возможно развитие аллергических реакций (отечность слизистых оболочек, гиперемия, сыпь, зуд, раздражение кожи, крапивница, контактный дерматит, отек Квинке).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к каким-либо компонентам лекарственного средства.

Передозировка

Возможно усиление побочного действия.

Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности

Перед началом применения необходимо проконсультироваться с врачом.

После первого применения необходимо сделать перерыв на 6-8 часов. Курсовое лечение лекарственным средством возможно после подтверждения отсутствия аллергической реакции на хлорофиллипта экстракт густой (вероятность отека губ, слизистой оболочки носа, зева и других аллергических реакций). Если появились какие-либо из указанных симптомов, применение лекарственного средства необходимо прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

При нанесении лекарственных средств листьев эвкалипта на лицо существует риск развития ларингоспазма, особенно у детей младшего возраста.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

В случае ухудшения состояния или появления признаков инфицирования раны, необходимо обратиться к врачу.

Дети. В связи с отсутствием достаточных данных лекарственное средство не следует применять детям до 18 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность при применении лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не изучались, поэтому лекарственное средство не следует применять беременным и кормящим женщинам.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Информация о влиянии применения лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами отсутствует.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

При совместном использовании с перекисью водорода для обработки ожогов и трофических язв хлорофиллипт выпадает в осадок. Во избежание этого, после нанесения перекиси водорода, рану необходимо промыть стерильным изотоническим раствором натрия хлорида.

Условия хранения и срок годности

Не храните при температуре выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности – 2 года.

Не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка

По 20 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми с листком-вкладышем в упаковке № 1.

Информация о производителе.

Произведено и расфасовано:

ЗАО «ВИФИТЕХ», Российская Федерация,
тел./факс: +7 495 716-15-81, +7 495 716-15-90

Упаковано:

СОО «Ферейн», Республика Беларусь,
220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52А
тел./факс: +375 17 394-92-18
E-mail: office@ferane.by