	РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» г. Минск, Республика Беларусь	МОДУЛЬ 1
	МУКОСАТ-БЕЛМЕД, КАПСУЛЫ, 250 МГ	

**1.3. Общая характеристика лекарственного препарата, инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш), маркировка**

**1.3.1. Проект общей характеристики лекарственного препарата, инструкции по медицинскому применению (листка-вкладыша)**

**1.3.1.1 Проект инструкции по медицинскому применению (листка-вкладыша)**

**Листок-вкладыш – информация для потребителя**  
**МУКОСАТ-БЕЛМЕД, капсулы 250 мг**  
**Действующее вещество: хондроитина сульфат натрия**

**Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.**

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат МУКОСАТ-БЕЛМЕД, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД
3. Прием препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что из себя представляет препарат МУКОСАТ-БЕЛМЕД,  
и для чего его применяют**

Лекарственный препарат МУКОСАТ-БЕЛМЕД содержит действующее вещество хондроитина сульфат натрия. Хондроитина сульфат является неотъемлемым компонентом основного вещества кости и хряща.

Препарат применяется у взрослых и детей старше 15 лет для облегчения боли при остеоартрозе тазобедренных и коленных суставов (в составе комплексной терапии).

Данный лекарственный препарат обладает медленным действием с отсроченным эффектом (приблизительно 2 месяца). Его действие может сохраняться после прекращения терапии.

**2. О чем следует знать перед приемом препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД**

**Не принимайте препарат МУКОСАТ-БЕЛМЕД, если:**

– у вас аллергия на хондроитина сульфат или на любой из вспомогательных компонентов препарата (см. раздел 6).

МУКОСАТ-БЕЛМЕД противопоказан к применению у детей младше 15 лет.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, сообщите лечащему врачу.

**Особые указания и меры предосторожности**

Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, прежде чем принимать МУКОСАТ-БЕЛМЕД.

### **Дети и подростки**

МУКОСАТ-БЕЛМЕД не следует применять у детей младше 15 лет (данные по эффективности и безопасности применения у детей отсутствуют).

### **Другие препараты и препарат МУКОСАТ-БЕЛМЕД**

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым, в том числе растительным препаратам или препаратам, отпускаемым без рецепта врача.

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применением препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В качестве меры предосторожности рекомендуется избегать применения препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД во время беременности и грудного вскармливания.

Исследования на животных не показывали никакого влияния на фертильность.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Влияние МУКОСАТ-БЕЛМЕД на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не изучалось.

### **Препарат МУКОСАТ-БЕЛМЕД содержит натрий**

Данный лекарственный препарат содержит 22,6 мг натрия (основной компонент поваренной/пищевой соли) в одной капсуле. Это эквивалентно 1% от максимального рекомендованного суточного потребления для взрослых.

## **3. Прием препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем, рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Режим дозирования**

Препарат следует применять только у взрослых и подростков старше 15 лет.

Рекомендованная доза составляет по 2 капсулы (2×250 мг) 2 раза в день, что эквивалентно 1000 мг в сутки.

### **Дети**

Применение хондроитина сульфата у детей недостаточно изучено, поэтому применение у детей младше 15 лет не рекомендуется.

### **Способ применения**

Капсулы принимают внутрь. Капсулы следует проглатывать целиком, запивая большим количеством воды.

### **Если вы пропустили прием препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД**

Если вы пропустили прием препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД, примите его, как только вспомните об этом. Однако если уже почти наступило время для приема следующей дозы, не принимайте пропущенную дозу и продолжайте принимать препарат как обычно. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

### **Если вы приняли препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД больше, чем вам рекомендовано**

Если вы считаете, что вы приняли слишком высокую дозу препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД, немедленно обратитесь к врачу. При передозировке назначают симптоматическое лечение.

### **Если вы прекратили прием препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД**

Ваш врач скажет, как долго необходимо продолжать лечение. Вам необходимо посоветоваться с врачом перед тем, как прекращать прием этого препарата.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по применению этого препарата, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

#### 4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, МУКОСАТ-БЕЛМЕД может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**При применении препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД могут возникать следующие нежелательные реакции:**

*Часто* (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

– головокружение, диарея, боль в животе и тошнота.

*Нечасто* (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

– крапивница, кожная сыпь, зуд и отек лица.

*Редко* (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

– рвота, ангионевротический отек (тяжелая аллергическая реакция, которая может вызвать внезапный отек лица и горла) и покраснение.

#### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через [www.rceth.by](http://www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### 5. Хранение препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД

Храните в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C.

Храните препарат в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 3 года.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не применяйте препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Не применяйте препарат, если вы заметили, что контурная ячейковая упаковка, в которой находятся капсулы, повреждена.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от остатков препарата, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### 6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

Одна капсула содержит *действующее вещество*: хондроитина сульфат натрия – 250 мг.

*Вспомогательные вещества*: кальция стеарат, крахмал картофельный.

*Состав капсулы твердой желатиновой*: желатин, титана диоксид.

#### Внешний вид препарата МУКОСАТ-БЕЛМЕД и содержимое упаковки


МУКОСАТ-БЕЛМЕД – капсулы твердые желатиновые, номер 0, белого цвета.

Содержимое капсул – смесь порошка и гранул от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого с сероватым оттенком цвета, без запаха, гигроскопичная. Допускается наличие уплотнений капсульной массы в виде столбика или таблетки, которые при надавливании стеклянной палочкой рассыпаются.

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. Две или три контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

*Упаковка для стационаров*: по 90 контурных упаковок с соответствующим количеством листов-вкладышей помещают в коробку из картона.

**Условия отпуска:** без рецепта.



**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

РУП «Белмедпрепараты»,  
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,  
ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,  
e-mail: medic@belmedpreparaty.com



За любой информацией о препарате следует обратиться к держателю регистрационного удостоверения.

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: [www.rceth.by](http://www.rceth.by).

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by).