

Листок-вкладыш – информация для потребителя

Пантенол-Белмед, 50 мг/г, мазь для наружного применения

Действующее вещество: Декспантенол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Пантенол-Белмед, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Пантенол-Белмед.
3. Применение препарата Пантенол-Белмед.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Пантенол-Белмед.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Пантенол-Белмед, и для чего его применяют

Препарат Пантенол-Белмед содержит действующее вещество декспантенол, которое стимулирует восстановление кожи после повреждений, нормализует метаболизм (обмен веществ) в клетках.

Показания к применению

Препарат Пантенол-Белмед применяется у взрослых и детей с рождения по показаниям:

- для лечения и ухода за кожей ребенка (при опрелостях и пеленочном дерматите) и кормящей матери (уход за молочной железой в период лактации: лечение сухости сосков и болезненных трещин),
- для профилактики и лечения сухости кожи при нарушении целостности ее покровов,
- для активизации процесса заживления кожи при мелких повреждениях, легких ожогах, ссадинах, кожных раздражениях, хронических язвах, пролежнях, трещинах и при пересадке кожи.

Способ действия препарата

Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и играет важную роль как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов; стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм.

При наружном применении быстро абсорбируется кожей (быстро превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму и выводится в неизмененном виде.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Пантенол-Белмед

Противопоказания

Не применяйте препарат Пантенол-Белмед:

- если у Вас аллергия на декспантенол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Пантенол-Белмед проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Избегайте попадания мази на слизистые оболочки глаз, носа.

Другие препараты и препарат Пантенол-Белмед

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Пантенол-Белмед можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Если препарат используется для обработки трещин сосков во время грудного вскармливания, он должен быть смыт перед кормлением грудью.

Препарат Пантенол-Белмед содержит цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин

Цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин могут вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Пантенол-Белмед не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата Пантенол-Белмед

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Профилактика и лечение опрелостей: наносят на кожу ребенка при каждой смене подгузника.

Уход за молочными железами кормящих матерей: наносят на область соска после каждого кормления. Перед кормлением мазь необходимо смыть.

Поврежденный или воспаленный участок кожи: наносят 1–2 раза в день (при необходимости чаще).

Путь и (или) способ введения

Наружно. Выдавливают небольшое количество мази (размером примерно с горошину) на руки, растирают в ладонях и наносят легкими движениями.

Если Вы применили препарат Пантенол-Белмед больше, чем следовало

Декспантенол даже в высоких дозах хорошо переносится и не вызывает каких-либо нежелательных реакций. До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. Случаи гипervитаминоза неизвестны.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Пантенол-Белмед может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Сообщите врачу, если у Вас возникнут:

- аллергические реакции (крапивница, зуд).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через <http://www.rceth.by>. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ПАНТЕНОЛ-БЕЛМЕД

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 25°C.

Не применяйте препарат после истечения срока годности.

Срок годности—2 года.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не применяйте препарат, если Вы заметили нарушение целостности тубы.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как утилизировать препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

Препарат Пантенол-Белмед содержит

Действующим веществом является декспантенол.

Один грамм мази содержит *действующее вещество*: декспантенол – 50 мг.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: парафин жидкий, парафин мягкий белый, протегин XN, масло миндальное очищенное, воск пчелиный белый (E901), цетиловый спирт, стеариловый спирт, вода очищенная.

Препарат Пантенол-Белмед содержит цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Пантенол-Белмед и содержимое упаковки

Препарат Пантенол-Белмед, мазь для наружного применения 50 мг/г, – однородная мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета со специфическим запахом.

По 30 г в тубы алюминиевые с защитной мембраной и навинчивающимся колпачком из полимерного материала. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

РУП «Белмедпрепараты»

220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30

тел./факс: (+375 17) 220 37 16

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



За любой информацией о препарате следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» <https://www.rceth.by>.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте www.rceth.by.