

Листок-вкладыш: Информация для пациента/потребителя
УТВЕРЖДЕНО
Министерство здравоохранения
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 13.05.2025 № 579
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002

Клотримазол, 100 мг, суппозитории вагинальные
клотримазол

Перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 4 дня, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол
3. Применение препарата Клотримазол
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Клотримазол
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол и для чего его применяют

Препарат содержит действующее вещество клотримазол, которое относится к группе производных имидазола и является противогрибковым препаратом.

Применяется у женщин для лечения вагинальных инфекций, вызванные дрожжевыми грибами рода *Candida* (кандидозного вагинита).

Используйте этот препарат только в том случае, если ваш врач ранее поставил вам диагноз кандидозного вагинита (молочница).

Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 4 дня, вам следует обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол

Не применяйте препарат Клотримазол:

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на клотримазол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- в менструальном периоде;
- если вы в I-ом триместре беременности или кормите грудью;
- в детском возрасте до 16 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки:

- если у вас было более двух случаев развития кандидозного вагинита за последние шесть месяцев;
- если у вас или у вашего полового партнера были инфекции, передающиеся половым путем;

- если беременны или предполагаете беременность;
- если возраст до 16 лет или старше 60 лет;
- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на производные имидазола или другие вагинальные противогрибковые препараты;
- если имеется любой из ниже перечисленных симптомов:
 - ✓ нерегулярные вагинальные кровотечения;
 - ✓ патологические вагинальные кровотечения или кровянистые выделения;
 - ✓ язвы, пузыри или раны во влагалище или наружных женских половых органов;
 - ✓ боль внизу живота, болезненное или затрудненное мочеиспускание;
 - ✓ покраснение, раздражение или припухлость в область половых органов, связанные с лечением клотrimазолом;
 - ✓ лихорадка (температура 38 °C и выше);
 - ✓ тошнота или рвота;
 - ✓ диарея;
 - ✓ вагинальные выделения с неприятным запахом.

Во время лечения препаратом Клотrimазол не применяйте тампоны, спринцевание, спермициды или другие препараты, вводимые вагинально.

Рекомендуется избегать половых актов при применении препарата, так как инфекция может передаться партнеру.

Клотrimазол суппозитории вагинальные можно применять повторно, если симптомы возобновились через 7 дней. Если выявлен рецидив инфекции чаще, чем два раза на протяжении шести месяцев, необходимо проконсультироваться с врачом.

Дети и подростки

Препарат не рекомендуется детям в возрасте до 16 лет.

Другие препараты и препарат Клотrimазол

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат может нарушать целостность латексных изделий (например, презервативов, диафрагм) и, как следствие, снизить их эффективность при одновременном применении. Используйте другие меры контрацепции во время лечения и, как минимум, на протяжении 5 дней после окончания курса терапии препаратом.

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете такролимус или сиролимус (препараты, применяемые после пересадки органов для контроля иммунного ответа организма).

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Препарат противопоказан в I триместре беременности. Применение во II и III триместрах беременности возможно только по назначению врача, после тщательной оценки соотношения польза/риск.

Грудное вскармливание

Не рекомендуется применять препарат в период грудного вскармливания. При необходимости применения кормление грудью следует прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

3. Применение препарата Клотримазол

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с ~~листком раздаточным № 0002~~ рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений, посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые и подростки старше 16 лет

Рекомендуется по одному суппозиторию (100 мг) 2 раза в день (утром и вечером) в течение 3 дней или по одному суппозиторию (100 мг) в день в течение 6 дней вечером, перед сном. При необходимости, курс лечения можно повторить после консультации врача.

Не применяйте препарат во время менструации. Лечение необходимо прекратить до начала менструации.

Способ применения

Препарат предназначен для вагинального применения.

Суппозитории вводятся глубоко во влагалище, насколько это возможно, в положении лежа на спине, с раздвинутыми и слегка согнутыми ногами.

Если вы применили препарата Клотримазол больше, чем следовало

В связи с низкой абсорбцией препарата передозировка при вагинальном применении маловероятна.

При случайном проглатывании, обратитесь к врачу или в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.

Если вы забыли применить препарат Клотримазол

Если вы забыли применить очередную дозу препарата, примените ее, как только вспомнили, затем продолжайте лечение в прежнем режиме.

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили применение препарата Клотримазол

Применяйте препарат на протяжении всего периода лечения, даже если симптомы заболевания исчезли раньше. Соблюдение этих рекомендаций поможет предупредить развитие реинфекции.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако, они возникают не у всех.

Во время лечения могут возникнуть серьезные нежелательные реакции

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции с такими симптомами как обмороки, артериальная гипотензия, затрудненное дыхание, крапивница, зуд.

В случае появления таких серьезных нежелательных реакций, прекратите применение препарата Клотримазол и НЕМЕДЛЕННО обратитесь к врачу.

Другие возможные нежелательные реакции:

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- шелушение кожи в области половых органов, зуд, сыпь, отеки, дискомфорт, раздражение, чувство жжения, боль в области малого таза, вагинальное кровотечение;
- покраснения, выделения из влагалища;

- тошнота;
- боль в животе.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Сайт: www.rcefh.by

5. Хранение препарата Клотримазол

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Хранить при температуре ниже 25 °C.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до...». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не выбрасывайте препараты в канализацию/водопровод. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Клотримазол содержит

- Действующим веществом является клотримазол. Каждый суппозиторий содержит 100 мг клотримазола.
- Прочим ингредиентом является: твердый жир.

Внешний вид Клотримазол и содержимое упаковки

Суппозитории цилиндрической формы, белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Препарат упакован по 6 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из ПВХ/ПЭ пленки, по 1 контурной ячейковой упаковке вместе с листком-вкладышем в картонную пачку.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ЗАО «ИНТЕГРАФАРМ»

Республика Беларусь, 223045, Минская область, Минский р-н,

Юзуфовский с/с, 8-5, р-н а/г Юзуфово

тел.: +375 17 504 22 60

e-mail: office@integrafarm.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения по адресу:

Республика Беларусь, 223045, Минская область, Минский р-н,

Юзуфовский с/с, 8-5, р-н а/г Юзуфово

тел.: +375 17 504 22 60,

e-mail: office@integrafarm.by