

Листок-вкладыш: информация для потребителя
Декспантенол ФТ, 40 мг/г, гель для наружного применения
Действующее вещество: декспантенол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.
- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Декспантенол ФТ, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Декспантенол ФТ.
3. Применение препарата Декспантенол ФТ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Декспантенол ФТ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Декспантенол ФТ, и для чего его применяют

Лекарственный препарат Декспантенол ФТ предназначен для наружного применения. Его действующее вещество декспантенол ускоряет регенерацию кожи в процессе заживления ран.

Препарат Декспантенол ФТ применяется у взрослых для:

- лечения сухой и раздраженной, однако, неповрежденной кожи: гиперемия, ожог от солнечных лучей, места давления, легкие ожоги и обработка шероховатых участков кожи (например, руки, локти, ноги);
- профилактической обработки сухой, покрасневшей кожи; ускорения заживления и эпителизации кожи при микроповреждениях (незначительные ожоги и царапины), раздражениях кожи (которые являются следствием радио-, фототерапии или облучения ультрафиолетовым светом);
- медикаментозной обработки кожи пациентов после применения кортикостероидов.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Декспантенол ФТ

Противопоказания

Не применяйте препарат Декспантенол ФТ:

- если у Вас повышенная чувствительность (аллергия) к декспантенолу, а также к любым другим компонентам препарата (перечисленным в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Декспантенол ФТ проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или работником аптеки.

Следует избегать попадания геля в глаза (в случае попадания промыть глаза теплой водой).

Не рекомендуется наносить гель Декспантенол ФТ на слизистые оболочки.

При ухудшении течения заболевания или появлении новых симптомов, возникших при лечении гелем Декспантенол ФТ, рекомендуется обратиться к врачу.

Дети

Не рекомендуется использование у детей и подростков в возрасте до 18 лет из-за отсутствия соответствующих клинических данных.

Другие препараты и препарат Декспантенол ФТ

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Данные относительно лекарственных взаимодействий отсутствуют.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или работником аптеки.

Применение допустимо, если польза от применения превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Декспантенол ФТ не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Декспантенол ФТ содержит бензалкония хлорид, диметилсульфоксид и бензиловый спирт

Препарат содержит бензалкония хлорид и диметилсульфоксид, которые могут вызывать кожные реакции, раздражать кожу.

Не наносите данный лекарственный препарат на грудь, если Вы кормите грудью, поскольку ребенок может проглотить его вместе с молоком.

1 г препарата содержит 10,0 мг бензилового спирта. Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции и раздражение кожи и слизистых оболочек.

3. Применение препарата Декспантенол ФТ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемые дозы

Лекарственный препарат предназначен только для наружного применения у взрослых. Гель наносят на пораженные участки кожи однократно или несколько раз в сутки, в зависимости от необходимости.

Не рекомендуется нанесение геля Декспантенол ФТ на мокнущие раны.

Продолжительность лечения

Продолжительность лечения определит Ваш лечащий врач. Длительность лечения зависит от степени тяжести и течения заболевания.

Если Вы применили большее количество препарата Декспантенол ФТ, чем следовало

Случаи передозировки при местном применении декспантенола не описаны.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лекарственному врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Определить точную частоту встречаемости каждой из них не представляется возможным. При применении препарата возможно развитие кожных и аллергических реакций, таких как контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, покраснение, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи и изъязвление.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а.

Телефон: +375 (17) 242 00 29; факс: +375 (17) 242 00 29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Декспантенол ФТ

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Храните препарат в оригинальной упаковке (туба) для защиты от света при температуре не выше 25°C.

Срок годности указан на упаковке. Не применяйте препарат после истечения срока годности. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Декспантенол ФТ содержит

Действующим веществом является декспантенол.


1 г геля Декспантенол ФТ содержит 40,0 мг декспантенола.

Прочими вспомогательными веществами являются: этиловый спирт 96 %, глицерин, карбомер, диметилсульфоксид, повидон (К17), бензалкония хлорид, диэтаноламин, бензиловый спирт, вода очищенная.

Препарат Декспантенол ФТ содержит бензалкония хлорид, диметилсульфоксид и бензиловый спирт (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Декспантенол ФТ и содержимое упаковки

Гель для наружного применения.



Бесцветный или с желтоватым оттенком непрозрачный гель, консистенции. Допускается наличие пузырьков воздуха.
По 30 г в тубах из комбинированного материала с бушонами или в тубах из полимерного материала. Каждая туба вместе с листком-вкладышем помещена в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель
ООО «Фармтехнология»
220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22.
Телефон: (017) 309 44 88.
E-mail: ft@ft.by.

Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.
Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа Евразийского экономического союза www.rceh.by