

## Листок-вкладыш - информация для пациента

### Лорсепт, 1,5 мг, таблетки для рассасывания

Действующее вещество: цетилпиридиния хлорид

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 3 дня, необходимо обратиться к врачу.

#### Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Лорсепт, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Лорсепт.
3. Применение препарата Лорсепт.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Лорсепт.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

#### 1. Что из себя представляет препарат Лорсепт, и для чего его применяют

Препарат Лорсепт содержит действующее вещество цетилпиридиния хлорид. Относится к группе «Препараты для лечения заболеваний горла. Антисептики». Оказывает бактерицидное и фунгицидное действие в отношении ряда бактерий и грибов.

Препарат Лорсепт применяется у взрослых и детей старше 6 лет в качестве местного вспомогательного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и глотки.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через 3 дня, необходимо обратиться к врачу.

#### 2. О чём следует знать перед применением препарата Лорсепт

##### Не применяйте препарат Лорсепт:

- если у Вас аллергия на цетилпиридиния хлорид, ментол или любые другие компоненты

- препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- при гиперчувствительности дыхательных путей, бронхоспастических реакциях, бронхиальной астме;
  - при наличии судорог (в том числе, фебрильных) у детей в анамнезе;
  - если у Вас имеются повреждения слизистой оболочки рта или горла;
  - если ребенку меньше 6 лет.



### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Лорсепт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В случае подозрения на развитие бактериальной инфекции лечащий врач назначит системную антибиотикотерапию.

При вирусных поражениях слизистой оболочки полости рта монотерапия цетилпиридинием будет пересмотрена врачом.

Если у Вас имеются повреждения слизистых оболочек, препарат Лорсепт не следует использовать из-за возможных проблем с заживлением ран.

Если у Вас диагностирован контактный дерматит, Вы не должны использовать препарат Лорсепт.

### **Другие препараты и препарат Лорсепт**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе, препараты, отпускаемые без рецепта.

Четвертичные аммониевые соединения инактивируются белками сыворотки крови, гнойным экссудатом, а также фосфолипидами и другими липидсодержащими веществами.

Использование анионных ПАВ (например, зубная паста) снижает эффективность цетилпиридиния хлорида.

### **Препарат Лорсепт с пищей**

Не рекомендуется таблетки для рассасывания запивать молоком, так как возможно снижение антимикробной активности.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Из-за отсутствия достаточных данных, применение при беременности и кормлении грудью не рекомендуется.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Не влияет.

### **Препарата Лорсепт содержит сорбитол**

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

## **3. Применение препарата Лорсепт**

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если при приеме лекарственного препарата симптомы сохраняются или усиливаются через 3 дня, необходимо обратиться к врачу.

### **Рекомендуемая доза:**

Взрослые и подростки: рассасывать по 1 таблетке каждые 2 часа. Суточная доза не должна превышать 8 таблеток.

Дети старше 6 лет: рассасывать по 1 таблетке каждые 4 часа. Суточная доза не должна превышать 4 таблеток.

**Особые группы пациентов:**

*Пациенты с нарушением функции печени*

С осторожностью.

*Пациенты с нарушением функции почек*

Нет данных о необходимости коррекции дозы.

*Пациенты пожилого возраста*

Нет данных о необходимости коррекции дозы.

**Способ применения**

Для достижения оптимального эффекта таблетку следует медленно рассасывать во рту (не разжевывать и не глотать целиком).

**Если Вы применили препарата Лорсепт больше, чем следовало**

Не применяйте препарат в дозах, превышающих рекомендованные. Если Вы применили препарата Лорсепт больше, чем следовало, у Вас могут развиться симптомы, наблюдавшиеся при пероральном приеме цетилпиридиния хлорида: тошнота, рвота, судороги, нарушение кровообращения и кома. Немедленно проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

**Если Вы забыли применить препарат Лорсепт**

Если Вы забыли применить очередную дозу препарата, не беспокойтесь. Медленно рассосите таблетку во рту, как только вспомните, и затем продолжайте применение препарата как обычно. Не применяйте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

**4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Лорсепт может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Лорсепт и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас появится любая из следующих серьезных нежелательных реакций: затрудненное дыхание, крапивница или другие кожные реакции.

Редко: (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- реакции гиперчувствительности;
- изъязвления слизистой оболочки полости рта, преходящее коричневатое окрашивание языка и зубов, ощущение жжения, тошнота, рвота.

Возможно нарушение заживления ран и повреждений слизистой оболочки.

Возможно развитие сенсибилизации к цетилпиридинию.

**Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных:

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

Тел.: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: [repl@rceth.by](mailto:repl@rceth.by)

Сайт: <https://www.rceth.by>

**5. Хранение препарата Лорсепт**

Храните лекарственный препарат в недоступном и невидном для детей месте.  
Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °C.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работников аптеки, как утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

### Препарат Лорсент содержит

Действующим веществом препарата является цетилпиридиния хлорид.

#### 1 таблетка для рассасывания с вишневым вкусом:

активное вещество: цетилпиридиния хлорид 1,5 мг;

вспомогательные вещества: повидон К30, ароматическая добавка «Вишня» (мальтодекстрин, аравийская камедь (E414), ароматическая композиция), левоментол, кальция стеарат, тальк, сорбитол.

#### 1 таблетка для рассасывания с клубничным вкусом:

активное вещество: цетилпиридиния хлорид 1,5 мг;

вспомогательные вещества: повидон К30, ароматическая добавка «Клубника» (мальтодекстрин, аравийская камедь (E414), пропиленгликоль (E1520), ароматическая композиция), левоментол, кальция стеарат, тальк, сорбитол.

#### 1 таблетка для рассасывания с малиновым вкусом:

активное вещество: цетилпиридиния хлорид 1,5 мг;

вспомогательные вещества: повидон К30, ароматическая добавка «Малина» (мальтодекстрин, пропиленгликоль (E1520), ароматическая композиция), левоментол, кальция стеарат, тальк, сорбитол.

### Внешний вид препарата Лорсент и содержимое упаковки

Препарат Лорсент представляет собой таблетки круглые, двояковыпуклые, белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из полимерной пленки ПВХ и фольги алюминиевой. По две, три или пять контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Не все размеры упаковок могут быть доступны к реализации.

### Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

### Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «Рубикон», Республика Беларусь,  
210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,  
тел/факс: +375 (212) 36-37-06, тел.: +375 (212) 36-47-77,  
e-mail: [secretar@rubikon.by](mailto:secretar@rubikon.by)

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения с соответствующей информацией.

**Листок-вкладыш пересмотрен:**

### Прочие источники информации:

Подробные сведения о лекарственном препарате содержатся на веб-сайте Союза:  
<http://www.eurasiancommission.org>

