

**Бисакодил 10 мг суппозитории ректальные
бисакодил**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 5 дней вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет Бисакодил и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением Бисакодил
3. Применение Бисакодил
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение Бисакодил
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет Бисакодил и для чего его применяют

Препарат Бисакодил содержит действующее вещество бисакодил, относится к группе слабительных средств контактного действия. Бисакодил увеличивает секрецию воды и электролитов в толстом кишечнике, ускоряет и увеличивает его перистальтику, размягчает стул и облегчает его эвакуацию. Бисакодил не абсорбируется в организме.

Препарат Бисакодил применяется для кратковременного симптоматического лечения случайных запоров.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением Бисакодил

Противопоказания

Не применяйте препарат:

- если у вас аллергия на бисакодил или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у вас тяжелое обезвоживание с электролитными нарушениями;
- если у вас воспалительные заболевания толстой кишки, язвенный колит, болезнь Крона;
- если у вас синдром острого живота, сильные боли в животе, сопровождающиеся тошнотой и рвотой;
- если у вас непроходимость кишечника различного генеза (нарушение продвижения содержимого по кишечнику);
- детский возраст до 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Для получения слабительного эффекта важно соблюдать следующие мероприятия: повышать физическую активность, употреблять продукты, содержащие пищевые волокна, соблюдать питьевой режим.

Не рекомендуется применять препарат более 5 дней без консультации врача и выяснения причины запора. Длительное и чрезмерное применение препарата, может вызывать раздражение и меланоз толстой кишки, нарушение водно-электролитного баланса, в частности гипокалиемию, а также развитие привыкания опорожнения кишечника только после применения слабительного.

Суппозитории не рекомендуется применять пациентам с геморроем, анальными трещинами и язвенным колитом.

При диарее или болях в животе применение препарата необходимо временно прекратить.

Применять с осторожностью пациентам с печеночной и/или почечной недостаточностью.

Дети и подростки

Бисакодил 10 мг суппозитории ректальные противопоказаны в детском возрасте до 12 лет.

Другие препараты и Бисакодил

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Не рекомендуется применять одновременно с препаратами, которые могут вызвать развитие полиморфной желудочковой тахикардии типа «пируэт»:

- антиаритмические средства: амиодарон, бретилиум, дизопирамид, хинидин, сotalол;
- другие средства: астемизол, бепридил, эритромицин для внутривенного введения, галофантрин, пенгамидин, сультоприд, терфенадин, винкамин.

Необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении с:

- сердечными гликозидами;
- другими препаратами, приводящими к выведению калия: калийуретические мочегонные средства (отдельно или в комбинации), амфотерицин В для внутреннего введения, кортикоステроиды, тетракозактид.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Бисакодил не рекомендуется применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Некоторые люди могут чувствовать головокружение или слабость при применении этого лекарства. Если это произойдет с вами, подождите, пока эти чувства не исчезнут, прежде чем садиться за руль или пользоваться механизмами.

3. Применение Бисакодил

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки, или медицинской сестры.

При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, или медицинской сестрой.

Как и все слабительные, суппозитории Бисакодил не следует применять каждый день в течение более 5 дней. Если вам необходимо принимать слабительные средства каждый день или если у вас не проходит боль в животе, вам следует обратиться к врачу.

Рекомендуемая доза:

Взрослым и детям старше 12 лет: по 1 суппозиторию (10 мг) в день. Действие препарата наступает в течение 10-30 минут.

Препарат противопоказан у детей в возрасте до 12 лет.

Путь и способ введения

Суппозитории следует использовать только в заднем проходе.

- Снимите пленку.
- Лягте на бок и подтяните колени к груди. Держите одну ногу выше другой.
- Используйте указательный или средний палец, чтобы ввести суппозиторий.
- Аккуратно введите суппозиторий как можно дальше в задний проход, заостренным концом вперед.
- Опустите ноги в удобное положение, удерживая суппозиторий на месте.
- Держите суппозиторий внутри себя не менее 30 минут.

Продолжительность терапии

Эти суппозитории не следует использовать каждый день более 5 дней. Если вам каждый день нужны слабительные, вам следует обратиться к врачу, чтобы выяснить причину вашего запора. Чрезмерное применение препарата может быть вредным.

Если вы применили Бисакодил больше, чем следовало

Если вы применили более высокие дозы, чем вам назначено, обратитесь к лечащему врачу.

Применение бисакодила в высоких дозах может приводить к диарее, болям в животе и потери жидкости, калия и других электролитов. Хроническая передозировка может вызвать диарею, боль в животе, гипокалиемию и мышечную слабость (вследствие гипокалиемии).

Если вы забыли применить Бисакодил

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили применение Бисакодил

Бисакодил следует применять только при необходимости и нужно отменить после достижения эффекта.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Бисакодил может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат может вызвать другие, нежели указанные ниже нежелательные реакции.

Частота нижеперечисленных возможных нежелательных реакций:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- спазмы в животе, боль в животе
- диарея, тошнота

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- головокружение
- кровь в стуле
- рвота
- дискомфорт в животе

- дискомфорт внутри и вокруг заднего прохода
- Редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):
 - тяжелые аллергические реакции, которые могут вызвать отек лица или горла, затрудненное дыхание или головокружение. Если у вас сильная аллергическая реакция, прекратите применение этого лекарства и немедленно обратитесь к врачу.
 - обезвоживание
 - обморок
 - колит (воспаление толстой кишки, вызывающее боль в животе и диарею)

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки, или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, Минск, Товарищеский пер., 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242-00-29; факс: +375 (17) 242-00-29

Эл. почта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by

<https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Бисакодил

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Хранить в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке картонной) для защиты от влаги и света, при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке после «Годен до...». Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Бисакодил содержит

- Действующим веществом является бисакодил. Каждый суппозиторий содержит 10 мг бисакодила.
- Прочим ингредиентом является: твердый жир.

Внешний вид препарата Бисакодил и содержимое упаковки

Суппозитории цилиндрической формы, белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Препарат упакован по 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из ПВХ/ПЭ пленки, по 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в картонную пачку.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ЗАО «ИНТЕГРАФАРМ»

Республика Беларусь, 223045, Минская область,
Минский р-н, Юзуфовский с/с, 8-5, р-н а/г Юзуфово,

тел. +375 17 504 22 60,
e-mail: office@integrafarm.by

ЛП-№010765-РГ-ВУ
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 25.06.2025 № 750
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

ЗАО «ИНТЕГРАФАРМ»

Республика Беларусь, 223045, Минская область,
Минский р-н, Юзуфовский с/с, 8-5, р-н а/г Юзуфово,
тел. +375 17 504 22 60,
e-mail: office@integrafarm.by