

Листок-вкладыш – информация для пациента
Хлоропирамин, 10 мг/г, крем для наружного применения
(хлоропирамина гидрохлорид)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 5-7 дней вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Хлоропирамин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Хлоропирамин.
3. Как применять Хлоропирамин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Как хранить Хлоропирамин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Хлоропирамин и для чего его применяют

Что такое Хлоропирамин

Хлоропирамин содержит активное вещество (хлоропирамина гидрохлорид), которое относится к группе антигистаминных препаратов.

Хлоропирамин используется у взрослых и детей (от грудного возраста до 18 лет) при укусах насекомых, контактном дерматите и других зудящих дерматозах (поражениях кожи, сопровождающихся зудом), сыпи и зуде при различных аллергических состояниях, которые не затрагивают обширные участки кожи.

Как действует Хлоропирамин

Хлоропирамин обладает хорошо выраженным противоаллергическим действием. При нанесении на кожу препарат блокирует действие гистамина, который выделяется организмом при аллергических реакциях, успокаивает зуд, снимает покраснение, отек, уменьшает сыпь.

Если улучшение не наступило через 5-7 дней или наблюдается ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Хлоропирамин

Не применяйте Хлоропирамин

– если у вас аллергия (гиперчувствительность) на хлоропирамина гидрохлорид или любые другие компоненты препарата (см. раздел 6).

Если вы не уверены, стоит ли применять Хлоропирамин, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Особые указания и меры предосторожности

Не рекомендуется нанесение лекарственного препарата на открытые раны, глаза, слизистые оболочки (рта, полости носа), обширные участки кожи, места ожогов.

Перед применением препарата Хлоропирамин проконсультируйтесь с лечащим врачом, если у вас хроническое кожное заболевание с гиперкератозом (уплотнение, утолщение поверхностного слоя кожи). В таком случае более приемлемым является применение другой лекарственной формы этого препарата – мази для наружного применения.

Если у вас есть вопросы по применению Хлоропирамина, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Дети и подростки

Препарат может применяться у детей (от грудного возраста до 18 лет).

Препарат не следует применять у новорожденных и недоношенных младенцев.

Другие препараты и Хлоропирамин

Сообщите вашему лечащему врачу или работнику аптеки, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие препараты.

Нет данных о взаимодействии Хлоропирамина с другими лекарственными препаратами.

Не рекомендуется одновременное использование с другими лекарственными препаратами для местного применения.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, подозреваете, что беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

С учетом того, что данные о всасывании лекарственного препарата через кожу при местном применении отсутствуют, а также, что клинические исследования безопасности и эффективности лекарственного препарата у беременных и кормящих женщин не проводились, применение лекарственного препарата Хлоропирамин во время беременности и лактации возможно с особой осторожностью, только по рекомендации и под наблюдением врача, после оценки соотношения польза/риск для матери, плода и ребёнка.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами

Крем Хлоропирамин не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Как применять Хлоропирамин

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые и дети (от грудного возраста до 18 лет)

Наносите небольшое количество крема тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в день, легко втирая в кожу.

Путь и (или) способ введения

Лекарственный препарат предназначен для наружного применения. Не следует наносить препарат на открытые раны, глаза, слизистые оболочки (рта, полости носа), обширные участки кожи, места ожогов. Лекарственный препарат можно применять под окклюзионной повязкой или при использовании физиотерапевтических процедур с целью увеличения его проникновения и для достижения более быстрого лечебного эффекта.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения составляет 5-7 дней.

Если улучшение не наступило через 5-7 дней или наблюдается ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Если вы применили препарата Хлоропирамин больше, чем следовало

Случаи передозировки препарата маловероятны.

Если вы или ваш ребенок случайно применили более высокую дозу препарата Хлоропирамин, немедленно обратитесь к врачу.

Если Вы забыли применить препарат Хлоропирамин

Если вы забыли применить препарат Хлоропирамин в запланированное время, сделайте это как только вспомните, не следует применять двойную дозу для компенсации пропущенной.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к вашему лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Хлоропирамин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Очень редко крем Хлоропирамин может вызвать зуд или раздражение кожи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникнут какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств-членов Евразийского экономического союза: Республика Беларусь

220037, г. Минск, пер. Товарищеский 2а,

РУП «Центр экспертиз испытаний в здравоохранении»,
телефон/факс отдела фармаконадзора: 242-00-29
электронная почта: rcpl@rceth.by
www.rceth.by.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Как хранить Хлоропирамин

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Дата истечения срока годности (срока хранения)

Срок годности 2 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Предупреждения о признаках непригодности препарата к применению

Не выбрасывайте препарат в канализацию или в контейнер для бытовых отходов. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Хлоропирамин содержит

Действующее вещество: хлоропирамина гидрохлорид (chloropyramine hydrochloride).

1 г крема содержит 10 мг хлоропирамина гидрохлорида.

Каждая туба (18 г) содержит 0,18 г хлоропирамина гидрохлорида.

Вспомогательные вещества: макрогол 400, макрогол 4000.

Внешний вид препарата Хлоропирамин и содержимое его упаковки

Хлоропирамин, 10 мг/г, крем для наружного применения.

Крем белого цвета, однородной консистенции.

По 18 г в тубах алюминиевых. Каждая туба вместе с листком-вкладышем помещается в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель
Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64,
тел/факс +375 (177) 735612, 731156

Данный листок-вкладыш пересмотрен
12.2021