

Листок-вкладыш – информация для пациента

СИМЕТ ФОРТЕ, 120 мг, капсулы
Действующее вещество: симетикон

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Симет форте, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Симет форте.
3. Прием препарата Симет форте.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Симет форте.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ СИМЕТ ФОРТЕ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Симет форте содержит действующее вещество симетикон, который является средством, применяемым при функциональных нарушениях кишечника. Симет форте устраняет нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта и является вспомогательным средством для диагностических исследований. Действующее вещество – симетикон – приводит к распаду пузырьков газа, находящихся в пищевой каше и в слизи пищеварительного тракта. Высвобождающиеся при этом газы могут затем всасываться стенкой кишки и выводиться под действием перистальтики кишечника.

Препарат Симет форте применяется у взрослых, подростков и детей старше 12 лет:

- для симптоматического лечения нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, вызванных повышенным газообразованием или повышенным скоплением газов (например, вздутие живота (метеоризм), чувство переполнения), в том числе в послеоперационный период;
- для подготовки к проведению диагностических исследований в области брюшной полости, таких как, рентгенологическое, ультразвуковое, эндоскопическое исследования.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА СИМЕТ ФОРТЕ

Не принимайте препарат Симет форте если у Вас:

- аллергия на симетикон или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- непроходимость кишечника и обструктивные заболевания желудочно-кишечного тракта;
- детский возраст до 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Симет форте проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При повторном возникновении или длительном характере жалоб со стороны брюшной полости, Вам следует обратиться к врачу. Он сможет установить причину жалоб и наличие возможного заболевания, требующего иного лечения.

Дети

Препарат Симет форте противопоказан детям младше 12 лет.

Другие препараты и препарат Симет форте

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

При одновременном применении симетикона и левотироксина может наблюдаться снижение всасывания левотироксина в кишечнике.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Влияние на плод во время беременности не ожидается, поскольку активный компонент препарата – симетикон – не всасывается в желудочно-кишечном тракте и выводится в неизменном виде. Таким образом, применение препарата во время беременности допустимо, но перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Симет форте допускается применять во время грудного вскармливания, учитывая отсутствие системного действия.

В доклинических исследованиях каких-либо рисков для человека в отношении возможности воспроизводить потомство не обнаружено.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не оказывает системного воздействия на организм и не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА СИМЕТ ФОРТЕ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Для симптоматического лечения нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, вызванных повышенным газообразованием или повышенным скоплением газов (в том числе в послеоперационный период):

Рекомендуемая доза: 1 капсула после каждого основного приема пищи, но не более 4 капсул в сутки.

Для подготовки к проведению диагностических исследований в области брюшной полости, таких как, рентгенологическое, ультразвуковое, эндоскопическое исследования:

Рекомендуемая доза: за сутки до проведения исследования 1 капсула 3 раза в сутки и утром в день проведения исследования 1 капсула однократно.

Дети

Детям младше 12 лет препарат противопоказан.

Способ применения

Принимать внутрь, во время или после еды, а также, если необходимо, перед отходом ко сну.

Продолжительность терапии

Принимайте капсулы препарата Симет форте до устранения жалоб. При необходимости препарат можно принимать в течение длительного времени. Сообщите своему врачу или работнику аптеки, если Вам кажется, что эффект от лечения препаратом Симет форте слишком сильный или слишком слабый.

Если Вы приняли препарата Симет форте больше, чем следовало

Отравление при передозировке препаратом Симет форте практически исключено. Действующее вещество препарата, симетикон, разрушает пену в желудочно-кишечном тракте только физическим путем. При прохождении через кишечник симетикон не всасывается в организм и не подвергается химическим или биологическим превращениям.

Если Вы забыли принять препарат Симет форте

Пропущенную дозу можно применять в любое время.

Если Вы прекратили прием препарата Симет форте

При прекращении применения препарата, симптомов синдрома «отмены» не наблюдается.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Симет форте может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат может вызвать другие, нежели указанные ниже нежелательные реакции.

Частота нижеперечисленных возможных нежелательных реакций является *неизвестной* (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивницу (вид сыпи);
- головная боль;
- расстройство желудка, диарея (понос).

Прочитайте также раздел 2 «О чем следует знать перед применением препарата Симет форте».

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях

напрямую через систему сообщений государств экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Электронная почта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by

<http://www.rceth.by>

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СИМЕТ ФОРТЕ

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Храните при температуре не выше 25 °С.

Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Симет форте содержит:

Действующее вещество: симетикон – 120 мг.

Оболочка капсулы содержит: желатин, глицерин, вода очищенная.

Внешний вид Симет форте и содержимое упаковки

Капсулы мягкие желатиновые шарообразной или почти шарообразной формы со швом и гладкой поверхностью полупрозрачные от бесцветного до светло-желтого цвета.

По 15 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,

220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 26

Телефон/факс: +375 17 276-01-59

Электронная почта: info@mic.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен

Дата последнего пересмотра:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза:

<https://eec.eaeunion.org/>