

Листок-вкладыш – информация для пациента

Аммиак, 100 мг/мл, раствор для наружного применения

Действующее вещество: аммиака раствор концентрированный

Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержится важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком, рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

- Что из себя представляет препарат Аммиак, и для чего его применяют.
- О чём следует знать перед применением препарата Аммиак.
- Применение препарата Аммиак.
- Возможные нежелательные реакции.
- Хранение препарата Аммиак.
- Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ АММИАК, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Аммиак оказывает стимулирующее действие на дыхательный центр, действуя через рецепторы верхних дыхательных путей (окончания тройничного нерва). При наружном нанесении на кожу – антисептическое действие.

Показания к применению

Аммиак используют в качестве средства скорой помощи для стимуляции дыхания и выведения пациентов из обморочного состояния.

Аммиак применяют наружно в виде примочек при укусах насекомых.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА АММИАК

Не применяйте препарат Аммиак:

- если у Вас аллергия на аммиак;
- если у Вас кожные заболевания (в т.ч. дерматит, экзема) (при нанесении препарата на кожу);
- у детей возрастом до 3 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Аммиак проконсультируйтесь с работником аптеки.

При наружном применении наносите препарат Аммиак только на неповреждённую кожу.

Избегайте попадания в глаза. При случайном поражении слизистой оболочки глаз – необходимо промыть глаза водой несколько раз (в течение 15 мин с перерывом 10 мин) или 3 % раствором борной кислоты. Масла и мази не применяют. При поражении носа и глотки применяют натуральные соки.

В случае передозировки или случайного приема внутрь (проглатывания) лекарственного препарата необходимо прекратить применение лекарственного препарата и

немедленно обратиться за медицинской помощью. При случайном приеме препарата Аммиак внутрь необходимо пить воду, фруктовый сок, молоко до полной нейтрализации содержимого желудка.

Дети и подростки

Дети особенно чувствительны к действию аммиака, поэтому следует соблюдать осторожность при применении препарата в данной возрастной категории.

Не применять у детей до 3 лет.

Другие препараты и препарат Аммиак

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяли, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами не установлены.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

В период беременности и грудного вскармливания применение лекарственного препарата возможно лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Аммиак не оказывает влияния на способность управлять транспортным средством и работать с механизмами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АММИАК

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

При укусах насекомых препарат Аммиак применяют наружно в виде примочек (длительность процедуры – до 30 секунд).

Для стимуляции дыхания и выведения пациентов из обморочного состояния: осторожно поднести небольшой кусок ваты или марли, смоченной аммиаком, к носовым отверстиям (на расстояние 0,5–1 см).

Путь и (или) способ введения

Препарат применяют ингаляционно или наружно.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарственного препарата, обратитесь к своему врачу или работнику аптеки

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Аммиак может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.


При вдыхании паров раствора аммиака может возникнуть рефлекторная остановка дыхания, усиленная выработка слюны (гиперсаливация), першение в горле, покраснение слизистой оболочки полости рта.

При наружном применении возможны раздражения, дерматиты, экземы в месте аппликации, аллергические реакции.

При случайном проглатывании – ожог пищевода и желудка.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе, на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на



веб-сайте www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242 00 29

Факс: +375 (17) 242 00 29

Эл. почта: rcpl@rceth.by

<http://www.rceth.by>

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АММИАК

Хранить при температуре не выше 25 °С. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Срок годности: 5 лет.

Не применяйте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Аммиак содержит:

Действующее вещество: аммиака раствор концентрированный 25 %.

Одна ампула (1 мл) содержит 0,44 мл действующего вещества.

Вспомогательные вещества: вода очищенная.

Внешний вид препарата Аммиак и содержимое упаковки

Раствор для наружного применения.

Прозрачная бесцветная летучая жидкость с характерным острый запахом аммиака.

По 1 мл в ампулах из стекла.

10 ампул вместе с ножом или скарификатором для вскрытия ампул и листком-вкладышем помещают в коробку из картона (№10).

В случае использования ампул с кольцом излома или с насечкой и точкой излома, вложение ножа или скарификатора для вскрытия ампул не предусматривается.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: +375 (177) 735612, 744280

E-mail: market@borimed.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в ОХЛП и доступны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-сайте <http://eec.eaeunion.org/>