



Листок-вкладыш – информация для пациента

ЦЕРОТИЛИН, 600 мг, капсулы

Действующее вещество: холина альфосцерат

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Церотилин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Церотилин.
3. Прием препарата Церотилин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Церотилин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ЦЕРОТИЛИН, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Действующим веществом препарата Церотилин является холина альфосцерат, который на фоне возрастных изменений головного мозга положительно влияет на функцию памяти и познавательные способности, а также на эмоциональное состояние и поведение.

Показания к применению

Препарат Церотилин применяется у взрослых для лечения:

- психоорганического синдрома (состояния общей психической беспомощности со снижением памяти, сообразительности; ослаблением воли, снижением трудоспособности и иных возможностей адаптации);
- последствий цереброваскулярной недостаточности у лиц пожилого возраста (хронического нарушения кровообращения, что приводит к кислородному голоданию тканей головного мозга), характеризующиеся нарушением памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации, инициативности, способности к концентрации внимания;
- нарушений поведения и эмоционально-чувственного отношения к жизни в старческом возрасте (перепады настроения и эмоций, повышенная раздражительность, снижение интереса).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Если Вы приняли препарата Церотилин больше, чем следовало
Признаками передозировки холина альфосцерата являются тошнота и головная боль. При появлении этих симптомов сразу обратитесь к врачу в медицинское учреждение.

Если Вы забыли принять препарат Церотилин

Не принимайте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Церотилин

Если Вы прекратите прием препарата, то вполне возможно, что у Вас снова появятся симптомы заболевания. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ.

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нежелательные реакции перечислены в соответствии с частотой встречаемости:

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- кратковременная спутанность сознания;
- боль в животе.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции;
- аллергические высыпания;
- головная боль;
- гастрит, язвенная болезнь желудка, диарея.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств - членов Евразийского экономического союза:

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон/факс отдела фармаконадзора: +375 17 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: www.rceth.by

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЦЕРОТИЛИН

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Храните в оригинальной упаковке (пачке) для защиты от света и влаги при температуре не выше 25 °С.

Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке после «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуются. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Церотилин содержит

Действующим веществом является холина альфосцерат.

Каждая капсула содержит 600 мг холина альфосцерата.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) препарата Церотилин являются: вода очищенная, глицерин.

Оболочка капсулы содержит: желатин, глицерин, сорбитола раствор некристаллизующийся, вода очищенная, титана диоксид (E171), железа оксид красный (E172).

Внешний вид препарата и содержимое упаковки

Капсулы мягкие желатиновые, продолговатой формы, от красного до коричневого цвета.

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

УП «Минскинтеркапс»

220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 26

Телефон/факс: +375 17 276-01-59

Электронная почта: info@mic.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен

Дата последнего пересмотра:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза:
<https://eec.eaeunion.org/>