

Листок-вкладыш – информация для пациента**Локсидол-Риб, 7,5 мг, таблетки****Локсидол-Риб, 15 мг, таблетки****Мелоксикам**

Перед применением препарата внимательно изучите весь листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь за консультацией к лечащему врачу или фармацевту.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША:

1. Что из себя представляет препарат Локсидол-Риб, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Локсидол-Риб.
3. Прием препарата Локсидол-Риб.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Локсидол-Риб.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ЛОКСИДОЛ-РЕБ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Препарат Локсидол-Риб содержит действующее вещество мелоксикам. Мелоксикам относится к группе лекарственных препаратов, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), которые используются для уменьшения воспаления и боли в суставах и мышцах.

Препарат Локсидол-Риб принимается для лечения взрослых и детей в возрасте 16 лет и старше.

Препарат Локсидол-Риб принимается для:

- краткосрочного лечения обострения остеоартроза;
- долгосрочного лечения:
 - ревматоидного артрита;
 - анкилозирующего спондилита.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ЛОКСИДОЛ-РЕБ

Не принимайте лекарственный препарат Локсидол-Риб:

- если у Вас аллергия на мелоксикам или на любые другие компоненты препарата, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у Вас третий триместр беременности;
- в детском и подростковом возрасте до 16 лет;
- если у Вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту (аспирин) или другие НПВП;
- если после приема ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и других НПВП у Вас когда-либо наблюдалось дыхание со свистящими хрипами, чувство стеснения в грудной клетке, одышка, носовые полипы (вызывающие затруднение носового дыхания из-за отека слизистой оболочки носа), внезапно развившийся отек кожи или слизистых оболочек, например, отек вокруг глаз, лица, губ, рта или горла, который мог

привести к затруднению дыхания (ангионевротический отек), кожная сыпь/крапивница;

- если у Вас когда-либо были кровотечения или перфорации в желудке или кишечнике, связанные с приемом НПВП;
- если у Вас наблюдается или были в прошлом два или более отдельных эпизода язвы желудочно-кишечного тракта (язва желудка или кишечника) или кровотечение из желудка или кишечника;
- если у Вас тяжелые нарушения функции печени;
- если у Вас почечная недостаточность и не проводится диализ;
- если у Вас нарушения свертываемости крови;
- если у Вас было кровоизлияние в мозг или другие кровотечения;
- если у Вас тяжелая сердечная недостаточность;
- если у Вас непереносимость некоторых сахаров, поскольку данный препарат содержит лактозу (см. также подраздел «Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ»).

Если Вы не уверены относительно ли к Вам что-либо из вышеперечисленного, обратитесь к лечащему врачу.

Особые указания и меры предосторожности

Проконсультируйтесь с лечащим врачом до начала приема препарата Локсидол-Риб.

Прием таких лекарственных препаратов, как Локсидол-Риб, может быть связан с небольшим повышением риска развития сердечного приступа (инфаркт миокарда) или инсульта (кровоизлияния в мозг). Любой риск более вероятен при высоких дозах и длительном лечении. Не превышайте рекомендуемые дозы или продолжительность лечения (см. раздел 3 «Прием препарата Локсидол-Риб»).

Если у Вас есть проблемы с сердцем, перенесенный инсульт, или Вы думаете, что у Вас есть риск данных состояний, Вам следует обсудить Ваше лечение с лечащим врачом. Например, если:

- у Вас высокое артериальное давление (гипертензия);
- у Вас высокий уровень сахара в крови (сахарный диабет);
- у Вас высокий уровень холестерина в крови (гиперхолестеринемия);
- Вы курите.

Немедленно прекратите применение препарата Локсидол-Риб, если Вы заметили признаки желудочно-кишечного кровотечения (черный, дегтеобразный стул) или язвы в желудочно-кишечном тракте (вызывающие боль в животе).

Потенциально опасные для жизни кожные высыпания (синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз) были зарегистрированы при приеме мелоксикама. Вначале по всему туловищу появляется сыпь в виде красных точек или круглых пятен, часто в центре с волдырем. Дополнительные признаки, за появлением которых нужно наблюдать, включают: язвы во рту, горле, носу, на гениталиях и конъюнктивит (красные и опухшие глаза). Это потенциально опасные для жизни кожные высыпания часто сопровождаются гриппоподобными симптомами. Сыпь может прогрессировать до обширного образования волдырей или отслоения кожи. Наиболее высокий риск развития тяжелых кожных реакций – в течение первых недель лечения. Если у Вас развился синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз на фоне приема мелоксикама, Вам никогда не следует возобновлять прием мелоксикама.

Перед приемом препарата Локсидол-Риб, сообщите врачу, если у Вас после приема мелоксикама или других оксикамов (например, пироксикама), развилась фиксированная лекарственная сыпь (пятна круглой или овальной формы с покраснением и припухлостью кожи, которые при повторном приеме препарата появляются в прежних местах высыпания, волдыри, крапивница и зуд).

Если у Вас появилась сыпь или другие кожные симптомы, прекратите прием препарата, немедленно обратитесь к врачу и расскажите ему, что Вы принимаете данный лекарственный препарат.

Препарат Локсидол-Реб не подходит для лечения пациентов, нуждающихся в облегчении острой боли.

Препарат Локсидол-Реб может маскировать симптомы инфекционного заболевания (например, лихорадку). Если Вы подозреваете, что у Вас инфекция, Вам следует обратиться к лечащему врачу.

Нежелательные реакции можно свести к минимуму, используя самую низкую эффективную дозу в течение наименьшего периода времени, необходимого для контроля симптомов.

Поскольку будет необходимо скорректировать лечение, важно перед приемом препарата Локсидол-Реб проконсультироваться с лечащим врачом в случае:

- наличия в анамнезе воспаления пищевода (эзофагит), воспаления желудка (гастрит) или любого другого заболевания желудочно-кишечного тракта, например, болезни Крона или язвенного колита;
- высокого артериального давления (гипертензии);
- пожилого возраста;
- заболевания сердца, печени или почек;
- высокого уровня сахара в крови (сахарный диабет);
- уменьшения объема циркулирующей крови (гиповолемия), которое может возникнуть при ожогах или серьезной кровопотере, хирургическом вмешательстве или пониженном потреблении жидкости;
- непереносимости некоторых сахаров, диагностированной лечащим врачом, поскольку данный препарат содержит лактозу;
- высокого уровня калия в крови, ранее диагностированного лечащим врачом.

Лечащему врачу необходимо будет следить за улучшением Вашего состояния во время лечения.

Дети

Локсидол-Реб противопоказан детям и подросткам до 16 лет.

Другие препараты и препарат Локсидол-Реб:

Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете или принимали какие-либо из перечисленных препаратов:

- другие НПВП;
- соли калия (применяются для предотвращения или лечения низкого уровня калия в крови);
- такролимус (применяется после трансплантации органов);
- триметоприм (антибиотик, применяемый для лечения инфекций мочевыводящих путей);
- препараты, предотвращающие свертывание крови (например, гепарин, варфарин, ацетилсалициловая кислота);
- препараты, разрушающие тромбы (тромболитики);
- препараты для лечения болезней сердца и почек;
- кортикостероиды (применяются для лечения воспалительных или аллергических реакций);
- циклоsporин (применяется после трансплантации органов или при тяжелых кожных заболеваниях, ревматоидном артрите, нефротическом синдроме);
- деферазирокс (применяется для выведения излишков железа из организма);

- диуретики (мочегонные). Ваш врач может регулярно контролировать функцию почек, если Вы принимаете диуретики;
- препараты для лечения высокого артериального давления (например, бета-адреноблокаторы);
- литий (применяется для лечения расстройств поведения);
- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) (применяются для лечения депрессии);
- метотрексат (применяется при онкологических и ревматических заболеваниях, псориазе);
- пеметрексед (применяется при лечении рака);
- холестирамин (применяется для снижения уровня холестерина);
- пероральные противодиабетические препараты (производные сульфонилмочевины, натеглинид, используются для лечения сахарного диабета). Ваш врач должен тщательно контролировать уровень сахара в крови на предмет риска гипогликемии.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Применение НПВП в качестве жаропонижающего и обезболивающего средства на 20 неделе и более поздних сроках беременности может вызвать нарушение функции почек у плода, приводящее к снижению количества околоплодных вод. Амниотическая жидкость обеспечивает защиту плода и способствует нормальному развитию легких, пищеварительной системы и мышц. При маловодии могут развиваться осложнения.

Если Вы беременны, не применяйте НПВП на 20 неделе и более поздних сроках беременности, не посоветовавшись с врачом, так как прием данных препаратов может привести к проблемам развития у Вашего будущего ребенка.

Многие комбинированные лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта врача, для снятия боли, применения при простуде, гриппе, бессоннице, содержат НПВП, поэтому важно ознакомиться с составом этих препаратов.

Если у Вас есть вопросы относительно приема НПВП, необходимо обсудить их со своим врачом

Кормление грудью

Препарат Локсидол-Реб не рекомендуется принимать во время кормления грудью.

Фертильность

Препарат Локсидол-Реб может затруднить наступление беременности. Вы должны сообщить своему врачу, если Вы планируете беременность или у Вас есть проблемы с наступлением беременности.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата Локсидол-Реб может вызвать нарушения зрения, включая нечеткость зрения, сонливость, головокружение или другие нарушения со стороны центральной нервной системы. В случае возникновения перечисленных эффектов воздержитесь от управления транспортными средствами или работы с механизмами.

Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на одну таблетку, то есть практически не содержит натрия.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА ЛОКСИДОЛ-РЕБ

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Обострение остеоартроза

7,5 мг (одна таблетка 7,5 мг) один раз в сутки.

Доза может быть увеличена до 15 мг (две таблетки 7,5 мг или одна таблетка 15 мг) один раз в сутки.

Ревматоидный артрит

15 мг (две таблетки 7,5 мг или одна таблетка 15 мг). Доза может быть уменьшена до 7,5 мг (одна таблетка 7,5 мг).

Анкилозирующий спондилит

15 мг (две таблетки 7,5 мг или одна таблетка 15 мг). Доза может быть уменьшена до 7,5 мг (одна таблетка 7,5 мг).

Не превышайте максимальную рекомендуемую дозу 15 мг в сутки!

Если какое-либо из утверждений, перечисленных в разделе «Особые указания и меры предосторожности», относится к Вам, Ваш лечащий врач может уменьшить дозу препарата до 7,5 мг (одна таблетка 7,5 мг) один раз в сутки.

Пациенты пожилого возраста

Рекомендуемая доза для пациентов пожилого возраста для долгосрочного лечения ревматоидного артрита и анкилозирующего спондилита составляет 7,5 мг в сутки.

Пациенты с повышенным риском нежелательных реакций

Пациенты с повышенным риском развития нежелательных реакций должны начинать лечение с дозировки 7,5 мг в сутки (одна таблетка 7,5 мг).

Пациенты с нарушением функции почек

Если у Вас нарушение функции почек тяжелой степени, и Вы находитесь на диализе, доза препарата не должна превышать 7,5 мг в сутки (одна таблетка 7,5 мг).

У пациентов с нарушением функции почек легкой или средней степени тяжести уменьшать дозу не требуется.

Пациенты с нарушением функции печени

Если у Вас нарушение функции печени легкой или умеренной степени тяжести снижение дозы не требуется.

Применение у детей и подростков

Лекарственный препарат Локсидол-Риб противопоказан детям и подросткам до 16 лет.

Если Вы чувствуете, что действие препарата Локсидол-Риб слишком сильное или слишком слабое, или если после нескольких дней приема препарата Вы не чувствуете никакого улучшения своего состояния, обратитесь к лечащему врачу.

Способ применения

Для приема внутрь.

Таблетки следует проглатывать, запивая водой или другим напитком, во время еды.

Если Вы приняли препарата Локсидол-Риб больше, чем следовало

Если Вы считаете, что приняли слишком большую дозу препарата Локсидол-Риб, немедленно обратитесь к врачу.

Симптомы, возникающие после острой передозировки НПВП:

- слабость (вялость);
- сонливость;
- ощущение недомогания (тошнота) и рвота;

- боль в области желудка (эпигастральная боль).

Данные симптомы обычно исчезают самостоятельно, после прекращения приема препарата Локсидол-Риб. Кроме того, у Вас может возникнуть кровотечение из желудка или кишечника (желудочно-кишечное кровотечение).

Тяжелая интоксикация может вызвать серьезные нежелательные реакции (см. раздел 4):

- высокое артериального давление (гипертония);
- острая почечная недостаточность;
- нарушение функции печени;
- уменьшение или прекращение дыхания (угнетение дыхания);
- потеря сознания (кома);
- судороги;
- падение артериального давления (сердечно-сосудистый коллапс);
- остановка сердца;
- внезапные аллергические реакции (гиперчувствительность), в том числе:
 - потеря сознания;
 - затрудненное дыхание;
 - кожные реакции.

Если Вы забыли принять препарат ЛОКСИДОЛ-РЕБ

Не следует применять двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Следующую дозу примите в обычное время.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, Локсидол-Риб может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Вам следует прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу при появлении любого из следующих признаков:

Любые аллергические реакции (гиперчувствительность), которые могут проявляться в виде:

- реакции со стороны кожи, такие как зуд, образование пузырей или отслоение кожи, которые могут быть признаком потенциально опасных для жизни кожных высыпаний (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз), поражения мягких тканей (слизистой оболочки) или мультиформной эритемы (см. раздел 2);
Мультиформная эритема – это серьезная кожная аллергическая реакция, проявляющаяся красными пятнами различной формы или волдырями. Эти изменения могут возникать в области рта, глаз или на любой другой поверхности тела.
- отеки кожи или слизистых оболочек, например, отек вокруг глаз, на лице и губах, в области рта или горла, возможно затрудняющего дыхание, отек в области лодыжек или стоп (отек нижних конечностей);
- одышки или приступа бронхиальной астмы;
- воспаления печени (гепатит), которое может сопровождаться следующими симптомами:
 - пожелтение кожи или глазных яблок (желтуха);
 - боль в животе;
 - отсутствие аппетита.

Нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, особенно:

- кровотечение (с дегтеобразным стулом);

- появление язвы в желудочно-кишечном тракте (что вызывает ~~боль в животе~~).

Желудочно-кишечные кровотечения, язвы или перфорация желудочно-кишечного тракта могут иметь тяжелое течение и приводить к летальному исходу, особенно у пациентов пожилого возраста.

Если у Вас ранее наблюдались какие-либо нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта из-за длительного применения НПВП, следует немедленно сообщить об этом Вашему лечащему врачу. Это особенно важно у пациентов пожилого возраста. Врач может контролировать Ваше состояние во время лечения.

При возникновении нарушений зрения, связанных с применением препарата Локсидол-Риб, не следует управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Общие нежелательные реакции, связанные с применением нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП)

Применение некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) может быть связано с несколько повышенным риском закупорки сосудов (артериальный тромбоз) и развития инфаркта миокарда или инсульта, особенно при применении высоких доз и длительном лечении.

При лечении НПВП сообщалось о задержке жидкости (отек), высоком артериальном давлении (гипертония) и сердечной недостаточности.

Наиболее часто возникающие нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта:

- язвы желудка и язвы верхнего отдела двенадцатиперстной кишки (язвы желудочно-кишечного тракта);
- перфорация язвы или желудочно-кишечное кровотечение (иногда со смертельным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста).

Сообщалось о возникновении следующих нежелательных реакций после приема НПВП:

- плохое самочувствие (тошнота) и рвота;
- диарея (жидкий стул);
- метеоризм;
- запор;
- нарушение пищеварения (диспепсия);
- боль в животе;
- стул черного цвета, вызванный кровотечением в желудочно-кишечном тракте;
- рвота кровью;
- воспаление слизистой оболочки полости рта с образованием язв (язвенный стоматит);
- обострение воспаления пищеварительного тракта (например, обострение колита или болезни Крона).

Реже наблюдалось воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит).

При применении препарата возможны следующие нежелательные реакции:

Очень часто (могут возникать у более чем 1 человека из 10):

- нарушение пищеварения, тошнота, рвота, боль в животе, запор, метеоризм, жидкий стул (диарея).

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100 человек):

- аллергические реакции (гиперчувствительность) немедленного типа;
- головокружение;
- головокружение с ощущением вращения (вертиго);

- сонливость;
- анемия (снижение содержания гемоглобина в крови);
- повышение артериального давления (гипертензия);
- приливы (кратковременное покраснение лица и шеи);
- задержка натрия и воды;
- повышение уровня калия в крови (гиперкалиемия). Это может привести к появлению таких симптомов:
 - нарушение сердечного ритма (аритмия);
 - сердцебиение;
 - мышечная слабость.
- отрыжка;
- воспаление желудка (гастрит);
- желудочно-кишечное кровотечение;
- воспаление слизистой оболочки полости рта (стоматит);
- кожный зуд;
- кожная сыпь;
- отеки, вызванные задержкой жидкости, включая отек в области лодыжек или стоп (отек нижних конечностей);
- внезапно развивающийся отек кожи или слизистых оболочек (например, отек вокруг глаз, лица, губ, рта или горла, который может привести к затруднению дыхания (ангионевротический отек));
- нарушение функции печени (например, повышение уровня печеночных ферментов, таких как трансаминазы или повышение уровня билирубина) на основании анализов крови;
- лабораторные отклонения, указывающие на нарушение функции почек (например, повышение уровня креатинина или мочевины).

Редко (может возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- изменение настроения;
- ночные кошмары;
- изменение в анализе крови, в том числе:
 - изменение качественного состава крови;
 - уменьшение количества лейкоцитов (белых кровяных телец) (лейкоцитопения);
 - уменьшение количества тромбоцитов (тромбоцитопения).

Эти нарушения могут привести к повышенному риску развития инфекции и появлению таких симптомов, как синяки или носовые кровотечения.

- звон в ушах;
- ощущение сердцебиения;
- язвы желудка и верхнего отдела тонкого кишечника;
- воспаление пищевода (эзофагит);
- начало приступов бронхиальной астмы (у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или другие НПВП);
- потенциально опасные для жизни кожные высыпания (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз);
- крапивница;
- нарушение зрения, в том числе:
 - нечеткость зрения;
 - конъюнктивит (воспаление глазного яблока или век).
- воспаление толстой кишки (колит).

Очень редко (может возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- буллезный дерматит (изменение на коже с появлением ~~пузырей или волдырей~~) и мультиформная эритема. Мультиформная эритема – это серьезная кожная аллергическая реакция, проявляющаяся красными пятнами различной формы или волдырями. Эти изменения могут возникать в области рта, глаз или на любой другой поверхности тела;
- воспаление печени (гепатит), которое сопровождается следующими симптомами:
 - пожелтение кожи или глазных яблок (желтуха);
 - боль в животе;
 - отсутствие аппетита.
- острая почечная недостаточность, особенно у пациентов с такими факторами риска, как заболевания сердца, сахарный диабет, заболевания почек;
- нарушение целостности стенки кишечника (перфорация).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- спутанность сознания;
- дезориентация;
- ощущение нехватки воздуха и реакции со стороны кожи (анафилактические / анафилактоидные реакции),
- кожные высыпания, вызванные воздействием солнечного света (реакции фоточувствительности);
- сообщалось о сердечной недостаточности в связи с применением НПВП;
- агранулоцитоз – снижение, в некоторых случаях, критическое, количества лейкоцитов в крови, особенно у пациентов, которые принимают мелоксикам совместно с другими препаратами, которые могут подавлять или нарушать функцию костного мозга (миелотоксические препараты). Это может привести к появлению внезапной лихорадки, боли в горле, инфекций.
- воспаление поджелудочной железы (панкреатит);
- женское бесплодие, задержка овуляции;
- кожная аллергическая реакция, известная как фиксированная лекарственная сыпь, которая при повторном воздействии препарата обычно появляется в прежних местах высыпания и может выглядеть как пятна круглой или овальной формы с покраснением и отеком кожи, образованием волдырей, крапивница, зуд.

Нежелательные реакции, вызванные нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), но еще не наблюдавшиеся после применения мелоксикама

Сообщалось об очень редких случаях поражения почек, которые могут привести к острой почечной недостаточности:

- очень редкие случаи воспаления почек (интерстициальный нефрит);
- гибель некоторых клеток почек (острый тубулярный или папиллярный некроз);
- белок в моче (нефротический синдром с протеинурией).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщать о нежелательных реакциях напрямую в Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» министерства здравоохранения Республики Беларусь ([http:// www.rceth.by](http://www.rceth.by)). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.



5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЛОКСИДОЛ-РЕБ

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте!

Срок годности 3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Одна таблетка содержит:

действующее вещество: мелоксикам – 7,5 мг или 15,0 мг.

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), лактоза моногидрат, натрия цитрат дигидрат, кросповидон, повидон К30, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

Внешний вид препарата ЛОКСИДОЛ-РЕБ и содержимое упаковки

Таблетки.

Локсидол-Реб, 7,5 мг, таблетки.

Круглая двояковыпуклая таблетка светло-желтого цвета.

Локсидол-Реб, 15 мг, таблетки.

Круглая плоская таблетка светло желтого цвета, с надписью «LOX 15» с одной стороны.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ/ПВДХ и гибкой упаковки на основе алюминиевой фольги.

1 контурную ячейковую упаковку вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Условия отпуска

По рецепту.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «Реб-Фарма», 223216, Республика Беларусь, Минская обл., Червенский р-н, г.п. Смиловичи, ул. Садовая, 1, тел./факс: (+375) 17 240 26 35, e-mail: rebpharma@rebpharma.by

За любой информацией о препарате следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте Евразийского экономического союза: <http://www.eaeunion.org/>.