

Листок-вкладыш – информация для пациента
Камфорный спирт, 100 мг/мл, раствор спиртовой для наружного применения
Действующее вещество: камфора рацемическая

Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем, рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Камфорный спирт и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Камфорный спирт.
3. Применение препарата Камфорный спирт.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Камфорный спирт.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.



1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ КАМФОРНЫЙ СПИРТ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Камфорный спирт – препарат природного происхождения, оказывает местнораздражающее, антисептическое, противовоспалительное и анальгезирующее действие. Возбуждает чувствительные нервные окончания, рефлекторно улучшает трофику органов и тканей.

Показания к применению

Препарат Камфорный спирт показан к применению у взрослых для симптоматического лечения мышечно-суставных болей, профилактики пролежней.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА КАМФОРНЫЙ СПИРТ

Не применяйте препарат Камфорный спирт, если у Вас:

- есть гиперчувствительность к камфоре рацемической или к этиловому спирту;
- имеются нарушения целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в том числе дерматит, экзема);
- если Вы беременны;
- если Вы кормите грудью;
- детский возраст до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Камфорный спирт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не следует наносить лекарственный препарат в области глаз, на слизистые оболочки. При случайном попадании на слизистые оболочки или в глаза, промойте большим количеством воды.

При применении препарата Камфорный спирт следует избегать вдыхания паров. После применения препарата тщательно вымойте руки теплой водой с мылом.

Лекарственный препарат содержит не менее 60 % (об/об) этилового спирта.

Огнеопасно. Не следует использовать вблизи открытого огня. Не следует размещать или использовать лекарственный препарат вблизи полированных или окрашенных поверхностей.

При нанесении лекарственного препарата на кожу не должна возникать боль. В случае возникновения боли, отека или высыпаний на коже необходимо прекратить применение лекарственного препарата и немедленно обратиться к врачу.

Дети и подростки

Не применяйте препарат у детей в возрасте от 0 до 18 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности. Данные отсутствуют.

Другие препараты и препарат Камфорный спирт

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяли, недавно применили или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Исследования по оценке взаимодействия с другими лекарственными препаратами не проводились. Не рекомендовано применять одновременно с другими препаратами для наружного применения.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Беременность

Безопасность применения препарата Камфорный спирт в период беременности не установлена. Препарат противопоказан к применению у беременных женщин.

Грудное вскармливание

При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Фертильность

Данные о влиянии лекарственного препарата на фертильность отсутствуют.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние лекарственного препарата на способность управлять автотранспортом и работу с механизмами не изучалось. Рекомендовано соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и при работе с опасными механизмами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КАМФОРНЫЙ СПИРТ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

При мышечно-суставных болях наносите на болезненные участки с помощью ватно-марлевого тампона 2 – 3 раза в день.

Для профилактики образования пролежней наносите на локализованные участки покраснения кожи с помощью ватно-марлевого тампона 2 – 3 раза в день.

Применение у детей

Лекарственный препарат не рекомендован к применению у детей до 18 лет.

Путь и (или) способ введения

Только для наружного применения. Препарат следует наносить на чистые и неповрежденные участки кожи. Обработка больших поверхностей тела запрещается.

Продолжительность терапии

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного препарата и достигнутого эффекта.

Если Вы применяли препарат Камфорный спирт больше, чем следовало

Случаи передозировки при наружном применении не зафиксированы.

Симптомы



При случайном приеме лекарственного препарата внутрь регистрируются симптомы передозировки, характерные для отравления камфорой, которые включают желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диарея, боли в животе) и неврологические расстройства (головная боль, головокружение, ощущение жара/приливы, судороги, угнетение дыхания и кома).


Лечение

Лечение симптоматическое, включая противосудорожную терапию, которая является основой лечения при отравлении камфорой. При передозировке не следует вызывать рвоту из-за рисков, связанных с последующим вдыханием камфоры и развитием ларингоспазма, который может привести к нарушению дыхания и летальному исходу.

Если Вы забыли применить препарат Камфорный спирт

Если Вы забыли применить препарат Камфорный спирт, не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную, примените следующую дозу в обычное время.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.



4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам Камфорный спирт может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Камфорный спирт и немедленно обратитесь к врачу, если заметите какую-либо из следующих нежелательных реакций:

- покраснение кожи, зуд, сыпь (аллергические кожные реакции (крапивница));
- раздражение кожи;
- головная боль, головокружение.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе, на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы так же можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КАМФОРНЫЙ СПИРТ

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Храните лекарственный препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог его увидеть.

Не применяйте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выливайте препарат в канализацию или как бытовые отходы. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препарата, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Камфорный спирт содержит:

Действующее вещество: камфора рацемическая.

В 40 мл препарата содержится 4 г действующего вещества.

Вспомогательные вещества: этиловый спирт 70 % (приготовленный из этилового спирта 96 % и воды очищенной).

Внешний вид препарата Камфорный спирт и содержимое упаковки

Раствор спиртовой для наружного применения.

Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим запахом камфоры.

40 мл во флаконах из темного стекла, укупоренных пробками с уплотнительными элементами или пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми.

1 флакон вместе с листком-вкладышем по применению в пачке из картона (упаковка № 1).

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: +375 (177) 735612, 731156

E-mail: market@borimed.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.



Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <http://ees.eaeunion.org>