

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ)

**Глюкоза,**  
**таблетки жевательные с ароматом клубники**  
**(или лимона, или апельсина, или вишни, или тропических фруктов) 2000 мг**

**Общая характеристика.**

**Международное непатентованное название.** Glucose.

**Описание.** Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрические, с риской, с фаской, с ароматом клубники (или лимона, или апельсина, или вишни, или тропических фруктов). Риски не предназначена для деления таблетки на две равные части.

**Состав.** Каждая таблетка содержит глюкозы моногидрат – 2000 мг, что эквивалентно 1818 мг глюкозы;

**вспомогательные вещества:** картофельный крахмал, тальк, кальция стеарат, лимонная кислота моногидрат, ароматизатор:

- «Клубника PX1534» (мальтодекстрин, вкусоароматический компонент) – для таблеток с ароматом клубники;

- «Лимон PX1548» (мальтодекстрин, вкусоароматический компонент) – для таблеток с ароматом лимона;

- «Апельсин PX1488» (декстроза, вкусоароматический компонент, антислеживающий агент: диоксид кремния E551 (5 %), соль поваренная пищевая йодированная (содержит антислеживающий агент: ферроцианид калия E536)) – для таблеток с ароматом апельсина;

- «Вишня PX1503» (декстроза-87 %, вкусоароматический компонент, антислеживающий агент: диоксид кремния E551 (5 %)) – для таблеток с ароматом вишни;

- «Тропик PX1603» (декстроза, вкусоароматический компонент, антислеживающий агент: диоксид кремния E551 (5 %)) – для таблеток с ароматом тропических фруктов.

**Лекарственная форма.** Таблетки жевательные с ароматом клубники (или лимона, или апельсина, или вишни, или тропических фруктов).

**Фармакотерапевтическая группа.** Питательные вещества. Углеводы. Глюкоза.

Код АТХ: V06DC01.

**Фармакологическое действие.** Глюкоза участвует в различных процессах обмена веществ в организме, усиливает окислительно-восстановительные процессы в организме, улучшает антитоксическую функцию печени. Усваивается полностью организмом, почками не выводится (появление в моче является патологическим признаком).

**Показания к применению.** Гипогликемия.

**Способ применения и дозы.** Принимают внутрь по 1-3 таблетки (2000-6000 мг) на прием, в зависимости от характера и течения гипогликемии. Таблетки следует разжевывать или рассасывать. При необходимости доза может быть увеличена. Повторный прием возможен с учетом массы тела, не превышая дозы 0,3г/кг/час.

**Дети.** Детям с 6-ти лет.

Доза и длительность курса определяются врачом.

**Побочное действие.** Снижение аппетита, гипергликемия (при сахарном диабете или передозировке). При употреблении в рекомендуемых дозах побочных реакций не наблюдается.

**Противопоказания.** Гипергликемия (повышение уровня сахара в крови), сахарный диабет (кроме случаев гипогликемии), повышенная чувствительность (аллергия) к компонентам лекарственного средства, непереносимость глюкозы и галактозы или мальабсорбция галактозы (галактоземия), детский возраст до 6 лет.

**Передозировка.** *Симптомы:* тошнота, вздутие живота, понос.

*Лечение:* прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Меры предосторожности.** Лекарственное средство не рекомендуют принимать больным с пониженной толерантностью к глюкозе. Таблетки глюкозы являются источником легкодоступного питательного вещества, однако, не являются полноценным заменителем сбалансированного питания.

**Применение при беременности и в период лактации. Дети.** При употреблении лекарственного средства при беременности и в период лактации, а также детям, необходимо соблюдать дозирование и длительность курса приема, назначенные врачом.

**Влияние на способность вождения автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Не влияет.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Случаев несовместимости с лекарственными средствами не выявлено.

**Условия хранения и срок годности.** В защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

**Условия отпуска.** Без рецепта врача.

**Упаковка.** По 15 таблеток в упаковку блистерную из полимерных материалов (ПЭТФ).

Упаковку блистерную помещают в материал упаковочный (пленка полипропиленовая/пленка полипропиленовая металлизированная) или в упаковочную ленту, выполненную флексографским способом печати, ламинированную (пленка полипропиленовая/пленка полипропиленовая металлизированная).

**Информация о производителе.**

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,  
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.