



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
по медицинскому применению лекарственного средства
(информация для пациента)
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

Перед применением данного лекарственного средства полностью прочтайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется про читать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь к лечащему врачу или провизору (фармацевту), или медицинской сестре.

Это лекарственное средство назначено именно Вам. Не передавайте его другим. Оно может навредить этим людям, даже, если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или провизору (фармацевту), или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе «Побочное действие» листка-вкладыша.

Торговое название: Салициловая кислота.

Международное непатентованное название: Salicylic acid.

Лекарственная форма: раствор спиртовой для наружного применения 20 мг/мл.

Состав: каждый флакон (25 мл) содержит: действующего вещества – салициловой кислоты – 500 мг; вспомогательное вещество: спирт этиловый.

Описание: бесцветная, прозрачная жидкость с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа: прочие противогрибковые средства для местного применения. Салициловая кислота.

Код АТХ: D01AE12.

Показания к применению

Комплексная терапия следующих состояний:

- жирная себорея;
- профилактика и лечение акне;
- пиодермия.

ЛП-№008683-РГ-ВУ
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 31.01.2025 № 95
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства;
- почечная недостаточность;
- детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы

Наружно. Обрабатывают пораженную поверхность кожи спиртовым раствором 2–3 раза в сутки.

Максимальная суточная доза для взрослых – 10 мл раствора с концентрацией 20 мг/мл; для детей – 1 мл раствора с концентрацией 20 мг/мл. Курс лечения – не более 1 недели.

Меры предосторожности

Не допускать попадания в глаза.

Не следует наносить лекарственное средство на слизистые оболочки, на родимые пятна, волосистые бородавки, бородавки в области лица или гениталий.

При лечении детей необходимо избегать обработки нескольких участков кожи одновременно.

При попадании на слизистые оболочки необходимо промыть соответствующую область большим количеством воды. Необходимо учитывать, что при кожных заболеваниях, протекающих с гиперемией и воспалением (в т.ч. псoriатическая эритродермия) или с поверхностными мокнущими поражениями, возможно повышение всасывания салициловой кислоты.

Применение в период беременности и грудного вскармливания

Не следует применять лекарственное средство в **период беременности и кормления грудью.**

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами

Не влияет.

Дети

Применение у детей требует осторожности.

Лекарственные взаимодействия

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для местного применения и тем самым усилить их всасывание.

Всосавшаяся салициловая кислота может усилить побочные эффекты метотрексата и пероральных гипогликемических лекарственных средств, производных сульфонилмочевины.

Раствор фармацевтически несовместим с резорцином (образует расплавляющиеся смеси) и цинка оксидом (образуется нерастворимый цинка салицилат).

Местное применение салициловой кислоты не следует совмещать с пероральным применением лекарственных средств, которые содержат ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные средства.

Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу!

Побочное действие

Возможны изменения со стороны кожи: сухость, шелушение, раздражение, контактный дерматит, проявления аллергических реакций (крапивница, зуд), при которых необходима отмена лекарственного средства.

При длительном применении возможно всасывание лекарственного средства в общее кровообращение и развитие характерных для сациллатов по-



бочных эффектов: шум в ушах, головокружение, боль в эпигастрии, тошнота, рвота, ацидоз, ускоренное дыхание.

В случае возникновения любых нежелательных реакций необходимо обратиться к врачу!

Передозировка

При применении больших доз лекарственного средства может усиливаться кератолитическое действие и аллергические реакции. В таком случае лекарственное средство необходимо смыть водой, обратиться за консультацией к врачу. Терапия симптоматическая.

При поступлении салициловой кислоты внутрь наблюдается раздражение слизистой оболочки желудка, появляются боль в надчревной области, тошнота, иногда рвота. При употреблении внутрь необходимо зондовое промывание желудка большим количеством воды с применением ощелачивающих растворов.

Упаковка

25 мл во флаконе из стекла. Каждый флакон вместе с листвком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка №1).

Условия хранения

В защищенном от света месте. При температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Беречь от огня.

Срок годности

3 года. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.