

**Листок-вкладыш – информация для пациента**  
**Касторовое масло, масло для приёма внутрь**  
**Касторовое масло**

**Перед приёмом лекарственного препарата полностью прочитайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержится важные для Вас сведения.**

Всегда принимайте препарат в точности с данным листком, рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 3 дня Вам следует обратиться к врачу.

### **СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША**

1. Что из себя представляет препарат Касторовое масло, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед приёмом препарата Касторовое масло.
3. Приём препарата Касторовое масло.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Касторовое масло.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

## **1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ КАСТОРОВОЕ МАСЛО, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Лекарственный препарат Касторовое масло обладает слабительным эффектом.

### **Показания к применению**

Препарат Касторовое масло применяется для кратковременного симптоматического лечения запоров и подготовки кишечника перед диагностическими процедурами.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

## **2. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЁМОМ ПРЕПАРАТА КАСТОРОВОЕ МАСЛО**

### **Противопоказания**

Не принимайте препарат Касторовое масло:

- если у Вас есть аллергия на касторовое масло;
- если у Вас хронические, спастические запоры, запоры неврогенного и эндокринного происхождения;
- если у Вас острые воспалительные заболевания кишечника (в том числе аппендицит), сужение просвета в кишечнике – стеноз, отсутствие перистальтики кишечника – атония кишечника;
- если у Вас язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- если у Вас воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника, воспаление тонкого или толстого кишечника);
- если у Вас обезвоживание с потерей электролитов;
- если у Вас острые лихорадочные состояния;
- если у Вас крайне сильное истощение организма;
- если у Вас механическая кишечная непроходимость;
- если у Вас боли в животе неясного генеза;

- если у Вас кишечное или маточное кровотечение;
- если у Вас заболевание почек с поражением почечных канальцев (тубулоинтерстициальный нефрит или гломерулонефрит);
- если у Вас отравления жирорастворимыми ядами (в том числе бензином, четыреххлористым углеродом, экстрактом мужского папоротника);
- если Вы беременны;
- если Вы кормите грудью;
- если у Вас детский возраст до 12 лет.

ЛП-№010467-РГ-BY

**УТВЕРЖДЕННО**

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗОМ от 04.06.2025 № 663

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003

### **Особые указания и меры предосторожности**

Лекарственный препарат Касторовое масло следует принимать только в том случае, если необходимый эффект не был получен за счет изменения рациона питания или использования слабительных препаратов, увеличивающих объем кишечного содержимого.

Если у Вас после приёма препарата началось кровотечение из прямой кишки или отсутствует дефекация, необходимо обратиться к врачу.

Перед приёмом препарата Касторовое масло пациентам с нестабильным водным балансом (пациентам с нарушением функции почек, пациентам пожилого возраста) необходимо проконсультироваться с врачом в связи с повышенным риском обезвоживания, симптомами которого являются уменьшение мочевыделения и жажда. Перед приёмом препарата необходимо восстановить водный баланс, обеспечить приём достаточного количества жидкости.

Не рекомендуется принимать Касторовое масло в качестве слабительного препарата более 3 суток, поскольку может нарушаться пищеварение, а также всасывание витаминов А и D, с развитием соответствующего гиповитаминоза.

### **Дети и подростки**

Не давайте препарат Касторовое масло детям до 12 лет.

Перед применением препарата у детей старше 12 лет необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Другие препараты и препарат Касторовое масло**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Перед приёмом препарата Касторовое масло проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки, если Вы принимаете:

- препараты, полученные из мужского папоротника;
- слабительные препараты;
- атропина сульфат, платифилин, пирензепин – препараты, снижающие тонус мышц;
- папаверин, дротаверин – препараты для устранения спазмов;
- метилэргометрин, эргометрин, окситоцин, простагландин – препараты, стимулирующие сократительную активность матки;
- мебендазол – противогельминтный препарат;
- гризофульвин – противогрибковый антибактериальный препарат;
- пробукол – препарат, уменьшающий уровень общего холестерина в крови.

Приём препарата Касторовое масло может снижать всасывание жирорастворимых витаминов А, D и K.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приёма препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Приём лекарственного препарата Касторовое масло при беременности и в период грудного вскармливания противопоказан. При необходимости приёма лекарственного препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание на весь период лечения.

## **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Во время приёма препарата Касторовое масло не рекомендуется управлять автотранспортным средством, следует воздержаться от иной операторской деятельности в связи с возможным нарушением концентрации внимания во время наступления эффекта.

## **3. ПРИЁМ ПРЕПАРАТА КАСТОРОВОЕ МАСЛО**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Рекомендуемая доза**

Рекомендуемая доза для взрослых – 15–30 г (1–2 столовые ложки) один раз в день.

### **Применение у детей и подростков**

Приём препарата Касторовое масло у детей до 12 лет противопоказан.

Рекомендуемая доза для детей от 12 до 18 лет – по 10–15 г (1 десертная – 1 столовая ложка) один раз в день. Не следует давать препарат Касторовое масло детям от 12 до 18 лет без консультации врача.

### **Путь и (или) способ введения**

Препарат предназначен для приёма внутрь.

### **Продолжительность терапии**

Не следует принимать препарат Касторовое масло более 3 дней.

### **Если Вы приняли препарата Касторовое масло больше, чем следовало**

Если Вы приняли препарата Касторовое масло больше, чем следовало, немедленно обратитесь к врачу или работнику аптеки.

При приёме повышенных доз препарата характерно появление диареи, резких болей спастического характера в животе, нарушение функции почек, головокружение, галлюцинации, потеря сознания.

При появлении симптомов передозировки необходимо прекратить приём препарата, восполнить потерю жидкости и электролитов, и начать терапию, направленную на устранение возникших нарушений. Специфическими антидотами являются атропина сульфат и лоперамид.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.


## **4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Касторовое масло может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

После приёма лекарственного препарата Касторовое масло возможны нарушения водно-электролитного баланса, появление аллергических реакций, вздутия живота, болей в животе, тошноты, диареи. При длительном приёме препарата – нарушения пищеварения, воспаление слизистой оболочки кишечника, дефицит витаминов А и D, развитие привыкания, потеря перистальтики кишечника.

### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе, на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы так же можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.



## **5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КАСТОРОВОЕ МАСЛО**

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. Храните лекарственный препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Срок годности: 5 лет.

Не принимайте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

## **6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

**Препарат Касторовое масло содержит:**

*Действующее вещество:* касторовое масло.

Каждый флакон содержит 30 г действующего вещества.

### **Внешний вид препарата Касторовое масло и содержимое упаковки**


Прозрачная, вязкая, почти бесцветная или слегка желтоватого цвета жидкость со специфическим запахом.

По 30 г во флаконе из стекла, укупоренные пробками или пробками с уплотнительными элементами и крышками навинчиваемыми.

Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка №1).

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.



### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: +375 (177) 735612, 731156

E-mail: market@borimed.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

### **Листок-вкладыш пересмотрен**

### **Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся в ОХЛП и доступны на официальном сайте уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by).