

## Листок-вкладыш – информация для пациента

### Женъшения настойка, настойка

Действующее вещество: спиртовое извлечение из женъшения корней 1:10

**Перед приемом лекарственного препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

Всегда принимайте препарат в точности с данным листком-вкладышем, рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 2 недели Вам следует обратиться к врачу.

### СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Женъшения настойка и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Женъшения настойка.
3. Прием препарата Женъшения настойка.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Женъшения настойка.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

## 1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ЖЕНЪШЕНИЯ НАСТОЙКА И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Женъшения настойка относится к группе общетонизирующих препаратов. Стимулирует центральную нервную систему, повышает артериальное давление, умственную и физическую работоспособность, стимулирует аппетит, стимулирует половую функцию. Снижает содержание глюкозы в крови, активирует деятельность надпочечников.

### Показания к применению

Препарат Женъшения настойка показан к применению в комплексной терапии астенических состояний, сниженной умственной и физической работоспособности, эректильной дисфункции неврастенического генеза.

Лекарственный препарат является традиционным растительным лекарственным препаратом для использования по указанным показаниям исключительно на основе длительного применения.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

## 2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ЖЕНЪШЕНИЯ НАСТОЙКА

### Противопоказания

Не принимайте препарат Женъшения настойка:

- если у Вас аллергия на действующее вещество или на этиловый спирт;
- если у Вас повышенное артериальное давление;

- если у Вас учащенное сердцебиение (тахикардия);
- если у Вас повышенная возбудимость;
- если у Вас эpileпсия;
- если Вы склонны к судорожным состояниям;
- если у Вас алкоголизм;
- если у Вас черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога;
- если у Вас бессонница;
- если у Вас повышенная кровоточивость;
- если у Вас острые инфекционные заболевания;
- если у Вас хронические заболевания печени, цирроз печени;
- если у Вас детский возраст до 18 лет;
- если Вы беременны или кормите грудью.

#### **Особые указания и меры предосторожности**

Вам не следует принимать препарат Женьшения настойка во второй половине дня во избежание нарушения сна.

Если у Вас сахарный диабет, перед началом приема лекарственного препарата необходима консультация врача, так как прием препарата может привести к небольшому снижению уровня глюкозы в крови.

Не применяйте препарат у детей в возрасте от 0 до 18 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности. Данные отсутствуют.

Лекарственный препарат содержит не менее 67 об. % этианола, то есть 317,29-423,05 мг на разовую дозу (15-20 капель), что равно 8,04-10,72 мл пива, 3,35-4,47 мл вина на дозу. Вреден для лиц с алкоголизмом. Необходимо учитывать беременным и кормящим грудью женщинам, детям и таким группам высокого риска, как пациенты с заболеваниями печени и эpileпсией.

#### **Другие препараты и препарат Женьшения настойка**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете:

- психостимуляторы, аналептики, препараты, угнетающие центральную нервную систему (противоэpileптические лекарственные препараты, антипсихотические препараты, анксиолитики, седативные лекарственные препараты);
- препараты, снижающие уровень глюкозы в крови (метформин, гликлазид и др.);
- варфарин – антикоагулянт, предотвращающий образование тромбов;
- петлевые диуретики (фurosемид, торасемид и др.) – препараты для увеличения диуреза, применяемые при заболеваниях почек и хронической сердечной недостаточности;
- ингибиторы моноаминооксидазы (моклобемид, метралиндон и др.) – препараты для лечения депрессии и тревоги.

Необходимо избегать совместного приема лекарственных препаратов, вызывающих дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем (дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксифен, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид, гризо-фульвин, производные нитро-5-имида (метронидазол, орнидазол, тинидазол), кетоконазол, прокарбазин).

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных препаратов, содержащих этиловый спирт.

#### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Безопасность применения во время беременности и в период грудного вскармливания не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта принимать препарат во время беременности и в период лактации противопоказано.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Лекарственный препарат содержит этиловый спирт!

В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Рекомендуемая доза**

Рекомендуемая доза: 15-20 капель настойки 2-3 раза в день.

#### **Пациенты с нарушением функции печени**

Пациентам с нарушением функции печени препарат Женьшения настойка следует принимать с осторожностью и после консультации лечащего врача.

#### **Применение у детей и подростков**

В связи с отсутствием достаточных данных лекарственный препарат не следует принимать детям и подросткам до 18 лет.

#### **Путь и (или) способ введения**

Препарат показан для приема внутрь за 30-40 минут до еды.

#### **Продолжительность терапии**

Рекомендуемая продолжительность лечения: 30-40 дней. Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного препарата и достигнутого эффекта. Не рекомендуется принимать препарат в течение длительного времени из-за содержания этанола.

#### **Если Вы приняли препарат Женьшения настойка больше, чем следовало**

При приеме препарата в дозах, превышающих рекомендованные, возможно появление следующих симптомов передозировки: повышение артериального давления, бессонница. При появлении симптомов прекратите прием препарата и обратитесь к врачу или работнику аптеки.

#### **Если Вы забыли принять препарат Женьшения настойка**

Если Вы забыли принять препарат Женьшения настойка, не принимайте двойную дозу (две дозы сразу), чтобы компенсировать пропущенную, примените следующую дозу в обычное время.

При наличии вопросов по приему препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### 4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Женьшения настойка может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Женьшения настойка:**

**Частота неизвестна** (не может быть оценена на основе имеющихся данных):

- снижение уровня глюкозы в крови (гипогликемия);
- аллергические реакции;
- головная боль;
- нервозность;
- бессонница;
- носовое кровотечение;
- повышение артериального давления;
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- боли в животе, тошнота, рвота, диарея, запор.

#### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе, на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242-00-29; факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by)

Сайт: [https://www.rceth.by](http://www.rceth.by)

#### 5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре не выше 25 °C.

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Беречь от огня.

Не принимайте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## 6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

### Препарат Женьшения настойка содержит:

1 мл препарата содержит 1 мл женьшения настойки (эквивалентно 0,1 г женьшения корней), (1:10).

Вспомогательные вещества: этиловый спирт 70 %.

### Внешний вид препарата Женьшения настойка и содержимое упаковки

#### Настойка.

Прозрачный раствор от желтоватого до коричневого с красноватым оттенком цвета со слабым специфическим запахом.

По 30 мл или 50 мл во флаконах из оранжевого стекла, укупоренных пробками капельницами и крышками навинчивающимися.

1 флакон вместе с листком-вкладышем в пачке из картона (упаковка № 1).

### Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

### Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: +375 (177) 735612, 744280

E-mail: market@borimed.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

### Листок-вкладыш пересмотрен

### Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by).