**Листок-вкладыш — информация для пациента****КАМФОРНЫЙ СПИРТ, 10% раствор для наружного применения спиртовой**

Действующее вещество: камфора.

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Камфорный спирт и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Камфорный спирт.
3. Применение препарата Камфорный спирт.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Камфорный спирт.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Камфорный спирт и для чего его применяют

Действующим веществом препарата Камфорный спирт является камфора.

Это препарат для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Показания к применению

Камфорный спирт показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет при:

- миалгии;
- миозите;
- артралгии;
- ишиасе;
- профилактике образования пролежней.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Камфорный спирт**Противопоказания****Не применяйте препарат Камфорный спирт:**

- если у Вас аллергия на камфору или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша);

Если у Вас имеется нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в том числе дерматит, экзема);

- если Вы беременны;
- если Вы кормите грудью;
- если Вам нет 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Камфорный спирт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не допускать попадания препарата в глаза. Не наносите препарат на слизистые оболочки, открытые раны и поврежденные или воспаленные участки кожи. При попадании препарата в рот или нос тщательно промойте их водой. После нанесения препарата тщательно вымойте руки теплой водой.

Дети и подростки

Не применяйте препарат у детей в возрасте от 0 до 18 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности. Данные отсутствуют.

Другие препараты и препарат Камфорный спирт

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Данные по взаимодействию с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не применяйте препарат Камфорный спирт во время беременности.

Грудное вскармливание

Не применяйте препарат Камфорный спирт в период грудного вскармливания.

Фертильность

Данные по влиянию препарата на фертильность отсутствуют.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Не установлено влияния препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

3. Применение препарата Камфорный спирт

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Миозит, миозит, артралгия, ишиас:

наносите на кожу над пораженной областью 2-3 раза в день. Продолжительность лечения 7-10 суток.

Профилактика образования пролежней:

обрабатывайте кожу 2-3 раза в день.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Если Вы применили препарата Камфорный спирт больше, чем следовало

Если Вы применили большую дозу, чем Вам назначено, обратитесь к врачу или в местную поликлинику или больницу. Не забудьте взять с собой упаковку лекарства, чтобы врачу было понятно, какое лекарство Вы применили.

При передозировке препаратом у Вас могут возникнуть возбуждение, увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия), внезапные непроизвольные сокращения мышц (судороги). При возникновении данных симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Если Вы забыли применить препарат Камфорный спирт

Если Вы забыли применить препарат Камфорный спирт, не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную, примените следующую дозу в обычное время.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Камфорный спирт может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Камфорный спирт и немедленно обратитесь к врачу, если заметите какой-либо из следующих побочных эффектов:

- покраснение кожи, зуд, сыпь (аллергические кожные реакции (крапивница));
- раздражение кожи;
- головная боль, головокружение.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефоны: +7 8005509903

Факс: +7 (495) 698-15-73

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

Республика Армения

«Научный Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Э. Габриеляна» АОЗТ

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Телефоны: +374 60 83-00-73, +374 10 23-08-96, 23-16-82

Электронная почта: admin@pharm.am

www.pharm.am

Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер. 2а

Телефоны: +375-17-231-85-14

Факс: +375-17-252-53-58

Электронная почта: rcpl@rceth.by

www.rceth.by

Республика Казахстан

«Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Адрес: 010000, г. Астана, район Байконур, ул. А.Иманова, 13

Телефон: +7 (7172) 23-51-35

Электронная почта: farm@dari.kz

www.ndda.kz

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Телефоны: +996 312 21-92-78, 0800 800 26 26

Факс: +996 312 21-05-08

Электронная почта: dlsmi@pharm.kg

www.pharm.kg

5. Хранение препарата Камфорный спирт

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и картонной пачке после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Флаконы в пачке: Хранить в оригинальной упаковке (флакон в пачке) для защиты от света при температуре не выше 25 °С;

Флаконы в коробке: Хранить в оригинальной упаковке (флакон в коробке) для защиты от света при температуре не выше 25 °С;

Канистры: Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Камфорный спирт содержит

Действующим веществом является камфора.

В 1 мл раствора содержится 100 мг камфоры.

Прочим ингредиентом (вспомогательным веществом) является:
этиловый спирт 70%.

Внешний вид препарата Камфорный спирт и содержимое его упаковки

Раствор для наружного применения спиртовой.

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом камфоры.

По 40 мл раствора во флаконы оранжевого стекла, закупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками. 1 флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

40 флаконов без пачек «для стационаров» для реализации в лечебно-профилактические учреждения с равным количеством листков-вкладышей помещают в коробку картонную.

По 18 кг в канистрах полимерных «для стационаров», дополнительно снабженных листками-вкладышами (наклеивают или вкладывают в специальный кармашек).

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»

Россия, 150030, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5; т/ф +7 (4852) 44-38-56

За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»

Адрес: 150030, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5

Телефон/факс: +7 (4852) 44-38-56

Электронная почта: farmfab@yareoslavl.ru

Республика Армения

ООО «ФАРМ ТРАСТ»

Адрес: 0014, г. Ереван, ул. Мамиконянц, 48

Телефон/факс: +374 10 20-34-14

Электронная почта: asan-jalalyan@yandex.ru

Республика Беларусь



ООО «ДАНСОН-БГ»

Адрес: 220126, г. Минск, пр. Победителей, д.31, корпус 1, пом. 416, 418.

Телефон: +375-17-367-85-88

Электронная почта: hulaknatalya@gmail.com

Республика Казахстан



ООО «ДАНСОН-БГ»

Адрес: 050026, г. Алматы, ул. Айтиева 46-18

Телефон: +7 (727) 395 91 13.

Электронная почта: layka16@mail.ru

Кыргызская Республика

ОсОО «DasMed»

Адрес: 720043, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Садыгалиева, 1

Телефон/факс: +996 312 35-75-42

Электронная почта: product@damed.kg.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб сайте Союза <http://ees.eaeunion.org>.