

Листок-вкладыш – информация для пациента

Лизиноприл, 5 мг, таблетки

Лизиноприл, 10 мг, таблетки

Действующее вещество: лизиноприл

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Лизиноприл, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед приемом препарата Лизиноприл.
3. Прием препарата Лизиноприл.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Лизиноприл.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Лизиноприл, и для чего его применяют

Препарат Лизиноприл содержит действующее вещество лизиноприл, которое относится к группе лекарственных препаратов, известных как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ингибиторы АПФ).

Препарат Лизиноприл применяется у взрослых в возрасте от 18 лет при следующих состояниях:

- для лечения повышенного артериального давления (артериальная гипертензия);
- для лечения симптоматической сердечной недостаточности;
- если у Вас недавно был сердечный приступ (инфаркт миокарда);
- для лечения почечной недостаточности, вызванной сахарным диабетом 2 типа, у пациентов с артериальной гипертензией.

Лизиноприл расширяет кровеносные сосуды, что приводит к снижению повышенного артериального давления. Он помогает сердцу перекачивать кровь по всему телу.

2. О чём следует знать перед приемом препарата Лизиноприл

Не принимайте препарат Лизиноприл, если:

- у Вас аллергия на лизиноприл, другие ингибиторы АПФ или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

- у Вас ранее была аллергическая реакция (ангионевротический отек) в том числе и от применения других ингибиторов АПФ. Аллергическая реакция могла сопровождаться отеком рук, ног, лодыжек, лица, губ, языка или горла, также могло быть затруднено глотание или дыхание (ангионевротический отек);
- Вы принимаете или ранее принимали сакубитрил/валсартан, применяемый для лечения хронической сердечной недостаточности у взрослых. При совместном приеме с препаратом Лизиноприл увеличивается риск развития ангионевротического отека;
- у Вас в семье были тяжелые аллергические реакции (ангионевротический отек) в ответ на прием ингибиторов АПФ или у Вас были тяжелые аллергические реакции без известной причины;
- у Вас период беременности (2 и 3 триместры). Также следует избегать приема препарата Лизиноприл на ранних сроках беременности (в первые 3 месяца беременности) (см. раздел «Беременность и грудное вскармливание»);
- у Вас сахарный диабет, умеренные или тяжелые нарушения функции почек и Вы принимаете препараты алискирена (антигипертензивные препараты).

Если Вы не уверены, относится ли что-либо из вышеперечисленного к Вам, обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

Если у Вас появился сухой кашель, который сохраняется в течение длительного времени после начала лечения препаратом Лизиноприл, проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Лизиноприл проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки перед приемом препарата Лизиноприл, если:

- у Вас сужение (стеноз) аорты или клапанов сердца;
- у Вас сужение (стеноз) почечной артерии;
- у Вас утолщение сердечной мышцы (гипертрофическая кардиомиопатия);
- у Вас заболевание соединительной ткани с сосудистыми проявлениями;
- у Вас низкое артериальное давление (гипотензия). Вы можете чувствовать головокружение или предобморочное состояние, особенно при резком вставании;
- у Вас нарушение функции почек, почечная недостаточность или Вы находитесь на гемодиализе;
- у Вас заболевания печени;
- у Вас сахарный диабет;
- Вы принимаете нижеперечисленные препараты. Совместный прием увеличивает риск развития аллергической реакции (ангионевротического отека):
 - темсиролимус, сиролимус, эверолимус и другие препараты, относящиеся к классу ингибиторов mTOR (применяются для профилактики отторжения органа при его пересадке и при онкологических заболеваниях);
 - рацекадотрил – препарат для лечения диареи;
 - вилдаглиптин – препарат для снижения уровня глюкозы в крови;



– Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов, применяемые для лечения высокого кровяного давления:

- блокаторы рецепторов ангиотензина II (также известные как сартаны – например, валсартан, телмисартан, ирбесартан), особенно, если у Вас проблемы с почками, связанные с сахарным диабетом;
- алискирен.

Ваш врач может регулярно проверять функцию почек, артериальное давление и количество электролитов (например, калия) в крови.

См. также информацию в разделе «Не принимайте препарат Лизиноприл, если».

- у Вас недавно была диарея или рвота;
- Ваш врач сказал Вам контролировать количество соли в вашем рационе;
- у Вас высокий уровень холестерина и Вы проходите лечение под названием «аферез ЛПНП»;
- Вы беременны или думаете, что могли забеременеть. Препарат Лизиноприл не следует принимать на ранних сроках беременности, а также его нельзя принимать, если срок беременности превышает 3 месяца, поскольку его применение на этом сроке может нанести серьезный вред вашему ребенку (см. раздел «Беременность и грудное вскармливание»);
- Вы негроидной расы. Препарат Лизиноприл может быть менее эффективен в отношении Вас. Также прием препарата может увеличить риск развития тяжелой аллергической реакции – ангионевротического отека.

Если Вы не уверены, относится ли что-либо из перечисленного к Вам, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки перед приемом препарата Лизиноприл.

Лечение аллергии, например, укусов насекомых

Сообщите врачу, если Вы проходите (или собираетесь пройти) курс лечения, чтобы уменьшить последствия аллергии, такие как укусы насекомых (десенсибилизация). Если Вы принимаете препарат Лизиноприл во время лечения, это может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Операции

Если Вам предстоит хирургическая операция (включая стоматологическое вмешательство) с анестезией сообщите об этом своему лечащему врачу. Обязательно сообщите врачу или стоматологу о том, что Вы принимаете препарат Лизиноприл, так как существует риск значительного снижения артериального давления при введении некоторых анестетиков.

Дети и подростки

Имеется ограниченный опыт эффективности и безопасности у детей. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с врачом.

Препарат Лизиноприл не следует давать детям младше 6 лет или детям с тяжелой почечной недостаточностью.

Другие препараты и препарат Лизиноприл

Сообщите своему лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это связано с тем, что препарат Лизиноприл может влиять на действие некоторых препаратов, а некоторые препараты могут влиять на действие препарата Лизиноприл. Врач может изменить Ваш режим дозирования и/или принять другие меры предосторожности.

Обязательно сообщите своему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов:

- другие препараты для снижения артериального давления;
- блокаторы рецепторов ангиотензина II или алискирен (см. также информацию в разделах «Не принимайте препарат Лизиноприл, если» и «Особые указания и меры предосторожности»);
- диуретические препараты, увеличивающие объем вырабатываемой мочи;
- бета-блокаторы, такие как атенолол и пропранолол;
- нитраты (применяются при болях в сердце – стенокардии);
- нестероидные противовоспалительные препараты, применяемые для устранения боли и лечения артрита;
- аспирин (ацетилсалициловая кислота). Сообщите своему врачу, если Вы принимаете более 3 граммов ацетилсалициловой кислоты в сутки;
- препараты для лечения депрессии и психических проблем, включая литий;
- калийные добавки (включая заменители соли), калийсберегающие диуретики и другие препараты, которые могут увеличить количество калия в крови (например, триметоприм и ко-тромиксазол при инфекциях, вызванных бактериями; циклоспорин, иммунодепрессант, используемый для предотвращения отторжения трансплантированных органов; и гепарин – препарат, применяемый для разжижения крови и предотвращения образования тромбов);
- инсулин или препараты для лечения сахарного диабета, которые Вы принимаете внутрь;
- препараты для лечения астмы;
- препараты для лечения заложенности носа или придаточных пазух носа, другие препараты от простуды (включая те, которые можно купить в аптеке);
- препараты для подавления иммунного ответа организма (иммунодепрессанты);
- аллопуринол (для лечения подагры);
- прокайнамид (от проблем с сердцебиением);
- препараты, содержащие золото, такие как ауротиомалат натрия, которые могут быть назначены Вам инъекционно.

Нижеуказанные препараты могут увеличить риск ангионевротического отека (признаки ангионевротического отека включают отек лица, губ, языка и/или горла с затруднением глотания или дыхания):

- препараты, применяемые для растворения опасных тромбов в кровеносных сосудах (тканевой активатор плазминогена), обычно назначаемые в больнице;
- препараты, которые чаще всего используются для предотвращения отторжения трансплантированных органов (темсиролимус, сиролимус, эверолимус и другие препараты, относящиеся к классу ингибиторов mTOR). Также см. раздел 2 «Особые указания и меры предосторожности»;
- рацекадотрил – применяется для лечения диареи;
- вилдаглиптин – препарат, используемый для лечения сахарного диабета.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Вы должны сообщить своему врачу, если Вы думаете, что беременны (или можете забеременеть). При подтверждении беременности прием препарата Лизиноприл должен быть прекращен. Ваш врач подберет Вам другой препарат.

Препарат Лизиноприл не рекомендуется принимать на ранних сроках беременности. Препарат противопоказан во II и III триместре беременности, так как он может нанести серьезный вред Вашему ребенку.

Грудное вскармливание

Сообщите своему врачу, если Вы кормите грудью или собираетесь начать кормить грудью. Препарат Лизиноприл не рекомендуется женщинам, которые кормят грудью. Ваш врач может подобрать Вам другое лечение, особенно если Ваш ребенок новорожденный или родился недоношенным.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Некоторые пациенты могут почувствовать головокружение и усталость во время приема препарата Лизиноприл. Если это случается с Вами, воздержитесь от вождения автотранспорта и не управляйте механизмами.

Воздержитесь от совершения этих действий, пока Вы не узнаете, как этот препарат влияет на Вас.

Препарат Лизиноприл содержит лактозу

Препарат Лизиноприл содержит вспомогательное вещество лактоза моногидрат. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. Прием препарата Лизиноприл

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

При назначении лизиноприла в дозе 2,5 мг необходимо рассмотреть других производителей, осуществляющих реализацию препарата в лекарственной форме, позволяющей дозировать препарат до 2,5 мг.

Линия разлома (риска) не предназначена для разламывания таблетки.

В начале приема препарата Лизиноприл Ваш лечащий врач назначит Вам дополнительные лабораторные исследования. Исходя из результатов, врач может скорректировать Вашу дозу.

Прием первой дозы

Будьте особенно осторожны, когда принимаете первую дозу препарата Лизиноприл или если доза увеличивается. Прием первой дозы может вызвать более сильное падение артериального давления, чем последующие приемы. Вы можете почувствовать головокружение или предобморочное состояние. Если Вы обеспокоены данным состоянием, обратитесь к врачу как можно скорее.

Взрослые

Ваша доза зависит от Вашего состояния здоровья и от того, принимаете ли Вы какие-либо другие препараты. Ваш врач скажет Вам, сколько таблеток принимать каждый день. Проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки, если Вы не уверены.

При высоком кровяном давлении

- Рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг один раз в сутки.

- Поддерживающая доза составляет 20 мг один раз в сутки.

При сердечной недостаточности

- Рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг один раз в сутки.
- Поддерживающая доза составляет от 5 мг до 35 мг один раз в сутки.

После сердечного приступа (инфаркта миокарда)

- Рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг в течение 24 часов после приступа и 5 мг через сутки.

- Поддерживающая доза составляет 10 мг один раз в сутки.

При проблемах с почками, вызванных диабетом

- Рекомендуемая доза составляет 10 мг или 20 мг один раз в сутки.

Если Вы пожилой человек, у Вас проблемы с почками или Вы принимаете мочегонные препараты, Ваш лечащий врач может назначить Вам более низкую дозу, чем обычно.

Дети

Препарат Лизиноприл применяется у детей и подростков (от 6 до 16 лет) для лечения высокого артериального давления.

Препарат Лизиноприл не рекомендуется детям младше 6 лет или детям с тяжелыми проблемами с почками.

Врач определит правильную дозу для Вашего ребенка. Доза зависит от массы тела ребенка:

- для детей весом от 20 до 50 кг рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг один раз в сутки.
- для детей весом более 50 кг рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг один раз в сутки.

Способ применения

- проглатывайте таблетку, запивая водой;
- принимайте препарат Лизиноприл в одно и то же время каждый день. Препарат Лизиноприл можно принимать независимо от приема пищи;
- принимайте препарат Лизиноприл столько, сколько назначил Вам лечащий врач. Это долгосрочное лечение. Важно принимать препарат каждый день.

Если Вы приняли препарата Лизиноприл больше, чем следовало

Если Вы приняли слишком большое количество таблеток, обратитесь к Вашему врачу или в ближайшее медицинское учреждение. При превышении рекомендуемой дозы могут отмечаться головокружение и учащенное сердцебиение.


Если Вы забыли принять препарат Лизиноприл

Примите пропущенную дозу, как только вспомните. Если скоро наступит время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте принимать препарат, как обычно.

Не принимайте двойную дозу с целью компенсации пропущенной дозы.

Если Вы прекратили прием препарата Лизиноприл

Не прекращайте принимать препарат Лизиноприл, даже если Вы чувствуете себя хорошо, если это не предписано Вашим врачом.



При наличии вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Лизиноприл может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Лизиноприл и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае развития у Вас каких-либо нежелательных реакций, перечисленных ниже:

– тяжелые аллергические реакции (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000). Симптомы могут возникать внезапно:

- отек лица, губ, языка или горла, что может привести к затрудненному глотанию;
- сильный отек рук, ног и лодыжек;
- затрудненное дыхание;
- сильный зуд кожи с появлением уплотнений.

– тяжелые кожные аллергические реакции: внезапная, неожиданная сыпь или жжение, покраснение или шелушение кожи (возникают очень редко, не более чем у 1 человека из 10 000);

– инфекция с такими симптомами, как лихорадка и серьезное ухудшение общего состояния, или лихорадка с местными симптомами инфекции, такими как боль в горле / глотке / ротовой полости и/или проблемы с мочеиспусканием (возникают очень редко, не более чем у 1 человека из 10 000).

Другие нежелательные реакции, возникающие при приеме препарата Лизиноприл:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;
- головокружение или предобморочное состояние, особенно при резком переходе из горизонтального положения или из положения сидя в вертикальное положение;
- диарея;
- непроходящий сухой кашель;
- тошнота/рвота;
- нарушение работы почек (изменения в лабораторных анализах).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- изменение настроения;
- изменение цвета пальцев рук или ног (бледно-голубой с последующим покраснением) или онемение/покалывание в пальцах рук или ног;
- изменение вкусовых ощущений;
- чувство сонливости;
- головокружение с ощущением вращения (вертиго);
- нарушение сна;
- инсульт;

- учащенное сердцебиение;
- насморк;
- тошнота
- боль в желудке или расстройство пищеварения;
- кожная сыпь или зуд;
- проблемы с эрекцией (импотенция);
- чувство усталости или слабости (потеря сил);
- очень сильное падение артериального давления у пациентов со следующими состояниями: ишемическая болезнь сердца; сужение аорты (сердечной артерии), почечной артерии или сердечных клапанов; увеличение толщины сердечной мышцы. Вы можете почувствовать головокружение или предобмороочное состояние, особенно если Вы быстро встанете;
- изменения лабораторных показателей крови, которые показывают, насколько хорошо работают Ваша печень и почки;
- сердечный приступ (инфаркт миокарда);
- зрительные и/или слуховые галлюцинации.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- спутанность сознания;
- сыпь, похожая на ожоги крапивой (крапивница);
- сухость во рту;
- выпадение волос;
- псориаз (кожное заболевание);
- нарушение обоняния;
- увеличение грудной железы у мужчин (гинекомастия);
- изменения лабораторных показателей крови. Ваш врач будет назначать Вам дополнительные лабораторные исследования, чтобы проверить влияние лизиноприла на показатели крови. При изменениях показателей крови могут наблюдаться усталость, бледность кожи, боль в горле, высокая температура (лихорадка), боль в суставах и мышцах, отек суставов или желез или чувствительность к солнечному свету;
- снижение уровня натрия в крови (симптомами могут быть усталость, головная боль, тошнота, рвота);
- внезапная почечная недостаточность.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- воспаление придаточных пазух носа (синусит) с ощущением боли и напряжения над пораженными пазухами;
- свистящее дыхание;
- низкий уровень глюкозы в крови (гипогликемия). Признаки могут включать чувство голода или слабость, потливость и учащенное сердцебиение;
- воспаление легких. Признаки включают кашель, одышку и высокую температуру (лихорадку);

- пожелтение кожи или белков глаз (желтуха);
- воспаление печени. Это может вызвать потерю аппетита, пожелтение кожи и глаз, а также темный цвет мочи;
- воспаление поджелудочной железы. Это вызывает умеренную или сильную боль в области желудка.
- тяжелые кожные заболевания. Симптомы включают покраснение, образование волдырей и шелушение кожи;
- повышенное потоотделение;
- уменьшение количества мочи или отсутствие мочеиспускания (олигурия/анурия);
- печеночная недостаточность;
- воспаление кишечника;
- увеличение лимфатических узлов.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- симптомы депрессии;
- обморок.

Нежелательные реакции у детей были сопоставимы с профилем безопасности взрослых.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе, на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Республикансое унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Телефон: +375 (17) 242-00-29; факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>

Республика Армения

0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

«Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна» АОЗТ

Телефон: (+374 10) 23-16-82, 23-08-96, 23-47-32, 23-20-91

Телефон горячей линии отдела мониторинга безопасности лекарственных средств:
(+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Факс: (+374 10) 23-21-18, 23-29-42

Электронная почта: vigilance@pharm.am

Сайт: <http://www.pharm.am>

Республика Казахстан

010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМ и ФК МЗ РК

Телефон: +7 (7172) 235-135

Электронная почта: farm@dari.kz

Сайт: <http://www.ndda.kz>

Кыргызская Республика

720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Телефон: + 996 (312) 21-92-88

Электронная почта: dlsmi@pharm.kg

Сайт: <https://www.pharm.kg>

Российская Федерация

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата Лизиноприл

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Хранить в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке) для защиты от света и влаги при температуре не выше 25 °C.

Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или как бытовые отходы. Уточните у работника аптеки как утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Лизиноприл содержит

Действующее вещество: лизиноприл.

Каждая таблетка содержит 5 мг или 10 мг действующего вещества.

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, целлюлоза микрокристаллическая, стеариновая кислота, повидон, лактоза моногидрат.

Внешний вид препарата Лизиноприл и содержимое упаковки

Таблетки.

Лизиноприл, 5 мг, таблетки

Таблетки белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской, риской и гравировкой «5».

Линия разлома (риска) не предназначена для разламывания таблетки.



Лизиноприл, 10 мг, таблетки

Таблетки белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и риской.

Линия разлома (риска) не предназначена для разламывания таблетки.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой.

3 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (№10×3, №10×6).

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Производитель

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64А

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Телефон: +375 (177) 73-56-12, 74-42-80

E-mail: market@borimed.com

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза
<http://eec.eaeunion.org/>