

Л И С Т О К – В К Л А Д Ы Ш  
по медицинскому применению лекарственного препарата  
**Сердечные капли**  
**настойка для внутреннего применения**

**Название лекарственного препарата** Сердечные капли.

**Форма выпуска** Настойка для внутреннего применения.

**Общая характеристика** Прозрачная жидкость желто-коричневого цвета. При хранении допускается выпадение осадка.

**Состав лекарственного препарата:**

	<u>На 1 мл</u>
Валерианы настойка (спиртовое извлечение валерианы корневищ с корнями (1:5))*	- 0,34 мл
Пустырника настойка (спиртовое извлечение пустырника травы (1:5))*	- 0,33 мл
Боярышника настойка (спиртовое извлечение из плодов боярышника (1:10))*	- 0,33 мл

\*Экстрагент спирт этиловый 70 %

Содержит не менее 64 % спирта этилового.

**Фармакотерапевтическая группа** Прочие снотворные и седативные средства.

**Фармакологические свойства**

Лекарственный препарат представляет комбинацию настоек корневищ с корнями валерианы, травы пустырника и плодов боярышника.

**Показания к применению**

В комплексной терапии функциональных нарушений центральной нервной системы (нарушения сна и неврастения).

В комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой деятельности.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозировка**

Первые 3-4 дня принимать по 20-30 капель 3-4 раза в сутки, потом суточную дозу уменьшить до 15-20 капель 2-3 раза в сутки. Принимают внутрь за 30 минут до еды, разовую дозу развести в небольшом количестве (1/4 стакана) кипяченой воды комнатной температуры. Режим дозирования и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного препарата. Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств. Перед употреблением взбалтывать.

**Побочное действие**

Возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи), головной боли, общей слабости, головокружения, снижения работоспособности, сонливости, раздражительности, тревожности, желудочно-кишечных расстройств (изжога, тошнота,

отрыжка, боли в животе), артериальной гипотензии. Большие дозы могут привести к брадикардии и аритмии, а также снижению моторики кишечника (запор).

#### *Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях*

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата; беременность, период лактации; детский возраст до 18 лет; артериальная гипотензия, брадикардия; язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит в фазе обострения.

**С осторожностью:** заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога

#### **Передозировка**

**Симптомы.** Хроническая передозировка вызывает чувство угнетенности, головную боль, сонливость, дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта, тошноту, снижение работоспособности, артериальную гипотензию, нарушение сердечной деятельности (брадикардию). Острая передозировка может вызвать алкогольную интоксикацию, появление болей в животе спастического характера, чувства стеснения в груди, головокружения, трепора рук и расширения зрачков.

**Лечение.** В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного препарата и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка. Симптоматическая терапия.

#### **Меры предосторожности**

Лекарственный препарат содержит не менее 64 об. % этанола, т. е. до 439 мг на разовую дозу (20 капель), что эквивалентно 11 мл пива и 5 мл вина. Вреден для лиц с алкоголизмом. В связи с содержанием этилового спирта лекарственный препарат не следует принимать беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет, а также пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога.

Перед приемом лекарственного препарата необходима консультация врача. Во время лечения необходим контроль артериального давления и электрокардиограммы.

Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, развиваются отеки нижних конечностей, необходимо обратиться к врачу. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышка).

Из-за постепенного развития эффекта лекарственный препарат не рекомендовано применять в случаях экстренной необходимости уменьшения симптомов психического возбуждения и нарушений сна.

#### **Влияние на способность к управлению автотранспортом и потенциально опасными механизмами**

Лекарственный препарат содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо отказаться от вождения автотранспортом и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### **Применение в период беременности и кормления грудью**

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применять во время беременности и лактации противопоказано.

#### **Применение у детей**

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием спирта этилового лекарственного препарата не рекомендован для назначения детям до 18 лет.

## **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

*Если Вы принимаете любые другие лекарственные препараты, обязательно сообщите об этом врачу!*

Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмиками III класса, с цизапридом. Лекарственный препарат может усилить действие седативных, снотворных, анксиолитических, кардиотонических, спазмолитических, анальгезирующих и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему.

Комбинация лекарственного препарата Сердечные капли с синтетическими седативными средствами требует медицинского наблюдения.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных препаратов, содержащих этиловый спирт.

**Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:**

- лекарственные препараты, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксиф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин.
- лекарственные препараты, угнетающие функции центральной нервной системы.

## **Условия и срок хранения**

В защищённом от света месте при температуре ниже 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта врача.

## **Упаковка**

50 мл во флаконы из стекломассы оранжевого цвета, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчивающимися, с листком-вкладышем в упаковке № 1.

## **Информация о производителе**

СОАО «Ферайн»,

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52А,  
тел./факс + 375 17 394-92-18; тел. + 375 17 213-16-37, +375 17 213-12-58  
E-mail: office@ferane.by