

Листок-вкладыш – информация для пациента

Метилурацил, 100 мг/г, мазь для наружного применения

Действующее вещество: метилурацил

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Метилурацил и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Метилурацил.
3. Применение препарата Метилурацил.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Метилурацил.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Метилурацил и для чего его применяют

Данный лекарственный препарат содержит действующее вещество метилурацил, и относится к группе «Препараты для лечения ран и язв».

Показания к применению

Препарат Метилурацил показан к применению у взрослых с 18 лет в составе комплексного лечения следующих состояний:

- дерматиты;
- плохо заживающие раны;
- ожоги;
- эрозии и язвы кожи (в том числе после лучевой терапии);
- трещины кожи заднего прохода и молочных желез.

Применяется также в качестве фотозащитного препарата при фотодерматитах.

Способ действия препарата Метилурацил

Препарат Метилурацил ускоряет процессы клеточного восстановления, заживление ран,

стимулирует клеточные и тканевые факторы защиты, а также оказывает противовоспалительное действие.

2. О чем следует знать перед применением препарата Метилурацил

Противопоказания

Не применяйте препарат Метилурацил, если у Вас:

- аллергия на метилурацил или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- избыточность грануляций в ране;
- злокачественные заболевания органов кроветворения (например, острый или хронический лейкоз).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Метилурацил проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если у Вас наблюдаются перечисленные ниже состояния (симптомы). Возможно, Вам потребуется ряд дополнительных необходимых мер (например, назначение Вам врачом дополнительного лечения или более частый контроль Вашего состояния):

- с осторожностью применяйте при кожных заболеваниях, сопровождающихся наличием образований на поверхности кожи;
- с осторожностью применяйте при острых воспалительных заболеваниях кожи и в период обострения хронических заболеваний;
- с осторожностью применяйте на больших участках кожи – при наличии у Вас нарушений обмена холестерина и тяжелых заболеваний печени.

Для получения дополнительной информации обратитесь к работнику аптеки или лечащему врачу.

Если при применении лекарственного препарата симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, обратитесь к Вашему врачу.

Дети и подростки

Безопасность и эффективность препарата Метилурацил у детей и подростков в возрасте до 18 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

Другие препараты и препарат Метилурацил

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Мазь Метилурацил можно применять с другими антисептическими и антибактериальными препаратами. Одновременное местное применение глюкокортикостероидов (гидрокортизон, преднизолон, бетаметазон, триамцинолон и другие) ослабляет эффект мази.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Применение препарата во время беременности возможно только после консультации Вашего лечащего врача и оценки пользы/риска его применения.

Грудное вскармливание

Применение препарата в период грудного вскармливания возможно только после консультации Вашего лечащего врача и оценки пользы/риска его применения. Не применяйте препарат в период грудного вскармливания, если Ваш врач его Вам не назначил. В случае необходимости применения препарата воздержитесь от грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Метилурацил содержит ланолин

Препарат содержит ланолин. Ланолин может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Применение препарата Метилурацил

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в сутки.

При эрозиях, язвах и ранах мазь наносят после предварительной обработки антисептиками.

Особые группы пациентов

Данные отсутствуют.

Применение у детей и подростков

Безопасность и эффективность препарата Метилурацил у детей и подростков в возрасте до 18 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

Путь и способ введения

Наружно.

Продолжительность терапии

Длительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного препарата и достигнутого эффекта.

Если Вы применили препарата Метилурацил больше, чем следовало

Если Вы по ошибке применили больше лекарственного препарата, чем было рекомендовано, незамедлительно свяжитесь с Вашим лечащим врачом. Врач примет решение о необходимости принятия адекватных мер.

При длительном применении в больших дозах возможны изменения состава периферической крови.

Если Вы забыли применить препарат Метилурацил

Не наносите двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Примените препарат как только вспомните об этом, или в обычной дозе в следующее назначенное время, если оно наступит скоро.

Если Вы прекратили применение препарата Метилурацил

Перед прекращением применения препарата посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Метилурацил может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Частота неизвестна – на основании имеющихся данных оценить невозможно:

- кратковременное легкое жжение;
- аллергические реакции (сыпь, зуд, раздражение, покраснение на месте применения, высыпания).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <http://www.rceth.by>

Республика Армения

«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО

0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Телефон: (+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-16-82, 23-08-96

Телефон горячей линии отдела мониторинга безопасности лекарственных средств: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Факс: (+374 10) 23-21-18, 23-29-42

Электронная почта: vigilance@pharm.am

Сайт: <https://www.pharm.am>

5. Хранение препарата Метилурацил

Храните препарат Метилурацил в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке (картонной пачке).

Датой истечения срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке (картонной пачке).

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Метилурацил содержит

Действующим веществом является: метилурацил.

Каждый грамм мази для наружного применения содержит 0,1 грамм метилурацила.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: парафин мягкий белый, ланолин, вода очищенная.

Препарат Метилурацил содержит ланолин (см. раздел 2 «Препарат Метилурацил содержит ланолин»).

Внешний вид препарата Метилурацил и содержимое упаковки

Мазь желтоватого цвета, с характерным запахом.

15 г в тубах алюминиевых.

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: + 375 (177) 73-56-12, + 375 (177) 74-42-80

Электронная почта: market@borimed.com

Перечень представителей держателя регистрационного удостоверения:

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:



Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: +375 (177) 73-56-12, 74-42-80

Электронная почта: market@borimed.com

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств <https://ees.eaeunion.org/>.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» www.rceth.by.