

**Листок-вкладыш – информация для пациента**  
**Меколь, 40 мг/г + 7,5 мг/г, мазь для наружного применения**  
метилурацил, хлорамфеникол

**Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем, рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

### **СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША**

1. Что из себя представляет препарат Меколь, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Меколь.
3. Применение препарата Меколь.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Меколь.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

## **1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ МЕКОЛЬ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Препарат Меколь содержит действующие вещества метилурацил и хлорамфеникол и относится к группе комбинированных препаратов, содержащих антибиотик для наружного применения.

Оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и противомикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, синегнойной и кишечных палочек).

Легко проникает вглубь тканей без повреждения биологических мембран, стимулирует процессы регенерации. В присутствии гноя и некротических масс антибактериальное действие сохраняется.

### **Показания к применению**

Препарат Меколь показан к применению у взрослых и детей старше 1 года для лечения инфицированных ран (включая порезы и ссадины) различной локализации (в том числе инфицированные смешанной микрофлорой) в первой фазе раневого процесса.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение необходимо обратиться к врачу.

## **2. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА МЕКОЛЬ**

### **Не применяйте препарат Меколь:**

– если у Вас аллергия на метилурацил или хлорамфеникол, или любой из компонентов, входящих в состав данного препарата (см. раздел 6).

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед началом применения препарата Меколь проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При необходимости нанесения на обширные участки кожи и длительных курсах лечения врач будет контролировать Ваш клинический анализ крови.

### **Дети и подростки**

Не применяйте препарат у детей до 1 года, поскольку эффективность и безопасность не установлены.

### **Другие препараты и препарат Меколь**

Сообщите лечащему врачу, если Вы применяете или недавно применяли любые другие лекарственные препараты.

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом, когда Ваш врач оценил пользу и риск возможного применения препарата.

При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом о решении вопроса.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Лекарственный препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами.

## **3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЕКОЛЬ**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Рекомендуемая доза**

#### **Взрослые и дети старше 1 года:**

Перевязки производят ежедневно, один раз в день, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс. При больших раневых поверхностях суточная доза мази в пересчете на хлорамфеникол не должна превышать 3 г.

### **Путь и (или) способ введения**

Наружно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этом случае мазь предварительно подогревают до 35–36 °С.

### **Продолжительность терапии**

Длительность лечения зависит от тяжести и течения заболевания.

### **Если Вы применили препарата Меколь больше, чем следовало**

О случаях передозировки не сообщалось.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

## **4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Меколь может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Прекратите применение препарата Меколь и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения аллергических реакций (кожных высыпаний).**

### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе, на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о

неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

**Республика Беларусь**

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а  
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»  
Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242 00 29  
Факс: +375 (17) 242 00 29  
Эл. почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by)  
<http://www.rceth.by>

**Республика Армения**

0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5  
«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО  
Телефон: (+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-16-82, 23-08-96  
Телефон горячей линии отдела мониторинга безопасности лекарственных средств:  
(+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05  
Факс: (+374 10) 23-21-18, 23-29-42  
Электронная почта: [info@ampra.am](mailto:info@ampra.am)  
Сайт: <http://www.pharm.am>

**Республика Казахстан**

010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)  
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и  
медицинских изделий» КМ и ФК МЗ РК  
Телефон: +7 (7172) 235 135  
Электронная почта: [farm@dari.kz](mailto:farm@dari.kz)  
Сайт: <http://www.ndda.kz>

**Республика Кыргызстан**

720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25  
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве  
здравоохранения Кыргызской Республики  
Телефон: + 996 (312) 21-92-88  
Электронная почта: [dlsmi@pharm.kg](mailto:dlsmi@pharm.kg)  
Сайт: <https://www.pharm.kg>

**5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЕКОЛЬ**

Хранить при температуре не выше 20 °С. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Срок годности: 3,5 года.

Не применяйте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или как бытовые отходы. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

**6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**


**Препарат Меколь содержит:**

*Действующее вещество:* метилурацил, хлорамфеникол.

1 г мази содержит 40 мг метилурацила и 7,5 мг хлорамфеникола.

*Вспомогательные вещества:* макрогол (тип 1500), макрогол (тип 400).

**Внешний вид препарата Меколь и содержимое упаковки**



Мазь для наружного применения.

Мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета, однородной консистенции.

40 г в тубах алюминиевых с колпачками из полимерного материала.

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка №1).

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: +375 (177) 735612, 744280

E-mail: [market@borimed.com](mailto:market@borimed.com)

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

**Листок-вкладыш пересмотрен**

**Прочие источники информации**

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by).