

Листок-вкладыш – информация для пациента

Лизиноприл, 20 мг, таблетки

Действующее вещество: лизиноприл (в виде лизиноприла дигидрата)

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу.

Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Лизиноприл, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Лизиноприл.
3. Прием препарата Лизиноприл.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Лизиноприл.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Лизиноприл, и для чего его применяют

Лизиноприл является препаратом, используемым при высоком артериальном давлении (антигипертензивным лекарственным препаратом), и относится к группе ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ингибиторы АПФ).

Показания к применению

Препарат Лизиноприл принимается при:

- лечении повышенного артериального давления (артериальная гипертензия);
- лечении сердечной недостаточности с наблюдаемыми симптомами (клиническими проявлениями);
- лечении острого инфаркта миокарда (кратковременное (до 6 недель) лечение у пациентов без выраженных нарушений кровообращения в течение 24 часов после начала острого инфаркта миокарда).
- в лечении диабетической нефропатии (лечение поражения почек у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа и начальной стадией нефропатии).

Способ действия препарата

Лизиноприл блокирует ангиотензин-превращающий фермент (АПФ), который необходим для реакции превращения ангиотензина в ангиотензин II – вещество, которое в организме

человека оказывает сосудосуживающий эффект. Угнетение АПФ приводит к снижению концентрации ангиотензина II в плазме крови, что, в свою очередь, приводит к расширению сосудов. Вследствие этого снижается артериальное давление и уменьшается нагрузка на сердце, что, в свою очередь, снижает риск развития осложнений заболевания. Это позволяет добиться улучшения качества жизни и её продолжительности.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Лизиноприл

Противопоказания

Не принимайте препарат Лизиноприл, если:

- у Вас аллергия на лизиноприл или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у Вас аллергия к другим ингибиторам АПФ. Симптомы аллергической реакции могут включать: кожную сыпь, отек конечностей, лица, губ, языка или горла. Также может возникать затруднение глотания или затруднение дыхания (ангионевротический отек);
- Вы принимаете или недавно принимали препараты, содержащие сакубитрил/валсартан (препарат для лечения хронической сердечной недостаточности), так как при этом возрастает риск возникновения ангионевротического отека (отек гортани, голосовой щели, лица, губ, глотки и/или языка, способный привести к затруднению дыхания вследствие ухудшения проходимости дыхательных путей, к затруднению глотания или к ухудшению способности говорить);
- у члена Вашей семьи была тяжелая аллергическая реакция (ангионевротический отек) на ингибиторы АПФ или если у Вас была тяжелая аллергическая реакция (ангионевротический отек) с известной причиной;
- у Вас второй или третий триместр беременности;
- у Вас сахарный диабет или нарушение функции почек и Вы уже принимаете препараты, содержащие алискирен.
- непереносимость молочного сахара (лактозы) (см. раздел 2 «Препарат Лизиноприл содержит лактозу»).

Не принимайте препарат Лизиноприл и сообщите врачу, если к Вам относится что-либо из вышеперечисленного.

Если у Вас появился сухой кашель, который сохраняется в течение длительного времени после начала лечения препаратом Лизиноприл, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Лизиноприл проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Сообщите Вашему лечащему врачу, что:

- у Вас имеются заболевания сердца или печени, сахарный диабет;
- у Вас имеется заболевание почек или Вы находитесь на диализе;
- у Вас имеется коллагенозное сосудистое заболевание, такое как склеродермия или системная красная волчанка;
- у Вас низкое артериальное давление;

- у Вас наблюдались значительные потери солей или жидкости (у Вас была рвота, диарея, повышенное потоотделение, пребывание на диете с низким содержанием соли, длительный прием мочегонных препаратов, лечение диализом);
- Вам предстоит лечение для уменьшения аллергии на укусы пчел или ос (десенсибилизация);
- Вам предстоит анестезия (например, при хирургической или стоматологической операции). Вам может потребоваться прекратить прием препарата Лизиноприл за день до этого. Проконсультируйтесь с врачом;
- у Вас высокое содержание калия в крови (по результатам анализа крови);
- Вы принимаете препараты, которые могут повысить риск возникновения ангионевротического отека – серьезной аллергической реакции, такие как ингибиторы mTOR (например, темсиролимус, эверолимус, сиролимус), вилдаглиптин, ингибиторы неприлизина (такие как рацекадотрил) или сакубитрил/валсартан. Что касается комбинации сакубитрил/валсартан, см. информацию под заголовком «Противопоказания»;
- Вы принимаете любой из следующих лекарственных препаратов для снижения артериального давления: антагонисты рецепторов ангиотензина II (также известные как «сартаны», например, лозартан, валсартан, телмисартан, ирбесартан), особенно если у Вас есть проблемы с почками, связанные с сахарным диабетом;
- Вы принимаете препарат алискирен. Возможно, врачу потребуется регулярно проверять Вашу функцию почек, артериальное давление и содержание электролитов (например, калия) в крови (см. также информацию под заголовком «Противопоказания»);
- у Вас высокий уровень холестерина и Вам предстоит процедура, называемая «аферез ЛПНП».

Вы должны сообщить врачу, если Вы думаете или уверены, что беременны (или планируете беременность). Лизиноприл не рекомендуется принимать в первые 3 месяца беременности и он противопоказан при сроке беременности более 3 месяцев (во втором и третьем триместрах беременности), так как может вызвать серьезные нарушения у ребенка (см. подраздел «Беременность и грудное вскармливание»).

Как и в случае с другими схожими препаратами для снижения артериального давления, эффект препарата Лизиноприл может быть несколько ниже у пациентов негроидной расы. У таких пациентов также повышена вероятность возникновения нежелательной реакции «ангионевротический отек» (тяжелая аллергическая реакция).

Дети и подростки

Препарат Лизиноприл не рекомендуется принимать детям младше 6 лет или у детей с тяжелым нарушением функции почек.

Препарат Лизиноприл можно давать детям только для лечения артериальной гипертензии.

Другие препараты и препарат Лизиноприл

Сообщите Вашему лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Необходимо соблюдать особую осторожность при одновременном приеме препарата Лизиноприл со следующими препаратами:

- другие препараты для снижения артериального давления;
- нитроглицерин (при ишемической болезни сердца);

- антагонисты рецепторов ангиотензина II (валсартан, телмисартан, ирбесартан, алискирен. Вашему лечащему врачу может потребоваться скорректировать дозу или принять другие меры предосторожности (см. раздел 2 «О чем следует знать перед приемом препарата Лизиноприл»);
- диуретики (мочегонные препараты), такие как фуросемид;
- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для облегчения боли и воспаления, такие как ибупрофен, индометацин, и ацетилсалициловая кислота в дозах 3 г в сутки и более;
- препараты лития (для лечения депрессии и психических нарушений);
- препараты для анестезии, трициклические антидепрессанты и антипсихотические препараты (препараты для лечения психических заболеваний);
- препараты для лечения сахарного диабета, такие как пероральные препараты для снижения уровня глюкозы и инсулин. Лизиноприл может снизить уровень глюкозы в крови. Проверяйте уровень глюкозы в крови во время лечения препаратом Лизиноприл;
- препараты, которые могут повысить содержание калия в крови: пищевые добавки (включая заменители соли), калийсберегающие диуретики, триметоприм/сульфаметоксазол (для лечения бактериальных инфекций), гепарин (для разжижения крови и предотвращения образования тромбов);
- циклоспорин (препарат, подавляющий иммунитет для предотвращения отторжения трансплантата);
- препараты, применяемые при низком артериальном давлении, сердечной недостаточности, астме или аллергии, такие как эфедрин, норадrenalин, ксилометазолин и сальбутамол;
- аллопуринол (для лечения подагры);
- прокаинамид (при нерегулярном сердечном ритме);
- препараты, содержащие золото (препараты, подавляющие иммунитет).

Следующие препараты при совместном применении с лизиноприлом могут увеличить риск возникновения ангионевротического отека (отек гортани, голосовой щели, лица, губ, глотки и/или языка, способный привести к затруднению дыхания вследствие ухудшения проходимости дыхательных путей, к затруднению глотания или к ухудшению способности говорить):

- сакубитрил/валсартан - препарат, применяемый для лечения хронической сердечной недостаточности у взрослых (см. информацию под заголовком «Противопоказания»);
- тромболитические препараты (активаторы тканевого плазминогена), обычно назначаемые в больнице;
- темсиролимус (препарат для лечения рака);
- сиролимус, эверолимус (препарат для профилактики отторжения трансплантата);
- рацекадотрил (препарат для лечения диареи);
- вилдаглиптин (препарат для лечения сахарного диабета 2 типа).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Не принимайте препарат Лизиноприл во втором и третьем триместрах беременности, так как может нанести серьезный вред ребенку (см. раздел «Противопоказания»).

Не рекомендуется принимать препарат Лизиноприл на ранних сроках беременности (в первом триместре беременности).

В случае планирования или наступления беременности врач порекомендует Вам прекратить прием препарата Лизиноприл и подберет для Вас другой препарат для контроля артериального давления, если это будет необходимо.

Грудное вскармливание

Препарат Лизиноприл не рекомендуется принимать кормящим матерям. Ваш врач может назначить Вам другое лечение, если Вы желаете продолжить вскармливание, особенно если Ваш ребенок новорожденный или родился недоношенным.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Лизиноприл способен оказывать влияние на управление транспортными средствами и работу с механизмами из-за риска развития нежелательных реакций, таких как головокружение или сонливость (см. раздел «Возможные нежелательные реакции»).

В некоторых случаях при приеме препарата возникает сонливость или головокружение. При возникновении таких ощущений Вам не следует управлять транспортными средствами или использовать механическое оборудование. Прежде чем управлять транспортными средствами или работать с механическим оборудованием, Вам необходимо тщательно оценить свою реакцию на прием препарата Лизиноприл.

Препарат Лизиноприл содержит лактозу

Данный лекарственный препарат содержит лактозу (молочный сахар). Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

3. Прием препарата Лизиноприл

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Соблюдайте осторожность при приеме препарата Лизиноприл в первый раз или при увеличении дозы, так как возможно более значительное снижение артериального давления, чем при приеме предшествующих более низких доз.

При значительном снижении артериального давления у Вас может возникнуть ощущение головокружения. Данное состояние поможет облегчить лежачее положение.

Взрослые

Доза лизиноприла подбирается лечащим врачом индивидуально в зависимости от Вашего состояния и от того, принимаете ли Вы какие-либо другие лекарственные препараты.

Для лечения артериальной гипертензии

- рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг 1 раз в сутки;
- поддерживающая доза обычно составляет 20 мг 1 раз в сутки.

Доза может быть увеличена до 80 мг 1 раз в сутки в зависимости от артериального давления.

Для лечения сердечной недостаточности с клиническими проявлениями

- рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг 1 раз в сутки;

– поддерживающая доза обычно составляет от 5 до 35 мг 1 раз в сутки.

После острого инфаркта миокарда

– рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг в период до 24 часов после инфаркта миокарда и 5 мг на следующий день;

– поддерживающая доза обычно составляет 10 мг 1 раз в сутки.

Для лечения диабетической нефропатии

– рекомендуемая доза составляет 10 мг или 20 мг 1 раз в сутки.

Особые группы пациентов

Пожилые пациенты

У пожилых людей (старше 65 лет) в проведенных клинических исследованиях не выявлено необходимости в коррекции дозы. Однако следует принимать во внимание сопутствующие заболевания пациента, которые могут потребовать коррекцию дозы, например, нарушение функции почек.

Пациенты с нарушением функции почек или принимающие мочегонные препараты

Если Вы имеете нарушение функции почек или принимаете мочегонные препараты, лечащий врач может назначить Вам более низкую дозу препарата Лизиноприл и обследования для контроля функции почек.

Применение у детей и подростков

Дети младше 6 лет и дети с нарушением функции почек

– препарат Лизиноприл не рекомендуется детям до 6 лет;

– препарат Лизиноприл не рекомендуется детям с тяжелым нарушением функции почек.

Дети старше 6 лет (только для лечения артериальной гипертензии)

– доза лизиноприла подбирается врачом индивидуально в зависимости от массы тела ребенка;

– для детей с массой тела от 20 кг до 50 кг рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг 1 раз в сутки (максимальная суточная доза 20 мг 1 раз в сутки);

– для детей с массой тела более 50 кг рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг 1 раз в сутки (максимальная суточная доза 40 мг 1 раз в сутки).

Способ применения

Препарат принимают внутрь независимо от приема пищи. Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды. Принимать таблетки Лизиноприл рекомендуется ежедневно в одно и то же время.

Таблетку можно разделить по риске на две равные дозы (по 10 мг).

В случае необходимости приема лизиноприла в дозе 2,5 мг и 5 мг в сутки данный лекарственный препарат не может применяться из-за высокой дозы действующего вещества в одной таблетке и невозможности разделить таблетку на части с дозой действующего вещества 2,5 мг и 5 мг.

Если Вы приняли препарата Лизиноприл больше, чем следовало

Симптомы передозировки

При передозировке возможно появление следующих симптомов: головокружение, ощущение сердцебиения, редкая частота сокращений сердца, низкое артериальное давление, нарушения электролитного баланса, функции почек, частое дыхание, тревога и кашель.

Лечение

Если Вы приняли большее количество препарата, чем следовало, **немедленно обратитесь к врачу за медицинской помощью или в ближайшее отделение неотложной помощи больницы**. По возможности возьмите с собой упаковку с данным препаратом и/или данный листок-вкладыш. Лечение передозировки должно оказываться специалистами. В случае если прием препарата произошел недавно, можно вызвать рвоту или по возможности промыть желудок, после чего принять сорбенты (например, активированный уголь). Это может помешать всасыванию таблеток.

Если Вы забыли принять препарат Лизиноприл

Если Вы забыли принять препарат в обычное время, не принимайте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную. Просто примите следующую таблетку в обычное время.

Если Вы прекратили прием препарата Лизиноприл

Не прекращайте прием препарата Лизиноприл без предварительной консультации с лечащим врачом. Это может привести к ухудшению Вашего самочувствия.

При наличии вопросов по приему препарата, обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Лизиноприл может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Если у Вас возникли какие-либо из следующих симптомов, **прекратите прием таблеток Лизиноприл и немедленно обратитесь к врачу**, Вам может понадобиться медицинская помощь:

– тяжелые аллергические реакции (частота возникновения - редко, могут возникать не более чем у 1 из 1 000 человек):

- ангионевротический отек (отек гортани, голосовой щели, лица, губ, глотки и/или языка, способный привести к затруднению глотания или к ухудшению способности говорить) (см. подраздел «Особые указания и меры предосторожности»);
- ангионевротический отек конечностей;
- анафилактические/анафилактоидные реакции. Возможные симптомы: зудящая красная сыпь, сопровождающаяся воспалением кожи (крапивница или мультиформная эритема); иные разновидности сыпи, покраснение или побледнение кожи; спазм бронхов, приводящий к затруднению дыхания; резкое снижение артериального давления, быстрый и слабый пульс; боль в животе, тошнота, рвота или диарея (жидкий стул); головокружение, обморок или предобморочное состояние.

– тяжелые поражения кожи (частота возникновения - очень редко, могут возникать не более чем у 1 из 10 000 человек):

- синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (последнее более тяжелая форма, при которой возникает обширное отслаивание кожи, захватывающее до 30 и более процентов поверхности тела). Симптомы: распространенная сыпь в виде красных пятен, пузырей, болезненных язв, сопровождающаяся шелушением и отслоением кожи и слизистых оболочек; поражаются слизистые оболочки ротовой полости, носа, глаз, половых

органов, любые участки кожи; до появления изменений на коже и слизистых оболочках может наблюдаться повышение температуры тела, озноб, боль в горле, головная боль.

– нейтропения, агранулоцитоз - снижение уровня определенных видов лейкоцитов в крови, угнетение функций кроветворения (частота возникновения очень редко, могут возникать не более чем у 1 из 10 000 человек). Нейтропения и агранулоцитоз могут стать причиной инфекционного заболевания, проявляющегося в виде симптомов: повышение температуры тела (лихорадка) и выраженное ухудшение общего самочувствия; повышение температуры тела с местными симптомами инфекционного заболевания, такими как боль в горле или в полости рта; проблемы с мочеиспусканием.

Прочие нежелательные реакции, возникающие при приеме препарата Лизиноприл

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;
- головокружение (особенно при резком переходе из горизонтального в вертикальное положение);
- постоянный сухой кашель;
- диарея;
- рвота;
- нарушение функции почек;
- ортостатические эффекты (включая гипотензию – снижение артериального давления): чрезмерное падение артериального давления при переходе из горизонтального положения или положения сидя в вертикальное положение может наблюдаться у людей со следующими состояниями: ишемическая болезнь сердца; сужение аорты (аортальный стеноз), артерий почек или сердечных клапанов; гипертрофическая кардиомиопатия (утолщение сердечной мышцы). Возможные проявления: чувство головокружения, особенно при резком переходе в вертикальное положение.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- изменение настроения;
- нарушения сна (сонливость, бессонница);
- извращение вкуса;
- парестезия (аномальные ощущения на коже в виде пощипывания, покалывания, жжения);
- вертиго (ощущение движения окружающих предметов вокруг Вас или вращения в пространстве);
- тахикардия (увеличение частоты сердечных сокращений);
- ощущение сердцебиения;
- синдром Рейно (изменение цвета пальцев рук или ног (побледнение, вплоть до синюшности, а затем покраснение), или онемение, или покалывание в пальцах рук или ног);
- острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт);
- тошнота;
- боль в желудке, нарушение пищеварения;
- кожная сыпь, зуд;
- ринит (обильные выделения из носа);

- импотенция;
- повышенная утомляемость, астения (непреходящее чувство усталости);
- инфаркт миокарда;
- зрительные и/или слуховые галлюцинации;
- изменения в показателях крови, характеризующих работу печени и почек (повышение концентрации мочевины и креатинина в сыворотке крови, повышение активности печеночных ферментов, гиперкалиемия).

Редко (могут возникать не более чем у 1 из 1 000 человек):

- спутанность сознания;
- узелковая кожная сыпь;
- сухость во рту;
- алопеция (выпадение волос);
- псориаз (кожное заболевание);
- изменение обоняния;
- гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин);
- изменение со стороны некоторых компонентов крови (снижение гемоглобина, снижение гематокрита). Ваш врач может периодически проводить анализ крови, чтобы выяснить, повлиял ли прием препарата на кровь;
- гипонатриемия (снижение уровня натрия в крови). Симптомы могут включать усталость, головную боль, тошноту, рвоту;
- повышение уровня билирубина в крови;
- нарушение выведения продуктов обмена из крови (уремия);
- острая почечная недостаточность.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- синусит (возможные проявления: заложенность носа, головная боль в височных и лобных областях);
- бронхоспазм (затруднение дыхания, может сопровождаться одышкой, свистящим дыханием);
- гипогликемия (снижение уровня сахара в крови). Возможные проявления: внезапное чувство голода, слабость, потливость, учащение сердцебиения;
- аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония (воспаление легких). Возможные проявления: кашель, учащенное дыхание, высокая температура тела;
- желтуха (желтое окрашивание кожи и белков глаз);
- гепатит (воспаление печени). Возможные проявления: потеря аппетита, желтое окрашивание кожи и белков глаз, темная моча;
- панкреатит (воспаление поджелудочной железы). Возможные симптомы: умеренная или сильная боль в области желудка;
- потливость;
- олигурия/анурия (уменьшение количества отделяемой мочи/прекращение выделения мочи);
- печеночная недостаточность;

- доброкачественный лимфаденоз кожи. Проявления: высыпания в виде мелких папул или в виде бляшек различного диаметра, могут сопровождаться зудом;
- изменение со стороны некоторых клеток крови (тромбоцитов, лейкоцитов, эритроцитов, в частности разрушение эритроцитов (гемолитическая анемия)). Ваш врач может периодически проводить анализ крови, чтобы выяснить, повлиял ли прием препарата на кровь;
- патологическое увеличение лимфоузлов;
- развитие аутоиммунных заболеваний;
- отек кишечника (ангионевротический отек кишечника).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- неадекватное выделение антидиуретического гормона;
- симптомы депрессии;
- обморок.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <http://www.rceth.by>

Республика Казахстан

010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМ и ФК МЗ РК

Телефон: +7 (7172) 235 135

Электронная почта: farm@dari.kz

Сайт: <http://www.ndda.kz>

Российская Федерация

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата Лизиноприл

Храните препарат Лизиноприл в недоступном для детей месте.

Срок годности (срок хранения)

2 года.

Хранить в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке) для защиты от света и влаги при температуре не выше 25 °С.

Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Лизиноприл содержит

Действующим веществом является: лизиноприл (в виде лизиноприла дигидрата).

Каждая таблетка содержит 20 мг лизиноприла (в виде лизиноприла дигидрата).

Прочими вспомогательными веществами являются: картофельный крахмал, целлюлоза микрокристаллическая, стеариновая кислота, повидон К17, лактоза моногидрат.

Препарат Лизиноприл содержит лактозу (см. раздел 2 «Препарат Лизиноприл содержит лактозу»).

Внешний вид препарата Лизиноприл и содержимое упаковки

Таблетки белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и риской.

Таблетку можно разделить на равные дозы.

10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной или непластифицированной ПВХ-пленки и гибкой упаковки на основе алюминиевой фольги или фольги алюминиевой, или материала комбинированного.

3 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»


222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Телефон: +375 (177) 73-56-12, 74-42-80

E-mail: market@borimed.com

Производитель

Республика Беларусь



Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64А

Перечень представителей держателя регистрационного удостоверения на территории Союза:

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: +375 (177) 73-56-12, 74-42-80

E-mail: market@borimed.com

Данный листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся едином реестре лекарственных средств <https://eec.eaeunion.org/>.